

中医内外妇儿预测试题 100 道

1. 下列哪项不是时行感冒的特征

- A. 传染性强
- B. 证候相似
- C. 集中发病
- D. 老幼易感
- E. 流行性强

【答案】D

【解析】本题是要求选择哪一项不是时行感冒的特征，时行感冒的特征是起病急，具有传染性，证候相似，集中发病；全身的症状较重，高热，全身酸痛，退热之后肺系症状明显。时行感冒可见于任何年龄。选项 D 老幼易感不是其特征。

2. 哮喘缓解期表现为肺肾两虚证候者，宜选用的方剂是

- A. 六君子汤
- B. 补中益气汤
- C. 玉屏风散
- D. 金匮肾气丸
- E. 生脉地黄汤合金水六君煎

【答案】E

【解析】哮喘缓解期之肺肾两虚证的治法应补肺益肾。方剂选用生脉地黄汤合金水六君煎。选项 A 六君子汤用于哮喘缓解期表现为肺脾气虚证者。

3. 患者症见眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。治疗应首选的方剂是

- A. 三子养亲汤
- B. 贝母瓜蒌散
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 小陷胸汤
- E. 黄连温胆汤

【答案】C

【解析】患者眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，诊断为眩晕。痰浊中阻，上蒙清窍，清阳不升，可见眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐；舌苔白腻，脉濡滑均为痰浊中阻，辨证为痰湿中阻证，治当化痰祛湿，健脾和胃，方选半夏白术天麻汤加减。

4. 治疗心悸之瘀阻心脉证，应首选的方剂是

- A. 黄连温胆汤合炙甘草汤
- B. 半夏泻心汤合当归活血饮
- C. 桃仁红花煎
- D. 参附汤
- E. 通窍活血汤

【答案】C

【解析】选项 A 用于心悸之痰火扰心证。选项 B 半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。选项 D 用于心悸之心阳虚证。心悸之瘀阻心脉证，治当活血化瘀，理气通络，方剂应选桃仁红花煎加减。

5. 患者，女，28 岁。近一周以来，不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。其证候是

- A. 心胆气虚证
- B. 心肾不交证
- C. 心脾两虚证
- D. 痰热扰心证
- E. 肝火扰心证

【答案】C

【解析】心脾两虚证多为脾气虚，心血虚。脾虚不运则运化水谷精微失常，精气不能分布于四肢则四肢倦怠。心血虚不能上荣于面，故面色少华。心神失养则心悸健忘。

6. 痴呆的某本病机为
- A. 阴精不足，气血亏虚
 - B. 髓海不足，神机失用
 - C. 脏腑亏虚，痰瘀内阻
 - D. 以虚为本，虚实夹杂
 - E. 气滞血瘀，痰浊内阻

【答案】B

【解析】痴呆为一种全身性疾病，其基本病机为髓海不足，神机失用。由精、气、血亏损不足，髓海失充，脑失所养，或气、火、痰、瘀诸邪内阻，上扰清窍所致。

7. 治疗腹痛之中脏虚寒证，应首选的方剂是

- A. 枳实导滞丸
- B. 吴茱萸汤
- C. 小建中汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 理中丸

【答案】C

8. 噎膈的病位在

- A. 胃
- B. 脾
- C. 肾
- D. 肝
- E. 食管

【答案】E

【解析】噎膈的病因以内伤饮食、情志，年老肾虚，脏腑失调为主，且三者之间常相互影响，互为因果，共同致病，形成本虚标实的病理变化。噎膈的病位在食管，属胃气所主，与肝脾肾也有密切关系。

9. 泄泻的治疗大法是

- A. 健脾益气
- B. 消食导滞
- C. 运脾化湿
- D. 清热利湿
- E. 芳香化湿

【答案】C

【解析】泄泻的基本病机为脾虚与湿盛，致肠道功能失司而发为泄泻。病理因素主要是湿，湿为阴邪，易困脾阳。脾主运化，喜燥恶湿，若脾失健运导致小肠无以分清泌浊，则发为泄泻，所以泄泻的治疗大法是运脾化湿。

10. 治疗呃逆之胃火上逆证的方剂是

- A. 麦门冬汤
- B. 一贯煎
- C. 增液汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 理中丸

【答案】D

【解析】呃逆之胃火上逆证，治当清胃泄热，降逆止呃，方选竹叶石膏汤加减。本方有清热生津、和胃降逆功能，用于治疗呃声洪亮、口臭烦渴、喜冷饮之呃逆。

11. 治疗寒湿痢，应首选的方剂是

- A. 平胃散
- B. 藿香正气散
- C. 不换金正气散
- D. 胃苓汤
- E. 香连丸

【答案】C

【解析】寒湿痢疾症见：下痢白多赤少或纯白冻，里急后重，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。病机是脾胃不和，痰湿中阻，不换金正气散用于温中燥湿，调和气血。

12. 水肿发病涉及的脏腑是

- A. 心、肝、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 脾、肾、心
- E. 肾、心、肺

【答案】C

【解析】肺失宣降，不能通调水道；脾失健运，不能转输水液；肾失开合，不能化气行水；三焦气化不利，水液代谢失常，溢于肌表而为水肿，所以水肿发病与肺、脾、肾关系密切。

13. 治疗淋证之气淋，应首选的方剂是

- A. 小蓟饮子
- B. 程氏萆薢分清饮
- C. 八正散
- D. 沉香散
- E. 补中益气汤

【答案】D

【解析】淋证之气淋病机为气机郁结，膀胱气化不利，治宜理气疏导，通淋利尿，方用沉香散。小蓟饮子主治血淋，八正散主治热淋，程氏萆薢分清饮主治膏淋，补中益气汤主治劳淋。

14. 按照痰饮停积的部位分类、饮流胁下的是

- A. 痰饮
- B. 溢饮
- C. 悬饮
- D. 支饮
- E. 伏饮

【答案】c

【解析】饮邪具有流动之性，饮留胃肠，则为痰饮；饮流胁下，则为悬饮；饮流肢体，则为溢饮；聚于胸肺，为支饮。

15. 治疗“梅核气”应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 五磨饮子
- D. 半夏厚朴汤
- E. 甘麦大枣汤

【答案】D

【解析】郁证痰气郁结证称为“梅核气”，表现为咽中如有物梗塞，吞之不下，咳之不出，为气郁痰凝，阻滞胸咽所致，治宜行气开郁，化痰散结，方选半夏厚朴汤加减。

16. 痰饮的治疗原则是下列哪一项

- A. 宣肺
- B. 健脾
- C. 温化
- D. 补肾
- E. 发汗

【答案】c

【解析】病痰饮者，应当以温药和之，故以温阳化饮为痰饮的基本治疗原则。

17. 治疗消渴之胃热炽盛证，应首选的方剂是

- A. 茜根散
- B. 消渴方
- C. 玉女煎
- D. 清中汤
- E. 七味白术散

【答案】c

【解析】胃热炽盛证见多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力，为胃火内炽，胃热消谷，耗伤津液所致；治宜清胃泻火，养阴增液；方用玉女煎加减。七味白术散主治消渴之气阴亏虚证；消渴方主治消渴肺热津伤证；茜根散主治紫斑阴虚火旺证；清中汤主治胃痛湿热中阻证。

18. 患者，女，65岁。咳喘多年，2天前外感后，症见喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，无汗，口渴，舌苔薄白，舌边红，脉浮数。治疗应选用的方剂是

- A. 苏子降气汤
- B. 桑白皮汤
- C. 麻黄汤合华盖散
- D. 麻杏石甘汤
- E. 定喘汤

【答案】D

【解析】根据患者症状，诊断为喘证之表寒肺热证。方剂选择麻杏石甘汤治疗。

19. 患者，男，32岁。素日嗜酒，外出着凉后，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应选用的方剂是

- A. 银翘散
- B. 《千金》苇茎汤合如金解毒散
- C. 沙参清肺汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 加味桔梗汤

【答案】B

【解析】肺痈主要表现为咳嗽、胸痛、发热、咳吐腥臭浊痰，甚则咳吐脓血为特征的病证，根据患者症状不难诊断为肺痈，为邪热入里，热毒内盛引起，患者咳嗽气急，咳吐腥臭浊痰处于肺痈成痈期，选项 B 清热解毒，化瘀消痈。选项 A 用于初期，选项 E 用于溃脓期，选项 C、D 用于恢复期。

(20~21 题共用选项)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 复元活血汤
- C. 通窍活血汤
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 加味四物汤

20. 治疗胃痛之瘀血停胃证，首选的方剂是

【答案】D

21. 治疗头痛之血虚头痛证，首选的方剂是

【答案】E

【解析】胃痛之瘀血停胃证，治当化瘀通络，理气和胃，方选失笑散合丹参饮加减。前方活血化瘀，后方化瘀止痛，两方合用加强活血化瘀作用，适宜治疗胃痛如针刺或痛有定处之证。头痛之血虚头痛证，治当养血滋阴，和络止痛，方剂选加味四物汤加减。

(22~23 题共用备选答案)

- A. 肝、肾
- B. 肺、脾
- C. 肺、肾
- D. 脾、肾
- E. 肺、肝

22. 阳水的病位在

【答案】B

23. 阴水的病位在

【答案】D

【解析】由于水肿的致病因素及体质的差异，其病理性质有阴水、阳水之分；阳水属实，多由外感风邪、疮毒、水湿而成，病位在肺、脾。阴水属虚或虚实夹杂，多由饮食劳倦、禀赋不足、久病体虚所致，病位在脾、肾。

(24~25 题共用选项)

- A. 痹痛游走不定，屈伸不利者为
- B. 关节疼痛，局部灼热红肿
- C. 肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛
- D. 关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增
- E. 关节红肿，疼痛剧烈，入夜尤甚，壮热烦渴

24. 行痹的主症是

【答案】A

25. 着痹的主症是

【答案】C

【解析】痹证的辨证，一是要辨邪气的偏盛，二是要辨别虚实。临床痹痛游走不定者为行痹，属风邪盛；痛势较甚，痛有定处，遇寒加重者为痛痹，属寒邪盛；关节酸痛、重着、漫肿者为着痹，属湿邪盛；关节肿胀，肌肤焮红，灼热疼痛为热痹，属热邪盛。关节疼痛日久，肿胀局限，或见皮下结节者为痰；关节肿胀，僵硬，疼痛不移，肌肤紫暗或瘀斑等为瘀。

26. 下列属于外科特殊之毒的是

- A. 红丝疔
- B. 失荣
- C. 药毒
- D. 水火烫伤
- E. 冻伤

【答案】C

【解析】特殊之毒包括虫毒、蛇毒、疯犬毒、药毒、食物毒和疫毒。选项A因皮肤破损感染毒邪、内有火毒凝聚。选项B病因为情志内伤、痰瘀脏毒凝结。选项D、E属外来伤害。

27. 下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是

- A. 有无麻木
- B. 有无脓液
- C. 有无出血
- D. 有无灼热
- E. 有无瘙痒

【答案】D

【解析】外科辨别阴证、阳证要点是有无灼热。

28. 脓液不多且位于组织深部时，应采用的方法是

- A. 推拿法
- B. 接触法
- C. 穿刺法
- D. 透光法
- E. 点压法

【答案】C

【解析】确认成脓方法有接触法、透光法、点压法、穿刺法、B超。排除选项A、B。选项C适用于脓液不多且位于组织深部的辨脓。透光法适用于指、趾部甲下的辨脓。选项E适用于在指（趾）部，当病灶处脓液很少的情况下的辨脓。

29. 烧伤面积的计算按中国九分法，双上肢面积占

- A. 9%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 36%
- E. 45%

【答案】B

【解析】中国九分法将全身体表面积分为11个9等份。成人头、面、颈部为9%；双上肢为 $2 \times 9\%$ ；躯干前后包括外阴部为 $3 \times 9\%$ ；双下肢包括臀部为 $5 \times 9\% + 1\% = 46\%$ 。

30. 创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

- A. 压迫性溃疡
- B. 麻风性溃疡
- C. 疮痍性溃疡
- D. 梅毒性溃疡
- E. 岩性溃疡

【答案】D

【解析】选项A发生于人体易摩擦的部位，如臀、背、足跟等处，疮面坏死不易脱落或疮口凹陷甚深，肉色不鲜，日久不易愈合。选项B初期皮肤暗紫，很快变黑并坏死，滋水、液化、腐烂，脓液有臭味，可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选项C疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，创面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。选项D创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。选项E疮面多呈翻花如岩穴，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水。

31. 乳房部脓肿切开引流正确的切口选择是

- A. 乳晕旁弧形切口
- B. 乳晕处放射状切口
- C. 乳房下缘弧形切口
- D. 以乳头为中心弧形切口
- E. 以乳头为中心放射状切口

【答案】E

【解析】成脓期局部按之有波动感或经穿刺抽脓抽得脓液者，应及时切开引流。一般采用与乳头方向呈放射状的切口，切口位置选择脓肿稍低的部位，切口长度与脓腔基底的大小基本一致，使引流通畅不致袋脓，但需避免手术损伤乳络形成乳漏。而乳晕部的浅表脓肿、乳房后的脓肿或乳房周边脓肿，则可在乳晕边缘或乳房周边作弧形切口。若脓腔较大者，必要时可在脓腔最低部位作对口引流。脓肿小而浅者可用针吸穿刺抽脓。

32. 蛇眼疔的成脓时间是

- A. 2~3天
- B. 10天左右
- C. 7~10天
- D. 3~5天
- E. 2周

【答案】A

【解析】蛇眼疔初起多局限于手指甲一侧边缘的近端处，有轻微的红肿疼痛，一般2~3天即成脓，可在指甲背面透现一点黄色或灰白色，或整个甲身内有脓液。待出脓后即肿痛除，迅速愈合；严重者脓出不畅，甲下溃空或有赘肉突出，甚至指（趾）甲脱落。

33. 患者，女，50岁。乳房局部可见一肿块，皮色不变，质硬而边界不清，性情急躁，胸闷胁胀，苔薄，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 银花甘草汤
- B. 逍遥散合桃红四物汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 神效瓜蒌散合开郁散
- E. 二仙汤合开郁散

【答案】D

【解析】乳房局部可见一肿块，皮色不变，质硬而边界不清，可诊断为乳岩，好发于

40~60岁。其人肝郁气滞，脾失健运，痰湿内生，以致气郁痰湿交阻乳络，故乳房肿块，皮色不变，质地坚硬，边界不清；肝失疏泄，故性情急躁；肝郁气滞，故胸闷胁胀；舌淡、苔薄、脉弦均为肝郁气滞之象。治法为疏肝解郁，化痰散结。方药为神效瓜蒌散合开郁散加减。

34. 下列各项中不属肉瘤特点的是

- A. 如肉之团
- B. 发展缓慢
- C. 柔韧而圆
- D. 漫肿质软
- E. 结喉一侧或两侧结块

【答案】D

【解析】肉瘤是瘤病中常见的一种，其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之团，随吞咽运动上下移动，发展缓慢，好发于青年女性及中年人。

35. 患者肛门部有物反复脱出近10年。检查：脱出物呈圆锥状，长约7cm，上可见沟纹。其诊断是

- A. 混合痔
- B. 内痔三期
- C. 一度直肠脱垂
- D. 二度直肠脱垂
- E. 三度直肠脱垂

【答案】D

【解析】直肠脱垂分度：一度脱垂，直肠黏膜3~5cm，脱出物淡红色，触之柔软，无弹性，不易出血，便后自行还纳。二度脱垂，直肠全层5~10cm，脱出物圆锥状，淡红色，表面为环状而有层次的黏膜皱襞，触之较厚，有弹性。便后有时需用手回复。三度脱垂，直肠及部分乙状结肠大于10cm，脱出物圆柱形，触之很厚。

36. 患儿，男，9岁。头皮部初起丘疹色红，灰白色鳞屑成斑，毛发干枯，容易折断，易于拔而不疼痛，已有年余，自觉痛痒。其诊断是

- A. 肥疮
- B. 牛皮癣
- C. 白秃疮
- D. 白疔
- E. 圆癣

【答案】C

【解析】选项A初起时毛发根部有小丘疹或小脓疱，有特殊臭味，由于毛囊破损，愈后留有瘢痕而局部秃发。选项B指皮肤状如牛项之皮，厚而且坚。选项C特征为头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片，病损区毛发干枯无泽，头发易剥落且无疼痛。选项D特点为表面覆盖有干燥的银色鳞屑，轻轻刮除鳞屑，可见小片血点。选项E皮损多呈钱币状，圆形，多发于股腠、外阴处。

37. 湿疮湿热蕴肤证，应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤合五味消毒饮
- B. 龙胆泻肝汤合草薢渗湿汤
- C. 小儿化湿汤
- D. 当归饮子
- E. 四物消风饮

【答案】B

【解析】湿疮湿热蕴肤证的治疗主方为龙胆泻肝汤合萹藜渗湿汤。脾虚湿蕴证，方药为除湿胃苓汤或参苓白术散加紫荆皮、地肤子、白鲜皮。血虚风燥证，方药为当归饮子或四物消风饮加丹参、鸡血藤、乌梢蛇。

38. 患者，女，26岁。3天前突发生面、颈部红肿与水疱，自觉痒痛，伴恶寒兼发热，头痛，舌苔薄黄，脉滑数。怀疑接触过敏引起，治疗应首选

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 普济消毒饮
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

【答案】C

【解析】据患者恶寒、发热等临床表现，为风寒束表证。选项A用于风热表证。选项B用于风热表证。选项C用于内有热邪，外有表证，清热解毒，疏风散邪。选项D用于湿热毒蕴证。选项E用于热毒盛证，偏于中焦热。

39. 患者，男，27岁。颈项部皮肤增厚，瘙痒反复发作1年余，局部皮肤呈苔藓化。其诊断是

- A. 风热疮
- B. 风瘙痒
- C. 牛皮癣
- D. 白屑风
- E. 慢性湿疮

【答案】C

【解析】选项A皮损分布以躯干和四肢近端为主，呈对称性。选项B没有任何原发性皮疹，瘙痒呈阵发性，久之可出现色素沉着或色素减退、湿疹样变或苔藓样变，有泛发性和局限性之分。选项C好发于颈项部、额部。皮损干燥而结实，久之融合成片，皮肤增厚，稍有脱屑，长期搔抓可使皮肤浸润肥厚，呈苔藓化。常多年不愈，易反复发作。选项D主要发于头皮。选项E多局限于某一部位，表现为皮肤肥厚粗糙，触之较硬，色暗红或紫褐，皮纹显著或呈苔藓样变。皮损表面常附有鳞屑，伴抓痕、血痂、色素沉着，发生于手关节部位者常易出现破裂，自觉疼痛，影响活动。

40. 尿道口有白色分泌物溢出，可诊断为

- A. 淋病
- B. 尿路感染
- C. 梅毒
- D. 阴道感染
- E. 尖锐湿疣

【答案】A

【解析】淋病特点：通常以尿道轻度不适起病，数小时后出现尿痛和脓性分泌物。当病变扩展至后尿道时可出现尿频、尿急。检查可见脓性黄绿色尿道分泌物，尿道口红肿，因细菌感染引起，腹股沟区淋巴结可肿大。

41. 下列哪一项为尖锐湿疣的中医病因病机

- A. 湿热秽浊由下焦前阴入侵，阻于膀胱及肝经
- B. 风热毒邪搏于肌肤而生
- C. 湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部

- D. 秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜
- E. 淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致

【答案】D

【解析】尖锐湿疣的中医病因病机是秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜。

42. 治疗子痲气滞痰凝证的代表方剂是

- A. 小金丸
- B. 橘核丸
- C. 二陈汤
- D. 抵当丸
- E. 橘核汤

【答案】B

【解析】子痲气滞痰凝证表现为附睾结节，子系粗肿，轻微触痛，或牵引少腹不适，多无全身症状，舌淡苔薄白或腻，脉弦滑。应治以疏肝理气，化痰散结。方用橘核丸加减。

(43~44 题共用选项)

- A. 缠腰火丹
- B. 抱头火丹
- C. 流火
- D. 赤游丹
- E. 内发丹毒

43. 发于躯干部的丹毒称为

【答案】E

44. 发于小腿部的丹毒称为

【答案】C

【解析】丹毒是以患部突然皮肤鲜红成片，色如涂丹，灼热肿胀，迅速蔓延为主要表现的急性感染性疾病。本病发无定处，生于胸腹腰胯部者，称内发丹毒；发于头面部者，称抱头火丹；发于小腿足部者，称流火；新生儿多生于臀部，称赤游丹。

(45~46 题共用选项)

- A. 阳和汤
- B. 桃红四物汤
- C. 顾步汤
- D. 人参养荣汤
- E. 附桂八味丸

45. 治疗脱疽寒湿阻络证，应首选的方剂是

【答案】A

46. 治疗脱疽热毒伤阴证，应首选的方剂是

【答案】C

【解析】脱疽内治法中，寒湿阻络证用阳和汤。血脉瘀阻证用桃红四物汤。湿热毒盛证用四妙勇安汤。热毒伤阴证用顾步汤。气阴两虚证用黄芪鳖甲汤。

(47~48 题共用选项)

- A. 程氏萆薢分清饮
- B. 三金排石汤
- C. 金铃子散合石韦散
- D. 十全大补汤
- E. 八正散或龙胆泻肝汤

47. 治疗尿石症之气血瘀滞证，应首选的方剂是

【答案】C

48. 治疗尿石症之湿热蕴结证，应首选的方剂是

【答案】B

【解析】尿石症的气血瘀滞证，应治以理气活血，通淋排石，选用金铃子散合石韦散加减。湿热蕴结证，应治以清热利湿，通淋排石，选用三金排石汤加减。

(49~50 题共用选项)

A. 五味消毒饮

B. 仙方活命饮

C. 黄连解毒汤

D. 犀角地黄汤

E. 清骨散

49. 疮疡内治，清气分热之常用方剂是

【答案】C

50. 疮疡内治，清血分热之常用方剂是

【答案】D

【解析】疮疡内治，清气分热之常用方剂是黄连解毒汤。疮疡内治，清血分热之常用方剂是犀角地黄汤。

51. 李某，女，36岁，已婚，孕妇。末次月经的时间为2019年8月29日，其预产期时间为

A. 2020年5月5日

B. 2020年5月6日

C. 2020年5月7日

D. 2020年6月5日

E. 2020年6月6日

【答案】D

【解析】现代推算预产期的公式是：按末次月经的第一天算起，月数加9（或减3），日数加7（阴历则加14）。

52. 妇人产后几天红恶露可干净

A. 1~2天

B. 3~4天

C. 4~5天

D. 5~6天

E. 6天

【答案】B

【解析】恶露是产后自子宫排出的余血浊液。先是暗红色的血性恶露，也称红恶露，持续3~4天干净；后渐变淡红，量由多渐少，称为浆液性恶露，7~10天干净；继后渐为不含血色的白恶露，2~3周干净。如果血性恶露10天以上仍未干净，应考虑子宫复旧不良或感染，当予以诊治。

53. 与月经产生关系最密切的脏腑是

A. 心、肝、脾

B. 肾、肺、脾

C. 肾、肝、心

D. 肾、肝、脾

E.心、肝、肺

【答案】D

【解析】肾藏精化气，为天癸之源、冲任之本，气血阴阳之根，肾气旺盛，使天癸泌至；肝肾同源，精血同源，相互化生，肝血充足，气机条达，则经候如期；脾主运化，气血生化之源，脾胃健运，则血海充盈，血循常道。

54. 月经先后不定期，经行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，暖气少食，苔薄白，脉弦。应首选的方剂是

- A. 固阴煎
- B. 半夏泻心汤
- C. 逍遥丸
- D. 归脾汤
- E. 六味地黄丸

【答案】C

【解析】主症为月经先后不定期，伴经行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，暖气少食，苔薄白，脉弦。辨证为月经先后无定期之肝郁证。治法为疏肝理气调经。方剂为逍遥散。选项A 固阴煎用于月经先后无定期之肾虚证。

55. 月经先后无定期的主要发病机制是

- A. 肝郁气滞，疏泄失调
- B. 肾气不足，封藏失职
- C. 脾气虚弱，统摄无权
- D. 湿热下注，任带不固
- E. 气血失调，血海蓄溢失常

【答案】E

【解析】月经先后无定期的发病机制，主要是肝肾功能失调，冲任功能紊乱，血海蓄溢失常。其病因多为肝郁、肾虚和脾虚。

56. 治疗崩漏之实热证，应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 固本止崩汤
- C. 清热固经汤
- D. 清热调血汤
- E. 左归丸

【答案】C

【解析】崩漏实热证治以清热凉血，固冲止血，主方为清热固经汤。选项A 保阴煎用于月经过多之血热证。选项B 固本止崩汤用于崩漏之脾虚证。选项E 左归丸用于崩漏之肾阴虚证。

57. 经行乳房胀痛肝肾亏虚证的治法是

- A. 舒肝养血，和胃通络
- B. 温肾养阴，和胃通络
- C. 疏肝理气，和胃通络
- D. 滋肾养肝，和胃通络
- E. 补肾健脾，和胃通络

【答案】D

【解析】经行乳房胀痛肝肾亏虚证症见经行或经后两乳作胀作痛，乳房按之柔软无块，月经量少，色淡，两目干涩，咽干口燥，五心烦热，舌淡或舌红少苔，脉细数。治法为滋肾

养肝，和胃通络。

58. 瘀滞胞宫不孕症的治疗应首选的方剂是

- A. 理冲汤
- B. 失笑散
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

【答案】C

【解析】不孕症之瘀滞胞宫证证候：婚久不孕，月经多推后或周期正常，经来腹痛，甚或呈进行性加剧，经量多少不一，经色紫黯，有血块，块下痛减；有时经行不畅，淋漓难净，或经间出血；或肛门坠胀不适，性交痛；舌质紫黯或舌边有瘀点，苔薄白，脉弦或弦细涩。治法：逐瘀荡胞，调经助孕。方药：少腹逐瘀汤。

59. 患者，女，29岁，已婚。月经过期半个月，尿妊娠试验(+)，左下腹隐痛，双合诊触及左侧附件可触及界限不清的包块，压痛(+)，反跳痛(+)，B超提示：宫腔未见妊娠囊，腹痛拒按，但逐渐减轻，兼有少量阴道流血，血压平稳，脉细缓。现阶段处理首选的方法是

- A. 寿胎丸
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 生脉散合宫外孕I号方
- D. 宫外孕I号方
- E. 宫外孕II号方

【答案】D

【解析】异位妊娠已破损期不稳定型。不稳定型证候：腹痛拒按，腹部有压痛及反跳痛，但逐渐减轻，可触及界限不清的包块，兼有少量阴道流血，血压平稳，脉细缓。治法：活血祛瘀，佐以益气。方药：宫外孕I号方。

60. 产后小便不通的基本病机是

- A. 气虚冲任不固
- B. 脾肺气虚，传导无力
- C. 膀胱气化不利
- D. 膀胱失约
- E. 脾肾阳虚，水湿不化

【答案】C

【解析】产后小便不通的主要病机是膀胱气化失司所致。若脾肺气虚，肾阳不足，气机阻滞或瘀血阻滞，可导致膀胱气化失常，发为小便不通。常见的病因有气虚、肾虚和血瘀。

61. 产后缺乳，面色无华，气血虚弱，应首选的方剂是

- A. 通乳丹
- B. 下乳涌泉散
- C. 苍附导痰丸
- D. 漏芦散
- E. 补中益气汤

【答案】A

【解析】缺乳之气血虚弱证。治法为补气养血，佐以通乳，用通乳丹。选项B下乳涌泉散用于缺乳之肝郁气滞证。选项C苍附导痰丸合选项D漏芦散用于产后缺乳之痰浊阻滞证。

62. 产后三急是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗

- B. 高热、昏迷、自汗
- C. 心悸、气短、抽搐
- D. 尿闭、便难、冷汗
- E. 下血、腹痛、心悸

【答案】A

【解析】产后的常见病和危重症可概括为三病、三冲、三急。三急是指呕吐、盗汗、泄泻。

63. 患者，女，49岁。月经或前或后，烘热出汗，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红苔薄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 左归丸合二至丸
- B. 内补丸
- C. 肾气丸
- D. 两地汤合二至丸
- E. 二仙汤

【答案】A

【解析】七七之年，肾阴不足，天癸渐竭，乙癸同源，肝肾阴虚，遂发绝经前后诸证。烘热汗出，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红，脉细数均为肾阴虚之象。辨证属绝经前后诸证之肾阴虚证。治法为滋阴补肾。方剂为左归丸。选项B内补丸、选项C肾气丸主治肾阳虚证。选项D两地汤合二至丸主治肾阴虚证。选项E二仙汤治疗肾阴阳俱虚证。

64. 患者月经停闭半年，神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄，舌淡，苔薄，脉沉缓。治疗应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 归肾丸
- C. 参芪四物汤
- D. 人参养荣汤
- E. 大补元煎

【答案】D

【解析】屡伤脾胃，生化之源不足，或久病大病，营血亏虚，血虚气弱，冲任不充，不能按时满溢，故月经周期延迟、量少、色淡红质薄。脏腑气血进一步损伤，血海空虚，无血可下而月经停闭。本题题干均为气血虚弱之症。治法为益气养血调经。方剂为人参养荣汤。

65. 患者，女，45岁。月经不规律8个月，现阴道出血40天，量时多时少，近3天量极多、色淡、质稀，伴气短神疲，面浮肢肿，舌淡苔薄白，脉缓弱。治疗应首选的方剂是

- A. 举元煎
- B. 补中益气汤
- C. 固本止崩汤
- D. 清热固经汤
- E. 保阴煎

【答案】C

【解析】由患者症状可诊断为崩漏之脾虚证。治法为补气摄血，固冲止崩。方剂为固本止崩汤或固冲汤。选项A举元煎主治气虚下陷，血崩血脱，亡阳垂危等证。选项B补中益气汤主治清阳下陷，中气不足之证。选项D清热固经汤主治崩漏之血热实证。选项E保阴煎主治阴虚内热动血。

66. 患者，女，36岁，已婚。经行肢体肿胀，按之随手而起，经色暗红有块，伴脘闷肋胀，善叹息，舌紫暗，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 苓桂术甘汤
- B. 参苓白术散
- C. 八物汤
- D. 肾气丸
- E. 丹栀逍遥丸

【答案】C

【解析】气滞情志久郁，经行不畅，气机受阻，升降失司，水道通调不利，水湿不运，水泛为肿，按之随手而起。气滞则血瘀，经色暗红有块，舌紫暗，脉弦涩。腕闷胁胀，善叹息，均属于气滞之象。故辨证属经行水肿之气滞血瘀证。治法为理气行滞，养血调经。方剂为八物汤。选项D肾气丸合选项A苓桂术甘汤主治经行浮肿之脾肾阳虚证。选项B参苓白术散主治中气下陷证。选项E丹栀逍遥散主治肝脾不和证。

67. 患者，女，31岁，已婚。曾孕3次，均自然流产，平日头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，现又妊娠33天，夜尿频多，面色晦暗，舌淡苔白，脉沉弱。治疗应首选的方剂是

- A. 加味阿胶汤
- B. 补肾安胎饮
- C. 泰山磐石散
- D. 补肾固冲丸
- E. 以上均非

【答案】D

【解析】患者曾堕胎3次，可诊为滑胎病。同时，头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，夜尿频多，属肾气不足证。选方补肾固冲丸。补肾安胎饮用于滑胎之气血两虚证。

68. 患者，女，24岁，已婚。妊娠6个半月，面目四肢浮肿，皮薄光亮，按之没指，纳呆便溏，舌胖嫩苔黄腻，脉滑缓无力。治疗应首选的方剂是

- A. 茯苓导水汤
- B. 真武汤
- C. 天仙藤散
- D. 猪苓汤
- E. 白术散

【答案】E

【解析】患者妊娠期间面目四肢浮肿，可诊为子肿。浮肿部位皮薄光亮，按之没指，纳呆便溏，是脾虚不运所致，应为脾虚证。治法为健脾利水。方剂为白术散加砂仁。选项B治疗子肿之肾虚证。选项C治疗子肿之气滞证。

(69~70题共用选项)

- A. 血热证
- B. 脾肾虚弱证
- C. 肾阳亏虚证
- D. 气血虚弱证
- E. 血瘀证

69. 胎动不安可用胎元饮治疗的证候是

【答案】D

70. 滑胎可用泰山磐石散治疗的证候是

【答案】D

【解析】胎元饮补气养血，固肾安胎，用于气血虚弱导致的胎动不安。泰山磐石散益气养血，固冲安胎，适用于气血虚弱导致的滑胎。

(71~72 题共用选项)

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 季经
- D. 避年
- E. 居经

71. 妇女终身不来潮而能受孕者，称为

【答案】B

【解析】选项 A 激经为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。选项 B 暗经为女性终生不潮而却能受孕者。选项 C 居经或选项 E 季经为月经 3 个月一潮者。选项 D 避年为月经 1 年一行者。

72. 受孕初期仍按月经少量出血而无损胎儿者，称为

【答案】A

【解析】选项 A 激经为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。选项 B 暗经为女性终生不潮而却能受孕者。选项 C 居经或选项 E 季经为月经 3 个月一潮者。选项 D 避年为月经 1 年一行者。

73. 下列月经病的治疗，错误的是

- A. 重在治本调经
- B. 分清先病和后病
- C. 急则治标，缓则治本
- D. 顺应不同年龄阶段论治
- E. 多用辛温暖宫之品

【答案】E

【解析】月经病的治疗原则：①治本调经。②分清先病和后病的论治原则。③本着“急则治其标，缓则治其本”的原则。

(74~75 题共用选项)

- A. 血瘀
- B. 风寒
- C. 肾虚
- D. 血虚
- E. 气虚

74. 产后肢体关节疼痛，屈伸不利，痛无定处。其证候是

【答案】B

75. 产后遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸。其证候是

【答案】D

【解析】肢体关节疼痛，屈伸不利，痛无定处是风寒证的证候，遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸，是血虚证的主要证候。

76. 小儿的脏腑娇嫩，尤其突出的是

- A. 肝、脾、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 心、肺、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 肺、肝、肾

【答案】B

【解析】小儿脏腑娇嫩，形气未充，具体表现在肌肤柔嫩，腠理疏松，气血未充，肺脾娇弱，肾气未固，神气怯弱，筋骨未坚等方面。五脏六腑功能皆属不足，尤其以肺、脾、肾三脏更为突出。

77. 由于小儿为“纯阳之体”“稚阴之体”，临床容易表现出的证候是

- A. 瘀证
- B. 实证
- C. 寒证
- D. 虚证
- E. 热证

【答案】E

【解析】由于小儿为稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩，卫外功能较成人为弱，又寒温不知自调，因而更易被“六淫”邪气所伤，产生各种肺系疾病；小儿脏腑娇嫩，又易被燥邪、暑邪所伤，形成肺胃阴津不足、气阴两伤等病证；小儿为纯阳之体，六气易从火化，小儿伤于外邪以热性病证为多。

78. 小儿细动作的发育，正常会拇指、食指拾东西的年龄是

- A. 13~14个月
- B. 7~个月
- C. 11~12个月
- D. 5~6个月
- E. 9~10个月

【答案】E

【解析】手指精细运动的发育过程为：新生儿时双手握拳；3~4个月时可自行玩手，并企图抓东西；5个月时眼与手的动作取得协调，能有意识地抓取面前的物品；5~7个月时出现换手与捏、敲等探索性的动作；9~10个月时可用拇指、食指拾东西；12~15个月时学会用匙，乱涂画；18个月时能摆放2~3块方积木；2岁时会粗略地翻书页；3岁时会穿简单的衣服。

79. 下列除哪项外，均属病理性胎黄

- A. 黄疸持续加深
- B. 黄疸3周后仍不消退
- C. 黄疸退而复现
- D. 生后24小时内出现
- E. 黄疸10~14天消退

【答案】E

【解析】生理性胎黄大多在生后2~3天出现，4~6天达高峰，2周消退，早产儿持续时间较长，除有轻微食欲不振外，一般无其他临床症状。病理性胎黄常在生后24小时内出现黄疸，黄疸持续加深，或消退后复现，3周后仍不消退。黄疸10~14天消退不属病理性胎黄。

80. 小儿哮喘反复发作，主要是因为

- A. 肾阳亏虚
- B. 脾虚湿盛
- C. 肺气不足
- D. 感触外邪
- E. 宿痰伏肺

【答案】E

【解析】哮喘的病机关键在痰伏于肺，形成夙根，遇触即发。夙痰久伏造成哮喘反复发作。哮喘发作的机制，在于外因引动伏痰，痰气相合。发作之时，痰随气升，气因痰阻，相互搏结，壅塞气道，气息不畅，因而产生呼吸喘促，呼气延长，痰随呼吸气息升降，发出哮喘鸣之声。

81. 患儿10天。啼哭不安，不欲吮乳，口舌满布白屑，唇舌俱红，小便短赤。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 泻黄散
- C. 竹叶石膏汤
- D. 知柏地黄丸
- E. 清热泻脾散

【答案】 E

【解析】胎热内蕴，或感受秽毒之邪，蕴积心脾，热毒循经上行，熏灼口舌，见口腔满布白屑，心热移于小肠，则小便短赤。

82. 疳积的主要病机是
- A. 脾胃失和，纳化失健
 - B. 脾胃虚损，积滞内停
 - C. 肝血不足，筋脉失养
 - D. 脾胃虚衰，气血两败
 - E. 肾阳虚衰，精髓不充

【答案】 B

【解析】疳症的主要病机是脾胃受损，气液耗伤。病初是以脾胃失和，运化不健的证候为主，病情较浅，正虚不著的疳气阶段；继而脾胃虚损，运化不及，积滞内停，则为虚中夹实的疳积证候。

83. 小儿汗证营卫失调证的汗出特点是
- A. 汗出肤热，汗渍色黄
 - B. 汗出遍身而不温
 - C. 大汗淋漓，或汗出如油
 - D. 头部、手足心汗出明显
 - E. 头部、肩背部汗出明显

【答案】 B

【解析】汗证营卫失调证的临床表现：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。

84. 注意力缺陷多动障碍好发于
- A. 学龄前期儿童
 - B. 幼儿
 - C. 学龄期儿童
 - D. 新生儿
 - E. 青少年

【答案】 C

【解析】注意力缺陷多动障碍以注意力不集中，自我控制差，动作过多，情绪不稳，冲动任性，伴有学习困难，但智力正常或基本正常为主要临床特征。本病男孩多于女孩，多见于学龄期儿童。

85. 可出现草莓舌的疾病是

- A. 丹痧
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 贫血
- D. 维生素 A 缺乏
- E. 结核

【答案】A

【解析】舌光无苔，舌生红刺，状如草莓，称为“草莓舌”。选项 B、D、C、E 无草莓舌表现。

86. 适宜用清热解毒，软坚散结法治疗的流行性腮腺炎的证候是

- A. 毒窜睾腹证
- B. 热毒壅盛证
- C. 邪陷厥阴证
- D. 邪陷心肝证
- E. 邪犯少阳证

【答案】B

【解析】痄腮热毒壅盛证的治法为清热解毒，软坚散结，方用普济消毒饮。

87. 患儿，女，5岁。高热不退，喉核赤肿，溃烂化脓，吞咽困难，口干口臭，大便干结，小便短黄，舌红，苔黄，脉数。应首选的方剂是

- A. 牛蒡甘桔汤
- B. 荆防败毒散
- C. 普济消毒饮
- D. 养阴清肺汤
- E. 银翘马勃散

【答案】A

【解析】患儿喉核赤肿，溃烂化脓，吞咽困难，辨病为乳蛾；高热不退，口干口臭，大便干结，小便黄少，舌红，苔黄，脉数，辨证为热毒炽盛证。治法为清热解毒，利咽消肿，方用牛蒡甘桔汤。

88. 患儿，女，5岁。心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，胸闷呕恶，面色晦暗，唇甲发绀，舌体胖，舌质紫暗，或舌边尖见有瘀点，舌苔腻，脉滑或结代。治疗应首选的方剂是

- A. 葛根芩连汤
- B. 炙甘草汤合生脉散
- C. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散
- D. 银翘散
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

【答案】C

【解析】根据患儿症状可诊断为病毒性心肌炎之痰瘀阻络证，治法为豁痰化瘀，宁心通络，方用瓜蒌薤白半夏汤合失笑散。

89. 患儿，6岁。小便频数日久，淋漓不尽，尿液不清，畏寒怕冷，手足不温，大便稀薄，舌苔薄腻。治疗应首选的方剂是

- A. 菟丝子散
- B. 金匮肾气丸
- C. 缩泉丸
- D. 补中益气汤

E. 八正散

【答案】C

【解析】辨证属脾肾气虚证，治以温补脾肾、升提固摄，方用缩泉丸。八正散主治湿热下注；菟丝子散主治肾气不足之遗尿；补中益气汤主治肺脾气虚之遗尿；金匱肾气丸温补肾阳，化气行水。

90. 麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

- A. 热、咳、涕、泪，麻疹黏膜斑
- B. 热、烦、汗出，皮疹透发
- C. 疹没脱屑，低热不退
- D. 热、烦、渴、饮，疹稠色暗，神昏抽搐
- E. 热、咳、喘、痰，疹稠色暗

【答案】A

【解析】麻疹初期，邪犯肺胃，肺气失宣，则见发热，咳嗽，流涕等似感冒症状。邪毒由肺入脾，里热炽盛则见高热口渴等。

(91~92 题共用选项)

- A. 大定风珠
- B. 缓肝理脾汤
- C. 十全大补汤
- D. 银翘散
- E. 人参五味子汤

91. 治疗小儿慢惊风脾虚肝亢证，应首选的方剂是

【答案】B

92. 治疗小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证，应首选的方剂是

【答案】E

【解析】慢惊风脾虚肝亢证的治法为温中健脾，缓肝理脾，方用缓肝理脾汤。肺炎喘嗽肺脾气虚证的治法为补肺益气，健脾化痰，方用人参五味子汤。

(93~94 题共用备选答案)

- A. 养阴清热，补益肺肾
- B. 温卫和营，益气固表
- C. 补肺固表，健脾益气
- D. 温补肾阳，健脾益气
- E. 泻肺祛痰，补肾纳气

93. 小儿反复呼吸道感染脾肾两虚证的治法为

【答案】D

94. 小儿反复呼吸道感染肺脾气虚证的治法为

【答案】C

【解析】反复呼吸道感染脾肾两虚证的治法为温补肾阳，健脾益气，方用金匱肾气丸合理中丸；肺脾气虚证的治法为补肺固表，健脾益气，方用玉屏风散合六君子汤。

(95~96 题共用备选答案)

- A. 大便稀溏，色淡不臭，食后作泻
- B. 质稀如水，心烦不安，目眶及凶门凹陷
- C. 大便清稀，澄澈清冷，完谷不化
- D. 泻下急迫，量多次频，气味秽臭
- E. 大便清稀，夹有泡沫，肠鸣腹痛

95. 泄泻风寒泻的临床表现是

【答案】E

96. 泄泻脾虚泻的临床表现是

【答案】A

【解析】风寒泻的临床表现：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。脾虚泻的临床表现：大便稀溏，色淡不臭，多于饭后作泻，时轻时重，面色萎黄，形体消瘦，神疲倦怠，舌淡苔白，脉缓弱，指纹淡。

(97~98 题共用备选答案)

A. 脾、胃

B. 脾、肾

C. 心、脾

D. 肝、脾

E. 心、肝

97. 眼疳的病位是

【答案】D

98. 骨疳的病位是

【答案】A

【解析】疳证的主要病变部位在脾胃，其基本病理改变为脾胃受损，津液消亡。若脾病及肝，肝失所养，肝阴不足，不能上承于目，而见视物不清，夜盲目翳者，则谓之眼疳。脾病及肾，肾精不足，骨失所养，久致骨骼畸形者，称为骨疳。

99. 治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是

A. 驱虫粉

B. 化虫丸

C. 追虫丸

D. 使君子散

E. 乌梅丸

【答案】D

【解析】蛔虫病肠虫证的治法为驱蛔杀虫，调理脾胃，方用使君子散。

100. 患儿，5岁。臀部及下肢紫癜1天，呈对称痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

A. 大补阴丸

B. 化斑汤

C. 归脾汤

D. 连翘败毒散

E. 犀角地黄汤

【答案】D

【解析】紫癜色鲜红，瘙痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数，为风热伤络之表现。治以疏风散邪、清热凉血，方用连翘败毒散。犀角地黄汤主治血热妄行；归脾汤主治气不摄血；化斑汤非主治紫癜；大补阴丸主治阴虚火旺。