

2021 年 6 月临床执业医师月度考试（第三单元）

- 1、（A1 型选择题）食管癌的 X 线表现不包括
- A.管壁僵硬
 - B.黏膜皱襞增粗
 - C.黏膜呈串珠样改变
 - D.黏膜皱襞断裂
 - E.充盈缺损
- 2、（A1 型选择题）蛋白质-热能营养不良常见并发的维生素缺乏是
- A.维生素 A
 - B.维生素 B
 - C.维生素 C
 - D.维生素 D
 - E.维生素 E
- 3、（A1 型选择题）金黄色葡萄球菌感染局限化的有关物质是
- A.凝固酶

- B.肠毒素
- C.杀白细胞素
- D.表皮溶解素
- E.葡萄球菌 A 蛋白

4、（A1 型选择题）试验动物出生后即去脂饮食，将引导致下列哪种脂质缺乏

- A.磷脂酰胆碱
- B.前列腺素
- C.鞘磷脂
- D.胆固醇
- E.甘油三酯

5、（A1 型选择题）尿路感染诊断的最重要依据是

- A.有尿频、尿急、尿痛症状
- B.腰痛和肾区叩痛
- C.有真性细菌尿
- D.有红细胞管型

E.有白细胞尿

6、（A1 型选择题）女性青春期最早出现的是

A.脂肪蓄积

B.乳房发育

C.体格发育

D.骨盆变化

E.月经来潮

7、（A1 型选择题）关于左心功能不全、肺循环淤血的主要临床表现，下列哪项说法是错误的

A.咳嗽、咳痰，痰为浆液性，呈白色泡沫状

B.肺微小动脉压增高，血浆外渗，痰中带血

C.劳力性呼吸困难，休息即可缓解

D.支气管痉挛，发作性哮喘

E.夜间阵发性呼吸困难

8、（A1 型选择题）下列疾病中由内分泌疾病而引起尿量增多的是

A.摄水过多

B.慢性肾小球肾炎

C.急性肾衰多尿期

D.中枢性尿崩症

E.慢性肾盂肾炎

9、（A1 型选择题）下列疾病中进行脾切除治疗最有效的是

A.再障

B.PNH

C.海洋性贫血

D.遗传性球形细胞增多症

E.糖皮质激素治疗无效的原发性自身免疫性溶血性贫血

10、（A1 型选择题）高血压时的肾脏病理变化表现为

A.肾脏单发性贫血性梗死

B.肾的多发性大瘢痕形成

C.肾动脉动脉瘤形成

D.颗粒型固缩肾

E.肾脏淤血

11、（A1 型选择题）肾球囊壁层上皮细胞增生是哪类肾小球疾病的病理表现

- A.急性肾炎
- B.急进性肾小球肾炎
- C.膜性肾病
- D.脂性肾病
- E.膜增生性肾小球肾炎

12、（A1 型选择题）下列疾病中，最容易并发骨筋膜室综合征的是

- A.股骨干骨折
- B.桡骨远端骨折
- C.肩关节后脱位
- D.肱骨髁上骨折
- E.髋关节后脱位

13、（A1 型选择题）人类免疫缺陷病毒（HIV）不易传播的途径是

- A.性传播
- B.器官移植

C.母婴传播

D.生活接触

E.不洁注射

14、（A1 型选择题）重度新生儿寒冷损伤综合征患儿复温时间为

A.0~1 小时

B.3~6 小时

C.6~12 小时

D.12~24 小时

E.24~36 小时

15、（A1 型选择题）胆汁中与消化有关最重要的物质是

A.胆盐

B.消化酶

C.卵磷脂

D.胆色素

E.脂肪酸

16、（A1 型选择题）区分血尿与血红蛋白尿的主要方法是

- A.观察血尿颜色
- B.做尿胆原测验
- C.做尿沉渣镜检
- D.做尿二杯试验
- E.做尿潜血试验

17、（A1 型选择题）诊断卵巢肿瘤最常用的辅助检查为

- A.B 超
- B.CT 检查
- C.腹部平片
- D.腹腔镜检
- E.细胞学检查

18、（A1 型选择题）炎症时血小板激活因子的作用不包括

- A.激活血小板
- B.促进白细胞吞噬
- C.对白细胞有趋化作用
- D.促进白细胞聚集和黏着

E.使血管通透性增加

19、（A1 型选择题）下列脏器通常易发生凝固性坏死的是

A.肾

B.脑

C.肠

D.子宫

E.肺

20、（A1 型选择题）属于黏膜免疫系统的免疫器官是

A.胸腺

B.脾脏

C.扁桃体

D.骨髓

E.肝脏

21、（A1 型选择题）患者将地上的草绳看成一条大蛇，这种表现是

A.幻觉

B.错觉

- C.感觉过敏
- D.关系妄想
- E.象征性思维

22、（A1 型选择题）髓关节脱位的最常见类型是

- A.前脱位
- B.后脱位
- C.中心型脱位
- D.合并髌臼骨折的脱位
- E.合并股骨头骨折的脱位

23、（A1 型选择题）肱骨髁上骨折，向尺侧侧方移位，未能矫正时，最常见的后遗症是

- A.肘关节后脱位
- B.尺神经损伤
- C.肘内翻畸形
- D.肘关节前脱位
- E.前壁缺血性肌挛缩

24、（A1 型选择题）引起尖锐湿疣的病原体是

- A. EB 病毒
- B. 巨细胞病毒
- C. 人乳头瘤病毒
- D. 人免疫缺陷病毒
- E. 水痘带状疱疹病毒

25、（A1 型选择题）胎盘的组成

- A. 羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜
- B. 羊膜、叶状绒毛膜和包蜕膜
- C. 羊膜、平滑绒毛膜和包蜕膜
- D. 羊膜、平滑绒毛膜和底蜕膜
- E. 羊膜、平滑绒毛膜和直蜕膜

26、（A1 型选择题）使用化妆品后 24 小时后出现面部水肿、渗出、痒痛，应属于

- A. I 型变态反应
- B. II 型变态反应

C.Ⅲ型变态反应

D.Ⅳ型变态反应

E.以上都不是

27、（A1 型选择题）甲型肝炎病程中，传染性最强的阶段是

A.潜伏期

B.黄疸前期

C.恢复期

D.慢性期

E.痊愈后

28、（A1 型选择题）丙型肝炎病毒下列叙述不正确的是

A.目前体外培养困难

B.是输血后肝炎的主要病原体之一

C.感染后引起严重肝病甚至暴发性肝炎

D.多为隐性感染，一旦发病，极易发展成慢性过程

E.与肝硬化和肝癌关系密切

29、（A1 型选择题）阻塞性肺不张时不会出现的体征是

- A.胸廓可有塌陷
- B.气管向患侧移位
- C.病变部位触觉震颤增强
- D.病变部位叩诊呈浊音
- E.病变部位呼吸音减弱

30、（A1 型选择题）需要与妊娠晚期合并急性病毒性肝炎鉴别不包括

- A.妊娠综合征
- B.药物性肝损害
- C.妊娠期急性脂肪肝
- D.妊娠剧吐引起的肝损害
- E.妊娠期高血压引起的肝损害

31、（A1 型选择题）骨关节炎镇痛治疗首选的是

- A.口服阿司匹林
- B.口服氨基葡萄糖
- C.口服对乙酰氨基酚
- D.关节内注射激素

E.关节内注射透明质酸钠

32、（A1 型选择题）溃疡性结肠炎患者最典型的症状是

A.腹泻、腹痛、脓血便

B.腹泻与便秘交替伴发热

C.排便困难伴腹痛，无便血

D.硬结便带血，便与血不混

E.腹痛，便后可缓解，无便血

33、（A1 型选择题）对肱骨外上髁炎有诊断意义的检查是

A.Mills 征

B.Thomas 征

C.Spurling 征

D.Dugas 征

E.“4”字试验

34、（A1 型选择题）Chance 骨折是指胸腰椎

A.骨折-脱位

B.屈曲-牵拉性损伤

C.单纯性压缩骨折

D.水平状撕裂性损伤

E.稳定性爆破型骨折

35、（A1 型选择题）胫骨平台骨折，最容易引起的并发症是

A.骨化性肌炎

B.骨折不愈合

C.骨筋膜室综合征

D.缺血性骨坏死

E.创伤性关节炎

36、（A1 型选择题）髌关节脱位的最常见类型

A.前脱位

B.后脱位

C.中心型脱位

D.合并髌臼骨折的脱位

E.合并股骨头骨折的脱位

37、（A1 型选择题）肾病综合征出现大量蛋白尿的主要机制是

- A. 肾血流量增加
- B. 肾静脉回流障碍
- C. 肾小球上皮细胞足突裂隙增大
- D. 肾小球过滤膜电荷屏障受损
- E. 肾小球过滤膜内皮窗孔径异常过大

38、（A1 型选择题）掌深部感染处理原则不正确的是

- A. 纵轴切开引流
- B. 抬高患侧上肢
- C. 切口不超过手掌远侧横纹
- D. 切口常选在手背部肿胀明显处
- E. 早期静脉滴注大剂量青霉素

39、（A1 型选择题）月经来潮前性激素的生理变化是

- A. 孕激素出现两个高峰
- B. 只出现孕激素高峰
- C. 只出现雌激素高峰
- D. 出现雌、孕激素高峰

E.雌、孕激素均不出现高峰

40、（A1 型选择题）胰腺癌与胆总管结石的主要鉴别点是

A.进行性黄疸

B.肝功能改变

C.淀粉酶改变

D.胆囊肿大

E.皮肤瘙痒

41、（A1 型选择题）代表乙型肝炎病毒（HBV）复制最重要的血清指标是

A.HBsAg（+）

B.HBeAg（+）

C.抗 HBc（+）

D.抗 HBs（+）

E.抗 HBe（+）

42、（A1 型选择题）与宫颈癌的发生密切相关的是

A.人乳头瘤病毒

B.麻疹病毒

- C. 禽流感病毒
- D. 乙型肝炎病毒
- E. 以上都不正确

43、（A1 型选择题）药物不良反应

- A. 一般都很严重
- B. 发生在治疗剂量
- C. 发生在大剂量情况下
- D. 可以避免一般都很严重
- E. 产生原因与药物作用的选择性高有关

44、（A1 型选择题）早期胃癌的概念是

- A. 未侵及肌层
- B. 只限于黏膜层
- C. 无淋巴结转移肿块
- D. 直径在 2cm 以下
- E. 无纵隔淋巴结转移

45、（A1 型选择题）DiGeorge 综合症的免疫学表现是

- A.补体缺陷
- B.吞噬细胞缺陷
- C.B 细胞缺陷
- D.T 细胞缺陷
- E.联合免疫缺陷

46、（A1 型选择题）T3 期多发性膀胱肿瘤的治疗方法是

- A.放疗
- B.膀胱部分切除术
- C.膀胱内灌注化疗
- D.经尿道膀胱肿瘤切除术
- E.根治性膀胱全切术

47、（A1 型选择题）伤寒最严重的并发症是

- A.肺炎
- B.肠穿孔
- C.肠出血
- D.中毒性心肌炎

E.血栓性静脉炎

48、（A1 型选择题）外阴鳞状上皮增生局部治疗的主要药物是

A.雌激素

B.糖皮质激素

C.抗病毒药物

D.雄激素

E.抗生素

49、（A1 型选择题）符合继发性腹膜炎腹痛特点的是

A.阵发性全腹绞痛

B.剧烈、持续性全腹痛

C.逐渐加重的阵发性腹痛

D.疼痛与进食有关

E.高热后全腹痛

50、（A1 型选择题）血清壁细胞抗体阳性多见的疾病是

A.慢性萎缩性胃体胃炎

B.慢性萎缩性胃窦胃炎

C.急性糜烂性胃炎

D.胃溃疡

E.胃癌

51、（A1 型选择题）脊髓灰质炎疫苗初种的年龄是

A.2 个月

B.3 个月

C.4 个月

D.5 个月

E.6 个月

52、（A1 型选择题）癫痫患者服用抗癫痫药切忌

A.用药剂量太小

B.同时合用两种药

C.只在夜间服

D.突然停药

E.药物价格太高

53、（A1 型选择题）急性苯中毒主要损害的是

A.骨骼系统

B.血液系统

C.神经系统

D.消化系统

E.呼吸系统

54、（A1 型选择题）无症状性细菌尿最常见的致病菌是

A.粪肠球菌

B.大肠埃希菌

C.葡萄球菌

D.铜绿假单胞菌

E.变形杆菌

55、（A1 型选择题）慢性活动性胃炎最主要的病因是

A.药物

B.应激

C.自身免疫

D.饮食和环境因素

E.幽门螺杆菌感染

56、（A1 型选择题）确诊系统性红斑狼疮最有价值的自身抗体是

A.抗 Sm 抗体

B.抗环瓜氨酸肽抗体

C.抗 SSA 抗体

D.抗 Scl-70 抗体

E.抗核抗体

57、（A1 型选择题）随境转移主要见于

A.躁狂症

B.适应障碍

C.精神分裂症

D.精神发育迟滞

E.脑器质性精神障碍

58、（A1 型选择题）心理冲突的类型不包括下列哪项

A.双避冲突

B.双趋冲突

C.趋避冲突

D.矛盾冲突

E.多重趋避冲突

59、（A1 型选择题）患支原体肺炎的患儿，治疗首选的抗生素是

A.红霉素

B.青霉素

C.氨苄西林

D.先锋霉素

E.庆大霉素

60、（A1 型选择题）用青霉素 G 治疗钩端螺旋体病时，应注意

A.首次给予大剂量

B.首次给予小剂量

C.与链霉素联合应用

D.与磺胺嘧啶联合应用

E.疗程 10 天以上

61、（A1 型选择题）霍乱弧菌最重要的致病物质是

- A.菌毛
- B.鞭毛
- C.荚膜
- D.内毒素
- E.霍乱肠毒素

62、（A1型选择题）真性和假性球麻痹症状的鉴别点是

- A.吞咽困难
- B.发音障碍
- C.伸舌不能
- D.双侧肢体活动障碍
- E.咽反射的存在或减弱消失

63、（A1型选择题）帕金森综合征与帕金森病的最主要区别是

- A.症状更多
- B.伴有脑萎缩
- C.常有家族史
- D.有明确病因

E.用多巴胺效果差

64、（A1 型选择题）门静脉高压食管曲张静脉破裂出血最有效的止血方法是

A.垂体后叶加压素静脉滴注

B.立即输新鲜全血

C.应用各种止血药物

D.三腔管二囊压迫

E.去甲肾上腺素加入冷盐水口服

65、（A1 型选择题）对上消化道大出血最有价值的诊断方法是

A.临床观察判定

B.吞少量稀钡检查

C.红细胞比容测定

D.凝血因子的检查

E.急诊胃镜检查

66、（A1 型选择题）骨折的特有体征是

A.疼痛与压痛

- B.功能障碍
- C.肿胀与瘀斑
- D.骨擦音与骨擦感
- E.患肢循环障碍

67、（A1 型选择题）最容易引起骨折不连接的移位是

- A.成角移位
- B.侧方移位
- C.分离移位
- D.旋转移位
- E.嵌插移位

68、（A1 型选择题）心肺复苏时最常用的药物是

- A.氯化钙
- B.阿托品
- C.利多卡因
- D.肾上腺素
- E.异丙肾上腺素

69、（A1 型选择题）急性失血输血合理的是

- A.失血量达到总血容量的 20%，输浓缩红细胞及全血
- B.失血量达到总血容量的 35%，只输浓缩红细胞
- C.失血量达到总血容量的 15%，输浓缩红细胞
- D.失血量低于总血容量的 20%，可考虑不输血
- E.失血量达到总血容量的 55%，只输浓缩红细胞及全血

70、（A2 型选择题）68 岁，女性，近消瘦，嗜睡，神态淡漠。胃镜、肠镜检查无阳性，肝/肾功能正常，心电图示房颤，该患者诊断最大可能是

- A.冠心病房颤
- B.抑郁症
- C.淡漠型甲亢
- D.甲状腺功能减退症
- E.老年性痴呆症

71、（A2 型选择题）男，26 岁，服甲胺磷后昏迷半小时急送医院。查体：双肺布满湿啰音，为治疗肺水肿，首选的药物是

- A.阿托品

B.毛花苷 C

C.哌替啶

D.呋塞米

E.硝普钠

72、（A2 型选择题）女，78 岁，晨起进行性左侧肢体无力，有糖尿病史。

体验:左鼻唇沟浅，伸舌偏左，左上下肢肌力Ⅱ级，腱反射右>左，左侧跖反射无反应，左偏侧针刺觉降低。血压 150/80mmHg，CT 无异常。临床诊断为

A.右侧半球脑栓塞

B.右侧半球脑出血

C.右侧半球脑血栓形成

D.蛛网膜下腔出血

E.以上都不是

73、（A2 型选择题）20 岁，女，乳房肿块，边缘清晰，活动度大，生长缓慢，无压痛，应诊断为

A.乳管内乳头状瘤

B.乳腺结核

C.乳腺炎性肿块

D.乳腺纤维性腺瘤

E.乳腺囊性增生病

74、（A2 型选择题）女，56 岁。直肠癌，距齿状线 5cm，未侵出浆膜，经病理检查报告病理类型为腺癌，应选择哪种治疗

A.拉下式直肠癌切除术

B.Dixon 手术

C.经腹会阴联合直肠癌根治术

D.保留肛门，直肠癌切除，腹壁造瘘术

E.姑息乙状结肠造瘘术

75、（A2 型选择题）患者男性，48 岁，确诊肝硬化 10 余年，腹水 7 天，经对症治疗效果不佳。昨日出现昏迷。化验肝功能正常，白蛋白 35g/L（正常 35~55g/L），血氨正常，血常规：WBC $4\times 10^9/L$ ，N70%，L30%。血 K $+2.5\text{mmol/L}$ ，Na $+128\text{mmol/L}$ ，Cl -100mmol/L ，诊断为肝性脑病，应以下列哪项抢救措施为主

A.补充人血白蛋白

B.抗感染

C.脱氨治疗

D.纠正电解质紊乱

E.纠正氨基酸比例

76、（A2 型选择题）女,45 岁,黄疸和皮肤瘙痒 3 月余,伴乏力和食欲减退,血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）轻度异常,AKP、GGT、血清胆固醇均明显升高,IgM 升高,PT 延长应考虑为

A.急性黄疸型肝炎

B.淤胆型肝炎

C.原发性肝癌

D.钩端螺旋体病

E.原发性胆汁性肝硬化

77、（A2 型选择题）一患者在硬膜外麻醉下行胆囊切除术,胸 7~8 椎间隙穿刺,首次给 1.33%利多卡因 30ml,给药后 20 分钟医生划刀时发现血色发紫,刀口不渗血,诊断心跳停止,应进行哪种抢救措施

A.头部降温

B.脱水治疗

C.胸内心脏按压

D.气管插管及胸外心脏按压

E.口对口人工呼吸

78、（A2 型选择题）乙状结肠破裂，立位腹部 X 线平片，下列部位出现半月形气影，哪个正确

A.右侧腹部

B.Douglas 腔

C.回盲部

D.膈下

E.左侧腹部

79、（A2 型选择题）女性，胃大部切除术后 4 天，突发右上腹剧痛，右侧腹膜炎体征，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是

A.胃肠吻合口破裂

B.十二指肠残端破裂

C.急性胆囊炎穿孔

D.急性胰腺炎

E.应激性溃疡穿孔

80、（A2 型选择题）女，29 岁。无意中发现甲状腺肿块半个月，近 3 天来似有增大，甲状腺 B 超结果为实质性肿块，内可见砂砾样钙化点。最可能的诊

断是

- A.单纯性甲状腺肿
- B.青春期甲状腺肿
- C.甲状腺癌
- D.结节性甲状腺肿
- E.甲状腺腺瘤伴囊内出血

81、（A2 型选择题）患者，1 岁 2 个月，其母发现其右腹股沟区肿块 3 个月，在哭闹时明显,查右腹股沟区肿块约鸽卵大小压迫内环后肿块不出现。其手术治疗的方法为

- A.McVay 法
- B.Ferguson 法
- C.Halsted 法
- D.疝成形术
- E.疝囊高位结扎术

82、（A2 型选择题）患者，男，45 岁，上腹痛 4 天伴恶心，呕吐，吐少量胃内容物，查体：上腹部压痛，巩膜可疑黄染，体温 38°C，白细胞计数 $15 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 640U/dl（Somogyi 法），尿淀粉酶 400U/dl（Somogyi

法)，可考虑为

A.急性胰腺炎

B.急性胆囊炎

C.急性胆管炎

D.急性肠系膜淋巴结炎

E.溃疡病穿孔

83、（A2 型选择题）男性，43 岁，因门静脉高压症食管胃底静脉曲张出血，已行脾切除，贲门周围血管离断术 1 年，近 3 天来又有黑粪，每日 4 次，糊状，量每次 150ml 左右，血红蛋白 80g/L，血压 90/60mmHg,应首先考虑作何种检查

A.急诊胃镜

B.急诊胃肠钡餐检查

C.选择性动脉造影

D.经皮肝穿刺行门静脉造影

E.先止血待患者情况好转后再做胃镜检查

84、（A2 型选择题）男孩，8 岁，突发剑突下阵发性剧烈绞痛 3 小时，发作时辗转不安，呻吟痛苦，伴恶心呕吐，发作过后如常人。检查无发热无黄

疸，腹平软无明显压痛，白细胞计数正常，应诊断为何病

- A.急性胃炎
- B.急性胆囊炎
- C.肠套叠
- D.胆道蛔虫病
- E.胃溃疡穿孔

85、（A2 型选择题）患者，男，前臂骨折，经手法复位，小夹板固定 5 小时，感觉剧痛，手指麻木，肿胀，活动不灵，其主要原因是

- A.神经损伤
- B.神经受压和静脉受压
- C.动脉和静脉受压
- D.静脉受压
- E.动脉损伤

86、（A2 型选择题）62 岁，女性。一年前因股骨颈骨折，行三刃钉固定术，髋活动仍有疼痛，X 线片示股骨头密度增高，纹理不清，应考虑为

- A.化脓性关节炎

- B.创伤性关节炎
- C.股骨头缺血发生坏死
- D.老年性退行性关节炎
- E.关节结核

87、（A2 型选择题）患儿，谢某，男，8 岁。因发热、头痛、呕吐 4 天，烦躁不安 1 天于 2 月 12 日入院，体检：体温 39.5℃，脉搏 123 次/分，烦躁，颈抵抗，腹部可见数个出血点，克氏征（+），布氏征（-）。外周血象：WBC $18 \times 10^9/L$, N0.89。脑脊液：压力 300mmH₂O, 细胞数 $2300 \times 10^6/L$, N0.95, 蛋白质 1.5g/L, 糖 1.4mmol/L, 氯化物 90mmol/L。本例最可能的诊断是

- A.结核性脑膜炎
- B.流行性乙型脑炎
- C.病毒性脑膜炎
- D.流行性脑脊髓膜炎
- E.隐球菌脑膜炎

88、（A2 型选择题）女性，30 岁，2 天来进行性双下肢瘫痪，大小便障碍，体温正常。胸 4 水平以下深浅感觉丧失和截瘫。脑脊液检查压力正常，白细胞 $80 \times 10^9/L$ （80 个/mm³），淋巴细胞占 80%，蛋白轻度增高，最可能的诊断为

- A. 脊髓出血
- B. 急性脊髓炎
- C. 脊髓肿瘤
- D. 多发性硬化
- E. 急性硬膜外脓肿

89、（A2 型选择题）女性，25 岁，无意中发现甲状腺肿块 7 天，近 3 天肿块迅速增长，伴有胀痛，甲状腺 SPECT 检查甲状腺右叶冷结节，应初步诊断为

- A. 甲状腺癌
- B. 甲状腺瘤
- C. 结节性甲状腺肿
- D. 单纯性甲状腺肿
- E. 甲状腺囊腺瘤并囊内出血

90、（A2 型选择题）男性，32 岁，右上腹疼痛不适，无畏寒，发热，黄疸，血 AFP 阳性，B 超：肝右叶 1.5cm 占位病变，最适宜的治疗方法是

- A. 手术切除
- B. 化疗

C.放疗

D.免疫治疗

E.肝移植

91、（A2型选择题）女性，45岁，因右上腹阵发性绞痛，伴恶心呕吐4小时来院。检查：体温37°C，右上腹深在轻度压痛，无腹肌紧张，Murphy征阴性，为确诊进一步检查应首选

A.白细胞计数和分类

B.腹部X线平片

C.测血清淀粉酶

D.BUS

E.PTE

92、（A2型选择题）女性，36岁，突然发生右上腹阵发性绞痛，伴发热寒战，排柏油样便少量，查体：急性病容，巩膜黄染，应考虑是

A.门静脉高压症

B.胃十二指肠溃疡

C.出血性胃炎

D.胆道出血

E.应激性溃疡出血

93、（A2 型选择题）男性，34 岁，腹部砸伤 4 小时。查体见四肢湿冷，腹肌紧张，全腹压痛、反跳痛，有移动性浊音，肠鸣音消失。该病人目前应进行的处理不包括

- A.诊断性腹腔穿刺
- B.密切监测基本生命体征
- C.补充血容量，抗休克治疗
- D.给予止痛和镇静剂
- E.抗感染治疗

94、（A2 型选择题）关于腰椎间盘突出症的手术指征，下列哪项是错误的

- A.有明显神经损害表现
- B.严格保守治疗无效
- C.马尾神经损害，出现大、小便障碍
- D.腰痛，CT 检查发现有椎间盘突出
- E.受压神经支配的肌肉萎缩、肌力降低

95、（A2 型选择题）3 岁患儿上楼梯时，其父向上牵拉右上肢，患儿哭闹，诉肘部疼痛，不肯用右手取物，最可能的诊断是

- A.肘关节脱位
- B.桡骨头骨折
- C.桡骨头半脱位
- D.肌牵拉伤
- E.尺骨鹰嘴撕脱伤

96、（A1 型选择题）差异性发绀见于以下哪种先天性心脏病晚期

- A.法洛四联症
- B.肺动脉狭窄
- C.室间隔缺损
- D.房间隔缺损
- E.动脉导管未闭

97、（B1 型选择题）胃大部切除术后 2 年，剑突下持续性疼痛，进食后加重，常有胆汁性呕吐，呕吐后仍有疼痛，抗酸剂无效

- A.急性完全性输入段梗阻
- B.慢性不完全性输入段梗阻
- C.吻合口梗阻

D.输出段梗阻

E.碱性反流性胃炎

98、（B1 型选择题）胃大部切除术后，餐后 20 分钟上腹部胀痛，随后呕吐大量胆汁，不含食物，呕吐后症状缓解

A.急性完全性输入段梗阻

B.慢性不完全性输入段梗阻

C.吻合口梗阻

D.输出段梗阻

E.碱性反流性胃炎

99、（B1 型选择题）胃大部切除术后，餐后上腹部饱胀，伴呕吐物既含胆汁，又有食物

A.急性完全性输入段梗阻

B.慢性不完全性输入段梗阻

C.吻合口梗阻

D.输出段梗阻

E.碱性反流性胃炎

100、（B1 型选择题）病灶侧单眼失明

- A.椎基底动脉系统 TIA
- B.颈内动脉血栓形成
- C.大脑前动脉血栓形成
- D.大脑中动脉血栓形成
- E.大脑后动脉血栓形成

101、（B1 型选择题）病灶对侧下肢中枢性瘫

- A.椎基底动脉系统 TIA
- B.颈内动脉血栓形成
- C.大脑前动脉血栓形成
- D.大脑中动脉血栓形成
- E.大脑后动脉血栓形成

102、（B1 型选择题）眩晕

- A.椎基底动脉系统 TIA
- B.颈内动脉血栓形成
- C.大脑前动脉血栓形成

D.大脑中动脉血栓形成

E.大脑后动脉血栓形成

103、（B1 型选择题）甲状腺功能亢进

A.内分泌功能亢进

B.内分泌功能减退

C.内分泌功能正常

D.激素受体不敏感

E.下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制致功能减退

104、（B1 型选择题）地方性甲状腺肿

A.内分泌功能亢进

B.内分泌功能减退

C.内分泌功能正常

D.激素受体不敏感

E.下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制致功能减退

105、（B1 型选择题）Cushing 综合征伴双侧肾上腺皮质萎缩是

A.内分泌功能亢进

- B.内分泌功能减退
- C.内分泌功能正常
- D.激素受体不敏感
- E.下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制致功能减退

106、（B1 型选择题）骨折近折端外展，外旋屈曲移位

- A.股骨颈骨折
- B.股骨粗隆间骨折
- C.股骨上 1/3 骨折
- D.股骨上中段骨折
- E.股骨髁上骨折

107、（B1 型选择题）下肢短缩，外展，极度外旋位

- A.股骨颈骨折
- B.股骨粗隆间骨折
- C.股骨上 1/3 骨折
- D.股骨上中段骨折
- E.股骨髁上骨折

108、（B1 型选择题）滑车神经支配的肌肉是

- A.上斜肌
- B.下斜肌
- C.外直肌
- D.眼轮匝肌
- E.瞳孔开大肌

109、（B1 型选择题）动眼神经支配的肌肉是

- A.上斜肌
- B.下斜肌
- C.外直肌
- D.眼轮匝肌
- E.瞳孔开大肌

110、（B1 型选择题）右腹股沟疝多见的原因

- A.未闭的鞘状突为一条细小管道
- B.鞘状突下段闭锁而上段未闭
- C.鞘状突两段闭锁而中段不闭

D.右侧睾丸下降迟于左侧

E.腹内斜肌弓状下缘发育不全或位置偏高

111、（B1 型选择题）交通性睾丸鞘膜积液

A.未闭的鞘状突为一条细小管道

B.鞘状突下段闭锁而上段未闭

C.鞘状突两段闭锁而中段不闭

D.右侧睾丸下降迟于左侧

E.腹内斜肌弓状下缘发育不全或位置偏高

112、（B1 型选择题）颈椎病

A.肩关节外展受限

B.肩部疼痛、无活动受限

C.肘关节外侧疼痛

D.肘关节活动受限

E.Finkelstein 试验阳性

113、（B1 型选择题）肩关节周围炎

A.肩关节外展受限

B.肩部疼痛、无活动受限

C.肘关节外侧疼痛

D.肘关节活动受限

E.Finkelstein 试验阳性

114、（B1 型选择题）桡骨茎突狭窄性腱鞘炎

A.肩关节外展受限

B.肩部疼痛、无活动受限

C.肘关节外侧疼痛

D.肘关节活动受限

E.Finkelstein 试验阳性

115、（B1 型选择题）妊娠，糖尿病患者及接受大量雌激素治疗患者易发

生

A.滴虫阴道炎

B.外阴阴道假丝酵母菌病

C.萎缩性阴道炎

D.婴幼儿外阴阴道炎

E.淋球菌阴道炎

116、（B1 型选择题）白带呈脓性泡沫状，用酸性液体冲洗阴道可提高疗效

A.滴虫阴道炎

B.外阴阴道假丝酵母菌病

C.萎缩性阴道炎

D.婴幼儿外阴阴道炎

E.淋球菌阴道炎

117、（B1 型选择题）与羊水栓塞早期相符的症状是

A.有妊高征病史

B.突然剧烈腹痛

C.阴道出血与休克成反比

D.呼吸困难，咳嗽，发绀等呼吸衰竭

E.子宫成板状，胎心消失

118、（B1 型选择题）与Ⅲ度胎盘早剥症状不相符的是

A.有妊高征病史

- B.突然剧烈腹痛
- C.阴道出血与休克成反比
- D.呼吸困难，咳嗽，发绀等呼吸衰竭
- E.子宫成板状，胎心消失

119、（B1 型选择题）病毒性心肌炎与哪项有关

- A.人类疱疹病毒 6 型
- B.柯萨奇病毒 A 型
- C.柯萨奇病毒 B 型
- D.单纯疱疹病毒
- E.无正确选项

120、（B1 型选择题）幼儿急疹的病原

- A.人类疱疹病毒 6 型
- B.柯萨奇病毒 A 型
- C.柯萨奇病毒 B 型
- D.单纯疱疹病毒
- E.无正确选项

121、（A3/A4 型选择题）患儿，4 周岁。2 周前曾患感冒，现不规则发热，易疲倦，脸色苍白，查体发现心率增快，心尖部第一心音减弱，并可闻及早搏，心电图检查:P-R 间期延长，ST 段下移，实验室检查:C 反应蛋白增高。该患儿的临床诊断最可能是

- A.病毒性心肌炎
- B.风湿性心肌炎
- C.风湿性心包炎
- D.结核性心包炎
- E.类风湿性心包炎

122、（A3/A4 型选择题）患儿，4 周岁。2 周前曾患感冒，现不规则发热，易疲倦，脸色苍白，查体发现心率增快，心尖部第一心音减弱，并可闻及早搏，心电图检查:P-R 间期延长，ST 段下移，实验室检查:C 反应蛋白增高。下列哪项检查可以帮助确诊

- A.血沉
- B.谷草转氨酶
- C.抗透明酸酶
- D.心脏 X 线检查
- E.CK-MB

123、（A3/A4 型选择题）患儿，4 周岁。2 周前曾患感冒，现不规则发热，易疲倦，脸色苍白，查体发现心率增快，心尖部第一心音减弱，并可闻及早搏，心电图检查:P-R 间期延长，ST 段下移，实验室检查:C 反应蛋白增高。该患儿首选的药物是

- A.水杨酸制剂
- B.洋地黄类药物
- C.地塞米松制剂
- D.镇静剂
- E.抗生素

124、（B1 型选择题）I 型糖尿病是

- A.内分泌功能亢进
- B.内分泌功能减退
- C.内分泌功能正常
- D.激素受体不敏感
- E.下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制致功能减退

125、（A3/A4 型选择题）患儿，5 岁，眼睑及双下肢明显水肿，少尿 1 周，体检:精神状态良好，眼睑水肿，双下肢呈凹陷性水肿，血压 90/60mmHg，

心肺正常，尿常规:蛋白（+++），红细胞 0-3 个/HP，血浆总蛋白 45g/L，白蛋白 22g/L，抗“O”正常，C3 补体正常，胆固醇 11.3mmol/L。该患儿诊断为

- A.急性肾炎
- B.肾病综合征
- C.肾炎性肾病
- D.急进性肾炎
- E.病毒性肾炎

126、（A3/A4 型选择题）患儿，5 岁，眼睑及双下肢明显水肿，少尿 1 周，体检:精神状态良好，眼睑水肿，双下肢呈凹陷性水肿，血压 90/60mmHg，心肺正常，尿常规:蛋白（+++），红细胞 0-3 个/HP，血浆总蛋白 45g/L，白蛋白 22g/L，抗“O”正常，C3 补体正常，胆固醇 11.3mmol/L。该患儿病理类型最可能为

- A.微小病变型
- B.系膜增生型
- C.局灶性阶段性肾小球硬化
- D.膜性肾病
- E.膜增生性肾炎

127、（A3/A4 型选择题）患儿，5 岁，眼睑及双下肢明显水肿，少尿 1 周，体检：精神状态良好，眼睑水肿，双下肢呈凹陷性水肿，血压 90/60mmHg，心肺正常，尿常规：蛋白（+++），红细胞 0-3 个/HP，血浆总蛋白 45g/L，白蛋白 22g/L，抗“O”正常，C3 补体正常，胆固醇 11.3mmol/L。该患儿治疗应选

- A. 泼尼松短程疗法
- B. 泼尼松中程疗法
- C. 泼尼松长程疗法
- D. 甲泼尼松龙冲击疗法
- E. 泼尼松+环磷酰胺

128、（A3/A4 型选择题）女，25 岁，2 周来发热，四肢关节酸痛，无皮疹，胸透示两侧少量胸腔积液，体检：体温 39℃，心率：120 次/分，两下肺叩诊浊音，呼吸音降低，肝脾未触及，两手掌指关节及膝关节轻度肿胀，Hb100g/L，白细胞 $3 \times 10^9/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，尿常规蛋白 1g/L。本病最可能诊断

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 结核性胸膜炎
- D. 病毒感染

E.再生障碍性贫血

129、（A3/A4 型选择题）女，25 岁，2 周来发热，四肢关节酸痛，无皮疹，胸透示两侧少量胸腔积液，体检:体温 39°C，心率:120 次/分，两下肺叩诊浊音，呼吸音降低，肝脾未触及，两手掌指关节及膝关节轻度肿胀，Hb100g/L，白细胞 $3 \times 10^9/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，尿常规蛋白 1g/L。根据以上病史还需作进一步检查，下列检查中，你认为对诊断最为关键的检查是

- A.血沉
- B.C 反应蛋白
- C.类风湿因子
- D.抗核抗体谱检查
- E.免疫球蛋白+补体

130、（A3/A4 型选择题）女，25 岁，2 周来发热，四肢关节酸痛，无皮疹，胸透示两侧少量胸腔积液，体检:体温 39°C，心率:120 次/分，两下肺叩诊浊音，呼吸音降低，肝脾未触及，两手掌指关节及膝关节轻度肿胀，Hb100g/L，白细胞 $3 \times 10^9/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，尿常规蛋白 1g/L。检查结果：类风湿因子弱阳性，血沉 120mm/h，IgG19g/L，抗核抗体阳性，C3 及 CH50 降低，抗双链 DNA 抗体增高。本例首选药物

- A.非甾体抗炎药+慢作用抗风湿药
- B.糖皮质激素

C.环磷酰胺

D.羟基氯喹

E.青霉胺

131、（A3/A4 型选择题）男，66岁，突发剧烈头痛、呕吐3天，伴眼睑下垂。体检：神志模糊，瞳孔右6mm，对光反射消失，左3mm，对光反射灵敏，四肢均有自主活动，颈有抵抗，Kernig征（+）。体温37°C，血压140/75mmHg。临床的第一个诊断是

A.脑炎

B.脑膜炎

C.脑出血

D.蛛网膜下腔出血

E.急性硬膜下出血

132、（A3/A4 型选择题）男，66岁，突发剧烈头痛、呕吐3天，伴眼睑下垂。体检：神志模糊，瞳孔右6mm，对光反射消失，左3mm，对光反射灵敏，四肢均有自主活动，颈有抵抗，Kernig征（+）。体温37°C，血压140/75mmHg。为了明确诊断，首选辅助检查是

A.脑电图

B.腰穿脑脊液检查

C.头颅 CT

D.头颅 MRI

E.DSA 脑血管造影

133、（A3/A4 型选择题）男，66 岁，突发剧烈头痛、呕吐 3 天，伴眼睑下垂。体检：神志模糊，瞳孔右 6mm，对光反射消失，左 3mm，对光反射灵敏，四肢均有自主活动，颈有抵抗，Kernig 征（+）。体温 37°C，血压 140/75mmHg。治疗中哪一项是不正确的

A.绝对卧床休息

B.大剂量止血剂

C.脱水降颅压

D.保持大便通畅

E.早期应用钙通道阻滞剂

134、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速，近一周伴声音嘶哑，ECT 示右甲状腺冷结节。为明确诊断下列哪项检查最意义

A.确切的体检

B.颈部 X 线摄片

C.穿刺细胞学检查

D.甲状腺 B 超

E.甲状腺 CT

135、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速，近一周伴声音嘶哑，ECT 示右甲状腺冷结节。如未能确诊，拟行手术，应采用何种术式

A.结节切除术

B.患侧腺体全切

C.颈部淋巴结清除术

D.患侧腺体大部切除加冷冻切片检查

E.患侧全切，峡部切除，对侧大部切除

136、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速，近一周伴声音嘶哑，ECT 示右甲状腺冷结节。如病理报告为甲状腺乳头状癌，又无远处转移，应采用何种术式

A.患侧全切加颈部淋巴结清扫

B.患侧全切，峡部切除，对侧大部切除

C.双侧甲状腺全部切除

D.患侧腺体大部切除，峡部切除

E.患侧腺体大部切除加颈淋巴结清除

137、（A3/A4 型选择题）女性，50 岁，腹部阵发性胀痛 1 天，呕吐为胃内容物，近 3 个月来有时腹胀，大便带黏液，无脓血，查体:BP127/90mmHg，P86 次/分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块质韧压痛，腹部透视见 1 个气液平面，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 87g/L。下列检查意义最大的是哪项

A.X 线钡餐透视

B.纤维结肠镜

C.腹部 B 超

D.腹部 CT

E.以上都不是

138、（A3/A4 型选择题）女性，50 岁，腹部阵发性胀痛 1 天，呕吐为胃内容物，近 3 个月来有时腹胀，大便带黏液，无脓血，查体:BP127/90mmHg，P86 次/分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块质韧压痛，腹部透视见 1 个气液平面，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 87g/L。诊断首先考虑为

A.结肠癌

B.卵巢囊肿

C.阑尾周围脓肿

D.回盲部结核

E.回盲部套叠

139、（A3/A4 型选择题）女性，50 岁，腹部阵发性胀痛 1 天，呕吐为胃内容物，近 3 个月来有时腹胀，大便带黏液，无脓血，查体:BP127/90mmHg，P86 次/分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块质韧压痛，腹部透视见 1 个气液平面，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 87g/L。应积极采取的术式为

A.左半结肠癌根治术

B.右半结肠癌根治术

C.回盲部切除术

D.肿物切除术

E.内镜下结肠癌根治术

140、（A3/A4 型选择题）女性，52 岁，有胆管结石病史，近 2 天来右上腹痛，体温 37.8°C ，2 小时前突然畏寒、寒战，体温达 40°C ，精神紧张兴奋、口渴、面色苍白、脉搏 98 次/分、有力，血压 110/96mmHg，尿量每小时 26ml。患者处于何种情况

A.急性胆管炎，无休克

B.休克代偿期

C.中度休克

D.重度休克

E.高排低阻型休克

141、（A3/A4 型选择题）女性，52 岁，有胆管结石病史，近 2 天来右上腹痛，体温 37.8°C ，2 小时前突然畏寒、寒战，体温达 40°C ，精神紧张兴奋、口渴、面色苍白、脉搏 98 次/分、有力，血压 110/96mmHg，尿量每小时 26ml。下列哪一项不是其微循环变化的特征

A.微动脉，微静脉收缩

B.动静脉短路开放

C.真捷通道开放

D.组织灌流减少

E.静脉回心血量减少

142、（A3/A4 型选择题）女性，52 岁，有胆管结石病史，近 2 天来右上腹痛，体温 37.8°C ，2 小时前突然畏寒、寒战，体温达 40°C ，精神紧张兴奋、口渴、面色苍白、脉搏 98 次/分、有力，血压 110/96mmHg，尿量每小时 26ml。为排除发生弥散性血管内凝血的可能作了多项检查，下列哪项监测检查结果是无意义的

A.血小板计数低于 $80 \times 10^9/\text{L}$

B.纤维蛋白原少于 $1.5\text{g}/\text{L}$

C.凝血酶原时间较正常延长 3 秒以上

D.副凝固试验阳性

E.凝血时间明显缩短

143、（A3/A4 型选择题）女性，52 岁，有胆管结石病史，近 2 天来右上腹痛，体温 37.8℃，2 小时前突然畏寒、寒战，体温达 40℃，精神紧张兴奋、口渴、面色苍白、脉搏 98 次/分、有力，血压 110/96mmHg，尿量每小时 26ml。下列哪项治疗原则是错误的

A.积极补充血容量

B.联合应用抗菌药物

C.尽早作胆管引流

D.纠正酸中毒

E.静脉滴注间羟胺

144、（A3/A4 型选择题）男，68 岁，风湿性心脏瓣膜病 20 年，因心悸 5 天就诊。查体：自主体位，BP150/70mmHg，心率 119 次/分，心律绝对不齐，第一心音强弱不等。心电图示心房颤动。为控制该患者的心室率不宜首选

A.地高辛

B.美托洛尔

C.维拉帕米

D.硫氮卓酮

E.普罗帕酮

145、（A3/A4 型选择题）男，68 岁，风湿性心脏瓣膜病 20 年，因心悸 5 天就诊。查体：自主体位，BP150/70mmHg，心率 119 次/分，心律绝对不齐，第一心音强弱不等。心电图示心房颤动。宜首选的抗凝治疗是

A.华法林

B.阿司匹林

C.肝素

D.尿激酶

E.复方丹参片

146、（A3/A4 型选择题）女性，68 岁。进行性吞咽困难 2 个月，现仅能进流质食物。查体：消瘦，锁骨上未触及肿大淋巴结，食管 X 线钡餐透视显示：食管中段黏膜破坏，充盈缺损，管腔狭窄。第一步检查应首选

A.食管镜

B.食管拉网

C.放射性核素

D.胸部及纵隔 CT

E.腹部超声波和肝功能检查

147、（A3/A4 型选择题）女性，68 岁。进行性吞咽困难 2 个月，现仅能进流质食物。查体：消瘦，锁骨上未触及肿大淋巴结，食管 X 线钡餐透视显示：食管中段黏膜破坏，充盈缺损，管腔狭窄。如患者出现声音嘶哑，提示肿瘤已侵犯

A.声带

B.气管隆突

C.迷走神经

D.喉返神经

E.喉上神经

148、（A3/A4 型选择题）女性，68 岁。进行性吞咽困难 2 个月，现仅能进流质食物。查体：消瘦，锁骨上未触及肿大淋巴结，食管 X 线钡餐透视显示：食管中段黏膜破坏，充盈缺损，管腔狭窄。腹部超声波检查发现肝内有多发性转移瘤，提示来自食管癌的哪种转移途径

A.直接浸润

B.血行转移途径

C.淋巴转移途径

D.种植转移途径

E.消化道黏膜下浸润

149、（A3/A4 型选择题）男性,52 岁。反复无痛性肉眼血尿伴条状血块 2 月，膀胱镜检见右输尿管口喷血,尿细胞学可见癌细胞。静脉尿路造影最有诊断价值的 X 线表现是

A.右肾不显影

B.右肾积水

C.右肾萎缩

D.右肾盂充盈缺损

E.右肾盏破坏

150、（A3/A4 型选择题）男性,52 岁。反复无痛性肉眼血尿伴条状血块 2 月，膀胱镜检见右输尿管口喷血,尿细胞学可见癌细胞。明确诊断后首选的治疗方法是

A.右肾切除术

B.右肾输尿管全切除

C.化疗

D.放疗

E.免疫治疗



1、正确答案：C

答案解析：早期食管癌的钡餐造影表现为：(1)局限性黏膜皱襞增粗、迂曲及中断；(2)局限性管壁僵硬；(3)小充盈缺损。晚期食管癌的钡餐造影表现：病变处充盈缺损、管腔狭窄。

2、正确答案：A

答案解析：解析：营养不良常见的并发症有：维生素 A 缺乏症、呼吸道感染、腹泻病、缺铁性贫血以及低血糖等。

3、正确答案：A

答案解析：【解析】金黄色葡萄球菌引起的感染易于局限化和形成血栓与凝因酶的作用有关。

4、正确答案：B

答案解析：

5、正确答案：C

答案解析：解析：尿路感染的诊断依据细菌学检查，凡是有真性细菌尿者，均可诊断为尿路感染。

6、正确答案：B

答案解析：乳房发育在女性青春期最早出现

7、正确答案：B

答案解析：【解析】左心功能不全肺淤血时，可表现为咳嗽，可粉白色或粉红色泡沫痰，如肺毛细血管压力很高，血浆外渗，可导致痰内带血丝。肺淤血时可由不同程度的呼吸困难，如劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难等，急性肺水肿可出现支气管痉挛、发作性哮喘。

8、正确答案：D

答案解析：解析：正常人大量饮水可致多尿，非病态性，不选A。急性肾衰竭多尿期尿量增多是因为肾小管吸收能力严重下降，故不选B。利尿剂的作用原理通常为抑制钠的重吸收，从而带走水分，故排除C。慢性肾盂肾炎是细菌感染肾脏引起的慢性炎症，病变主要侵犯肾间质和肾盂、肾盏组织，不选E。中枢性尿崩症出现多尿是由于抗利尿激素分泌或释放不足引起的，符合题意，选D。

9、正确答案：D

答案解析：

10、正确答案：D

答案解析：解析：本试题考核有关高血压的肾脏病理变化。由于细动脉硬化使一部分肾单位萎缩，而健在的肾单位就会发生代偿性肥大，因此肾脏表现为颗粒状。而单发性梗死和多发性大瘢痕形成是动脉粥样硬化肾的病理特点，这是由于动脉粥样硬化累及的血管为中小以上的动脉，致病变累及的范围较大。

11、正确答案：B

答案解析：新月体肾炎又称急进性肾炎,其病理变化为:肾球囊壁层上皮细胞增生。

12、正确答案：B

答案解析：解析：骨筋膜室综合症即由骨，骨间膜，肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血、缺氧而产生的一系列症状和体征。又称急性筋膜间室综合征、骨筋膜间隔区综合征。骨筋膜室是指由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜所构成。最多见于前臂掌侧和小腿。

13、正确答案：D

答案解析：生活接触不易传播 HIV，其他四个选项是 HIV 传播的主要途径。

14、正确答案：D

答案解析：解析:新生儿寒冷损伤综合征患儿应在 12~24 小时内恢复正常体温。(体温 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ 为重症)

15、正确答案：A

答案解析：解析：胆汁由约 75%肝细胞生成，25%由胆管细胞生成。成人每日分泌量约 800~1000ml。胆汁是一种消化液，有乳化脂肪的作用，但不含消化酶。胆汁对脂肪的消化和吸收具有重要作用。胆汁中的胆盐、胆固醇和卵磷脂等可降低脂肪的表面张力，使脂肪乳化成许多微滴，利于脂肪的消化；胆盐还可与脂肪酸甘油-酯等结合，形成水溶性复合物，促进脂肪消化产物的吸收。并能促进脂溶性维生素的吸收。

16、正确答案：C

答案解析：血红蛋白尿可呈酱油色或暗红色，见于血管内溶血。阵发性睡眠性血红蛋白尿等，血卟啉病及铅中毒时亦可出现红色尿液，此种血尿统称为"假性血尿"。鉴别需要反复进行尿沉渣镜检有无红细胞即可。

17、正确答案：A

答案解析：解析：B 超无辐射且无损伤性，可观测到卵巢肿瘤的形态及血供情况。

18、正确答案：B

答案解析：解析：血小板激活因子的作用：参与多种炎症过程。增加血管通透性，促进白细胞与内皮细胞粘着，影响趋化作用，促进白细胞脱颗粒。刺激白细胞合成前列环素和白三烯。

19、正确答案：A

答案解析：解析：凝固性坏死蛋白质变性凝固且溶酶体酶水解作用较弱

时，坏死区呈灰黄、干燥、质实的状态，称为凝固性坏死。坏死的细胞的蛋白质凝固，还常保持其轮廓残影，坏死区周围形成充血、出血和炎症反应带，这可能是由于死局部的酸中毒使坏死细胞的结构蛋白和酶蛋白变性，封闭了蛋白质的溶解过程。凝固性坏死好发于心肌、肝、脾、肾等实质器官常因缺血缺氧、细菌毒素、化学腐蚀剂作用引起。

20、正确答案：C

答案解析：解析：粘膜免疫系统是指广泛分布于呼吸道、胃肠道、泌尿生殖道粘膜下及一些外分泌腺体处的淋巴组织，是执行局部特异性免疫功能的主要场所。包括扁桃体，C项正确。

21、正确答案：B

答案解析：解析：患者将地上的草绳看成一条大蛇，是视觉的错误，也就属于知觉的障碍，即错觉。

22、正确答案：B

答案解析：记忆题

23、正确答案：C

答案解析：解析：肱骨髁上骨折，好发生于儿童，儿童期肱骨下端有骨骺，如尺侧移位未能矫正，影响骨骺发育，可发生肘内翻畸形。

24、正确答案：C

答案解析：解析：疣是人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的表皮良性赘生物，常见有寻常疣、扁平疣、跖疣、尖锐湿疣。

25、正确答案：A

答案解析：解析：胎盘是胚外结构，由羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜构成。其中羊膜和叶状绒毛膜构成胎盘的胎儿部分，占胎盘的主要部分，羊膜在胎盘的最内层，是附着在绒毛膜表面的半透明薄膜。底蜕膜构成胎盘的母体部分，占胎盘的很小部分。

26、正确答案：D

答案解析：记忆

27、正确答案：B

答案解析：【解析】人感染 HAV 后排毒高峰在潜伏期末、临床症状初期及黄疸出现后 1~2 天。所以选 B 项。；

28、正确答案：C

答案解析：解析：HCV 是有包膜的单正链 RNA 病毒，主要经血液传播，初发感染往往较隐匿，绝大多数病情较轻，很少有严重肝病的表现。HCV 感染的一个重要特点是慢性化几率很高，且与原发性肝癌关系密切。HCV 具有明显的嗜肝性，敏感的宿主细胞种类十分有限，目前 HCV 体外培养较困难。

29、正确答案：C

答案解析：解析：阻塞性肺不张时，触觉震颤减弱。

30、正确答案：D

答案解析：题干为妊娠晚期合并急性病毒性肝炎鉴别，而妊娠剧呕引起的肝损害多发生于妊娠早期。

31、正确答案：C

答案解析：解析：对乙酰氨基酚抑制前列腺合成，具有解热镇痛作用，对胃肠刺激性小。

32、正确答案：A

答案解析：记忆

33、正确答案：A

答案解析：解析：Mills 征(伸肌腱牵拉试验)。伸肘、握拳、屈腕，然后前臂旋前，此时肘外侧出现疼痛为阳性，是肱骨外上髁炎的典型体征。

34、正确答案：D

答案解析：记忆

35、正确答案：E

答案解析：胫骨平台骨折是关节内骨折,最容易出现的并发症是创伤性关节炎,多是由创伤本身及关节内骨折复位不良引起。

36、正确答案：B

答案解析：解析：髌关节脱位多为直接暴力所致，常见为后脱位，偶有前脱位和中心脱位。后脱位，前脱位也可合并髌臼骨折。不作X线摄片必会漏诊。治疗不当、必会引起股骨头缺血性坏死，严重影响关节功能。

37、正确答案：D

答案解析：解析：肾小球滤过膜电荷屏障受损，使滤过膜通透性增大，出现非选择性蛋白尿；。

38、正确答案：D

答案解析：解析：手掌部脓肿常表现为手背肿胀，切开引流应当在掌面进行，不可在手背部切开。

39、正确答案：D

答案解析：解析：女性月经来潮前雌激素有两个高峰，孕激素有一个高峰。

40、正确答案：A

答案解析：解析：胰腺癌是消化道常见的恶性肿瘤之一，是恶性肿瘤中最常见的，多发生于胰头部。腹痛及无痛性黄疸为胰头癌的常见症状。黄疸在病程的某一阶段可有黄疸，一般胰头癌黄疸较多见，且出现较早，癌肿局限于体、尾部时多无黄疸。黄疸多属阻塞性，呈进行性加深，伴有皮肤瘙痒，尿色如浓茶，粪便成陶土色。

41、正确答案：B

答案解析：解析：HBeAg 抗原是乙肝病毒复制的标志。它可以判定传染性的大小。如果检查时有 e 抗原阳性，就表示乙肝病毒在人体内复制活跃，血中带毒量大，传染性强。

42、正确答案：A

答案解析：解析：人乳头瘤病毒 HPV16、HPV18、HPV33 等可引起宫颈内瘤样变，组织学变化可由宫颈上皮的不典型增生至原位癌，严重者可发展为浸润癌。

43、正确答案：B

答案解析：药品不良反应，是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

44、正确答案：A

答案解析：【解析】局限在粘膜层或粘膜下层，无论有无淋巴结转移，称为早期胃癌。

45、正确答案：D

答案解析：解析：胸腺发育不全或缺失，可导致 T 细胞缺乏和细胞免疫功能缺陷，如 DiGeorge 综合征。B 细胞缺陷引起 Bruton 综合征。

46、正确答案：E

答案解析：解析：对于 T3 期多发性膀胱肿瘤应采取根治性膀胱全切术。

47、正确答案：B

答案解析：解析：伤寒是由伤寒杆菌引起的急性传染病，以持续菌血症、单核-吞噬细胞系统受累、回肠远端微小脓肿及溃疡形成为基本病理特征。典型的临床表现包括持续高热，腹部不适，肝、脾大，白细胞低下，部分病人有玫瑰疹和相对缓脉。伤寒的并发症有肠出血、肠穿孔、中毒性肝炎、中毒性心肌炎、支气管炎等，其中肠穿孔是最严重的并发症。

48、正确答案：B

答案解析：解析：对本病的治疗首先让患者保持外阴清洁干燥，禁用肥皂及其他刺激物清洗外阴，内裤应选用通气较好的棉质品以免加重病情，避免用手或器械搔抓患处，并忌食辛辣刺激及易致敏食物。然后在控制局部瘙痒时，主张采用皮质激素局部治疗。同时加以外用药物来辅助治疗。

49、正确答案：B

答案解析：；解析：腹痛是腹膜炎主要的表现，一般都很剧烈，为持续性，难以忍受，腹痛多自原发病变部位开始，随炎症扩散而波及全腹，但以原发部位疼痛显著。

50、正确答案：A

答案解析：解析：壁细胞多位于胃体部，慢性萎缩性胃体胃炎常可出现壁细胞抗体阳性。

51、正确答案：A

答案解析：解析：脊髓灰质炎疫苗初种的年龄是2个月。卡介苗的初种年龄出生时。

52、正确答案：D

答案解析：解析：癫痫突然停药会导致癫痫持续状态，停药需缓慢。

53、正确答案：C

答案解析：【解析】苯中毒可分为急性苯中毒和慢性苯中毒。急性苯中毒是指吸入高浓度苯蒸气后，影响机体内ATP以及乙酰胆碱的合成，从而对中枢神经系统产生麻醉作用；慢性苯中毒是指苯的代谢产物酚类直接抑制了细胞核的分裂，导致细胞突变，从而影响了骨髓的造血功能，临床表现为白细胞数持续降低，最终可发展为再生障碍性贫血或白血病。

54、正确答案：B

答案解析：【解析】无

55、正确答案：E

答案解析：解析：绝大多数的慢性活动性胃炎病人的胃粘膜中都可以检测出幽门螺杆菌，HP在人群中的感染率约为55%-70%，所以幽门螺杆菌感染是慢性浅表性胃炎的主要的病因。

56、正确答案：A

答案解析： 解析：抗 Sm 抗体约在 30% SLE 中呈阳性反应，因其特异性高，又称为本病的特异性抗体。对于不典型、轻型或早期病例，按 SLE 标准不足确诊者，若抗 Sm 抗体阳性，结合其他表现可确诊。

57、正确答案：A

答案解析： 解析：随境转移表现为不随意注意明显增强，注意的稳定性降低，不持久，注意对象常因周围环境变化而不断转移，以至不断改变话题和活动内容。多见于躁狂状态和躁狂症。

58、正确答案：D

答案解析： 解析：心理冲突基本类型有：(1)趋-趋冲突又称双趋冲突，是指在一个人的面前同时有两个具有同样吸引力的目标，而引起同样程度的动机，但必须从中抉择其一时发生的心理冲突。常形容为“鱼和熊掌不可兼得”。(2)避-避冲突又称双避冲突，是指一个人同时面临着两件不欢迎或令人讨厌的事物，产生同等的逃避动机，要回避其一就必然遭遇另一件时产生的心理冲突。“前遇断崖，后有追兵”便是一种严重的双避冲突情境。(3)趋-避冲突这种动机冲突是指一个人对同一目标采取矛盾的态度，既向往（喜欢），又拒绝（厌恶）时发生的心理冲突。由于人生中遭遇的许多目标，往往既有吸引力，又要求付出一定的代价，或接受目标时具有一定的危险性，因此，趋-避冲突是最常见的心理冲突。(4)双重或多重趋-避冲突是指必须在两个或两个以上的各有优缺点的事物，或目标间抉择时产生的心理冲突。

59、正确答案：A

答案解析：解析：支原体肺炎抗菌治疗，临床首选红霉素 30~50mg / (kg·d)，分 4 次口服。

60、正确答案：B

答案解析：

61、正确答案：E

答案解析：【解析】：霍乱肠毒素作用于腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 浓度增高，肠黏膜细胞分泌增多，致水样便。

62、正确答案：E

答案解析：

63、正确答案：D

答案解析：理解记忆

64、正确答案：D

答案解析：解析：三腔二囊管是食管-胃底静脉曲张破裂出血紧急止血的绝对适应证。

65、正确答案：E

答案解析：记忆理解

66、正确答案：D

答案解析：解析：骨折的特有体征:有骨折部位畸形、局部反常活动和骨擦音或骨擦感。

67、正确答案：C

答案解析：解析：在分离移位的骨折，软组织（肌肉、肌腱等）容易嵌入两骨折断端之间，不仅影响骨折的复位，而且阻碍两骨折端的对合及接触，骨折难以愈合甚至不愈合。所以正确答案是 C。

68、正确答案：D

答案解析：解析：肾上腺素具有兴奋 α 与 β 肾上腺素能受体作用，有助于自主心律的恢复，其 α 受体兴奋作用可使外周血管阻力增加，而不增加冠脉和脑血管的阻力，可增加心肌和脑的灌流量；增强心肌收缩力，提高电除颤成功率等，所以肾上腺素是心肺复苏时的首选药物。利多卡因是治疗室性心律失常的有效药物，尤其适用于室性期前收缩或阵发性心动过速的治疗。

69、正确答案：D

答案解析：解析：关于大量失血时的输血原则，一般认为一次失血量低于总血容量 10%(500ml)，机体可以代偿，一般不需输血。失血量达总血容量 10%~20%(500~1000ml)时，应根据症状和血细胞比容(HCT)的变化选择治疗方案，仅表现活动时心率增快、体位性低血压，HCT 无改变，可输入适量晶体液、胶体液或少量血浆代用品。若失血量达总血容量 20%以上，有休克表现，HCT 下降，通常以 30%~35%作为缺氧的临界值，除输入晶体液、胶体液补充血容量外，还应输入浓缩红细胞以提高携氧能力。失血量 > 30%，可输全血与浓

缩红细胞各半。因此对于急性失血患者的输血，根据所提供的答案，应选择 D。

70、正确答案：C

答案解析：

71、正确答案：A

答案解析：

72、正确答案：C

答案解析：

73、正确答案：D

答案解析：【解析】：乳管内乳头状瘤以乳头溢血性液为主要表现。乳腺囊性增生病表现为周期性乳房胀痛和肿块。乳腺炎性肿块为产后妇女。乳腺纤维腺瘤主要为乳房肿块。肿块多发生于乳房外上象限，肿块增大缓慢，质似硬橡皮球的弹性感，表面光滑，易于推动。该患者乳头未溢液，也没提及是产后和周期性乳房胀痛等，因此符合乳腺纤维腺瘤的症状，答案为 C。解题关键：区分乳腺肿块。

74、正确答案：B

答案解析：

75、正确答案：D

答案解析：

76、正确答案：E

答案解析：

77、正确答案：D

答案解析：

78、正确答案：D

答案解析：

79、正确答案：B

答案解析：

80、正确答案：C

答案解析：

81、正确答案：E

答案解析：解析：根据题干描述，此患者最可能的诊断为腹股沟斜疝。疝囊高位结扎术是各类疝手术的基本步骤。婴幼儿因其腹肌在发育中可逐渐强壮而使腹壁增强，单纯性疝囊高位结扎法常能获得满意效果，可不必再施行修补术。

82、正确答案：A

答案解析：患者临床表现及实验室检查很容易诊断为急性胰腺炎，故选 A

83、正确答案：A

答案解析：

84、正确答案：D

答案解析：儿童剑突下阵发性剧烈绞痛，发热伴恶心呕吐，首先考虑胆道蛔虫病

85、正确答案：C

答案解析：解析：血管损伤程度可为受压、挫伤、撕裂或完全断裂。动脉损伤后伤肢剧痛，脉搏减弱或消失，肢体远端苍白、麻木、发凉。静脉损伤则伤肢明显肿胀、淤血、发绀。

86、正确答案：C

答案解析：解析：股骨颈骨折常发生于老年人，其临床治疗中存在骨折不愈合和股骨头缺血坏死两个主要问题。股骨头缺血性坏死：骨折已愈合，股骨头坏死尚未严重变形。患者有股骨颈骨折史，X线片显示左股骨头密度增高，纹理不清，均可提示股骨头缺血坏死。故本题选 C。

87、正确答案：D

答案解析：解析：本例的特点是儿童，冬春季发病，急性起病，发热，颅内高压征象、脑膜刺激征，皮肤出血点，细菌感染性血象和化脓性脑脊液改

变，临床符合流脑。进一步行瘀点瘀斑组织涂片染色、脑脊液或血涂片或培养可确诊。

88、正确答案：B

答案解析：

89、正确答案：E

答案解析：

90、正确答案：A

答案解析：解析：原发性肝癌的大体病理形态可分三型：结节型、巨块型和弥漫型。现在新的分类为：微小肝癌（直径 $\leq 2\text{cm}$ ），小肝癌（ $> 2\text{cm}$ ， $\leq 5\text{cm}$ ），大肝癌（ $> 5\text{cm}$ ， $\leq 10\text{cm}$ ）和巨大肝癌（ $> 10\text{cm}$ ）。下述情况可作根治性肝切除：单发的微小肝癌；单发的小肝癌；单发的向肝外生长的大肝癌或巨大肝癌，表面较光滑，周围界限较清楚，受肿瘤破坏的肝组织少于30%；多发性肿瘤，但肿瘤结节少于3个，且局限在肝的一段或一叶内。该患者一般情况好，肝功能无明显损害，无广泛肝转移，因此可手术移除。

91、正确答案：D

答案解析：

92、正确答案：D

答案解析：右上腹阵发性绞痛，伴发热寒战，巩膜黄染，考虑胆道出血

93、正确答案：D

答案解析：解析:在诊断未明确前不应使用止痛剂和镇静剂,以免掩盖病情。

94、正确答案：D

答案解析：大多数人在患上腰椎间盘突出之后，都可以通过保守的方式进行治疗，但是依然有部分患者需要手术治疗，腰椎间盘突出症的手术指征是：1、足下垂（肌肉无力或者萎缩）；2、马尾神经损伤（肛门周围麻木或者大小便功能障碍）3、初次发作腰腿痛，保守治疗6个星期以上无效；4、腰腿痛反复发作，严重影响工作生活。

95、正确答案：C

答案解析：【解析】：桡骨头半脱位多为间接暴力所致，当幼儿肘关节处于伸直位，腕部受到纵向牵拉所致。如穿衣或行走时跌倒，幼儿的前臂在旋前位被成人用力向上提拉，即可造成桡骨小头半脱位。与题干其父向上牵拉右上肢符合。

96、正确答案：E

答案解析：动脉导管未闭晚期，当肺动脉压力超过主动脉压力时，左向右分流明显减少或停止，产生肺动脉血流逆向分流入主动脉，呈现下半身青紫，左上肢轻度青紫，右上肢正常的差异性青紫。

97、正确答案：E

答案解析：

98、正确答案：B

答案解析：

99、正确答案：D

答案解析：

100、正确答案：B

答案解析：

101、正确答案：C

答案解析：

102、正确答案：A

答案解析：

103、正确答案：A

答案解析：

104、正确答案：C

答案解析：

105、正确答案：E

答案解析：

106、正确答案：C

答案解析：

107、正确答案：B

答案解析：

108、正确答案：A

答案解析：

109、正确答案：B

答案解析：

110、正确答案：D

答案解析：

111、正确答案：A

答案解析：

112、正确答案：B

答案解析：

113、正确答案：A

答案解析：

114、正确答案：E

答案解析：

115、正确答案：B

答案解析：

116、正确答案：A

答案解析：

117、正确答案：D

答案解析：

118、正确答案：D

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：

120、正确答案：A

答案解析：

121、正确答案：A

答案解析：

122、正确答案：E

答案解析：

123、正确答案：C

答案解析：

124、正确答案：B

答案解析：

125、正确答案：B

答案解析：

126、正确答案：A

答案解析：

127、正确答案：B

答案解析：

128、正确答案：B

答案解析：

129、正确答案：D

答案解析：

130、正确答案：B

答案解析：

131、正确答案：D

答案解析：

132、正确答案：C

答案解析：

133、正确答案：B

答案解析：

134、正确答案：C

答案解析：

135、正确答案：D

答案解析：

136、正确答案：E

答案解析：

137、正确答案：B

答案解析：

138、正确答案：A

答案解析：

139、正确答案：B

答案解析：

140、正确答案：B

答案解析：

141、正确答案：E

答案解析：

142、正确答案：E

答案解析：

143、正确答案：E

答案解析：

144、正确答案：E

答案解析：

145、正确答案：A

答案解析：

146、正确答案：A

答案解析：

147、正确答案：D

答案解析：

148、正确答案：B

答案解析：

149、正确答案：D

答案解析：

150、正确答案：B

答案解析：

