

2022 年 中西医执业 第四单元 核心押题卷

1.关于发于皮里膜外、筋肉骨节之间或软或硬、按之有囊性感的包块称为

- A.疽
- B.癭
- C.岩
- D.痰
- E.瘤

参考答案：D

参考解析：痰是指发于皮里膜外、筋肉骨节之间的或软或硬、按之有囊性感的包块，属有形之征，多为阴证。选项 D 正确当选。

2.在外科辨痛时，皮色不红，不热，酸痛，得温则痛缓的疼痛原因应为

- A.气
- B.痰
- C.湿
- D.寒
- E.热

参考答案：D

参考解析：寒痛：皮色不红、不热，酸痛，得温则痛缓。见于脱疽、寒痹等。选项 D 正确当选。

3.以下手术区皮肤的消毒操作错误的是

- A.消毒步骤应该自上而下，自切口中心向外周
- B.对肛门部手术，应以肛门部为中心，逐渐向外周扩展涂擦消毒剂
- C.有延长切口可能时消毒范围应适当扩大
- D.常用消毒剂是 2.5%碘酊和 70%乙醇
- E.对婴儿、口腔、肛门、外生殖器、面部皮肤等处不能使用碘酊消毒

参考答案：B

参考解析：对感染伤口或肛门等处手术，则应自手术区外周逐渐涂向感染伤口或会阴肛门处。选项 B 正确当选。

4.下列不属等渗性缺水病因的是

- A.肠梗阻
- B.大量呕吐
- C.大面积烧伤
- D.腹膜后感染
- E.静脉高营养

参考答案：E

参考解析：静脉高营养为高渗性缺水的病因。等渗性缺水的病因：（1）消化液的急性丢失，如大量呕吐、腹泻、肠痿等。（2）体液在所谓“第三间隙”中积聚，如肠梗阻、急性弥漫性腹膜炎、腹膜后感染等病变时，大量体液聚积于肠腔、腹腔或软组织间隙。（3）大面积烧伤早期大量渗液。

5.术后出现恶心、呕吐、腹胀、呃逆，处理错误的是

- A.对顽固性呃逆可采用颈部膈神经封闭
- B.术后早期发生呃逆可采用压迫眶上缘，针刺内关
- C.顽固性呃逆，可压迫眶上缘，针刺鸠尾
- D.高渗液低压灌肠

E.予以持续胃肠减压

参考答案：C

参考解析：恶心、呕吐、腹胀、呃逆的处理：①予以持续胃肠减压，并可辅以止吐药。②放置肛管，高渗液低压灌肠等。③术后早期发生呃逆可采用压迫眶上缘，针刺内关、足三里、天突、鸠尾等穴位。对顽固性呃逆可采用颈部膈神经封闭。选项C正确当选。

6.治疗局部肿势已退，疮口腐肉已尽，而脓水稀薄色灰，新肉不生，状如镜面，光白板亮，不知疼痛，选用的治法为

- A.凉血清热解毒
- B.泻热养阴
- C.清心开窍
- D.补养气血
- E.温补脾肾

参考答案：E

参考解析：该症状为全身性感染虚陷证：多见于有头疽第4周的收口期。局部肿势已退，疮口腐肉已尽，而脓水稀薄色灰，或偶带绿色，新肉不生，状如镜面，光白板亮，不知疼痛；全身热不退，形神委顿，纳食日减，或有腹痛便泻，自汗肢冷，气息短促；舌淡，苔薄白或无苔，脉沉细或虚大无力。治法：温补脾肾。方药：附子理中汤加减。选项E正确当选。

7.后尿道损伤伴尿潴留应首选的紧急措施是

- A.立即导尿
- B.经会阴手术
- C.耻骨上膀胱造瘘
- D.尿道扩张术
- E.结肠造瘘

参考答案：C

参考解析：尿潴留未能立即手术者，可进行耻骨上膀胱穿刺造瘘引流尿液；经会阴手术是前尿道横断或严重撕裂的手术治疗；尿道扩张术是尿道狭窄的处理措施；结肠造瘘是尿外渗合并直肠损伤的措施。选项C正确当选。

8.单纯性甲状腺肿患者，症见颈部肿块皮宽质软，伴有神情呆滞，倦怠畏寒，行动迟缓，肢冷，性欲下降，舌质淡，脉沉细。其中医治法是

- A.疏肝解郁，健脾益气
- B.疏肝补肾，调摄冲任
- C.疏肝理气，软坚散结
- D.清肝泄胃，解毒消肿
- E.理气开郁，化痰散坚

参考答案：B

参考解析：根据患者临床表现辨证为肝郁肾虚证，治宜疏肝补肾，调摄冲任，方选四海舒郁丸合右归丸加减。选项B正确当选。

9.肺癌转移引起的体征最常见的为

- A.锁骨上淋巴结肿大
- B.锁骨下淋巴结肿大
- C.滑车上淋巴结肿大
- D.腹股沟淋巴结肿大
- E.腋窝淋巴结肿大

参考答案：A

参考解析：肺癌转移引起的体征最常见的为锁骨上淋巴结肿大，也可见腋下淋巴结肿大。

10.以乳房有形状、大小不一的肿块，有疼痛感，与月经周期相关为主要表现的乳腺组织的良性增生性疾病属

- A.乳痈
- B.乳癖
- C.乳核
- D.乳癆
- E.乳癌

参考答案：B

参考解析：乳腺增生病属于中医乳癖范畴。选项B正确当选。

11.胃、十二指肠溃疡大出血最常见的症状是

- A.腹痛
- B.黑便
- C.肠鸣音活跃
- D.胃脘部胀满
- E.体温轻度增高

参考答案：B

参考解析：胃、十二指肠溃疡大出血症状最常见的表现是呕血和黑便。选项B正确当选。

12.门脉高压症内镜检查的最佳时间是在出血

- A.1小时内
- B.4小时内
- C.8小时内
- D.12小时内
- E.24小时内

参考答案：E

参考解析：门脉高压症：内镜检查最好在出血24小时内进行，阳性率高。选项E正确当选。

13.右上腹痛，突发寒战高热，巩膜皮肤黄染，并伴有休克，最可能为

- A.急性胆囊炎
- B.急性胰腺炎
- C.黄疸型肝炎
- D.壶腹部周围肿瘤
- E.急性化脓性梗阻性胆管炎

参考答案：E

参考解析：急性梗阻性化脓性胆管炎：发病急骤，病情进展快，除具有一般胆道感染的Charcot三联征（腹痛、寒战高热、黄疸）外，还可出现休克、中枢神经系统受抑制表现，即Reynolds五联征。

14.急性细菌性前列腺炎，抗生素治疗应首选

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.头孢类抗生素
- D.复方新诺明
- E.喹诺酮类抗生素

参考答案：D

参考解析：复方新诺明能在前列腺液中保持较高浓度，抗菌效果显著。选项D正确当选。

15. 下列属寻常型银屑病临床特征的是

- A. 白色鳞屑、发亮薄膜，点状出血
- B. 丘疹、结痂、鳞屑
- C. 糜烂、渗液、化脓
- D. 红斑、丘疹、流滋
- E. 流滋、糜烂、结痂

参考答案：A

参考解析：寻常型银屑病，白色鳞屑、发亮薄膜和点状出血是本病的临床特征。选项 A 正确当选。

16. 正常妊娠时，绒毛膜促性腺激素出现高峰是在末次月经后

- A. 6~8 周
- B. 8~10 周
- C. 10~12 周
- D. 12~14 周
- E. 14~16 周

参考答案：B

参考解析：绒毛膜促性腺激素，受精后第 6 日开始分泌，妊娠 8~10 周血清中 hCG 浓度达高峰，持续 10 日迅速下降。

17. 下列各项，属进入第二产程征象的是

- A. 产妇屏气向下用力
- B. 胎头部分露于阴道
- C. 产妇排尿困难
- D. 子宫颈口开全
- E. 脐带脱出于阴道口外

参考答案：D

参考解析：第二产程(胎儿娩出期)：从宫口开全到胎儿娩出。选项 D 正确当选。

18. 肾阳不足，封藏失职，冲任不固，可导致的妇科疾病是

- A. 妊娠腹痛
- B. 胎萎不长
- C. 不孕
- D. 经行浮肿
- E. 崩漏

参考答案：E

参考解析：肾气不足，封藏失职，冲任不固，可致月经先期、月经过多、崩漏；胎失所系，胎元不固，可致胎漏、胎动不安、滑胎、子宫脱垂。选项 E 正确当选。

19. 诊断妊娠剧吐引起代谢性酸中毒的重要指标是

- A. 尿量
- B. 管型
- C. 尿比重
- D. 尿酮体
- E. 尿蛋白

参考答案：D

参考解析：尿酮体是诊断妊娠剧吐引起代谢性酸中毒的重要指标。选项 D 正确当选。

20. 下列关于妊娠期高血压疾病基本病理生理变化的叙述，正确的是

- A.妊娠 20 周后血压升高
- B.子宫胎盘灌注不足
- C.胎儿宫内生长受限
- D.全身小血管痉挛
- E.可见蛋白尿

参考答案：D

参考解析：基本病理生理变化是全身小血管痉挛、内皮损伤及局部缺血。选项 D 正确当选。

21.妊娠期检查空腹血浆葡萄糖为何值，可直接诊断为妊娠期糖尿病

- A.>5.1mmol/L
- B.≥5.1mmol/L
- C.<4.4mmol/L
- D.<5.1mmol/L
- E.≥4.4mmol/L

参考答案：B

参考解析：空腹血浆葡萄糖(FPG)测定。妊娠期首次检查 FPG≥5.1mmol/L 者，可直接诊断为 GDM。选项 B 正确当选。

22.臀先露多可自然回转成头位的妊娠时间为

- A.妊娠 28 周前
- B.妊娠 30 周前
- C.妊娠 32 周前
- D.妊娠 34 周前
- E.妊娠 36 周前

参考答案：B

参考解析：妊娠 30 周前，臀先露多可自然回转成头位。选项 B 正确当选。

23.导致慢性胎儿窘迫的原因是

- A.脐带受压
- B.胎盘早剥
- C.孕妇休克
- D.胎儿畸形
- E.宫缩过强或持续时间过长

参考答案：D

参考解析：胎儿慢性缺氧：(1)母体血液氧含量不足；(2)子宫胎盘血管硬化、狭窄、梗死，使绒毛间隙血液灌注不足；(3)胎儿自身因素，如胎儿严重的心血管疾病、胎儿畸形、颅内出血及颅脑损伤等。

24.先兆子宫破裂临床表现中错误的是

- A.胎心率的变化
- B.下腹部压痛
- C.病理缩腹环
- D.休克
- E.血尿

参考答案：D

参考解析：先兆子宫破裂的临床表现：病理缩复环、下腹部压痛、胎心率的变化及血尿是先兆子宫破裂的四个重要症状。由于产程停滞延长，孕妇可有水、电解质紊乱。选项 D 正确当选。

25.属于产褥期抑郁症心脾两虚证主症的是

- A.胸胁乳房胀痛
- B.心烦易怒，善太息
- C.舌暗有瘀斑，脉弦
- D.喜怒无常，少寐多梦
- E.健忘，悲伤欲哭

参考答案：E

参考解析：产褥期抑郁症心脾两虚证的临床表现：产后精神不振，心神不宁，悲伤欲哭，失眠多梦，健忘，伴神疲乏力，面色萎黄。舌淡，苔薄白，脉细弱。选项E正确当选。

26.外阴慢性单纯性苔癣的症状不包括

- A.外阴瘙痒剧烈
- B.皮肤黯红
- C.坐卧不安
- D.影响睡眠
- E.伴灼热疼痛

参考答案：B

参考解析：题干问的是症状，选项B为外阴慢性单纯性苔癣的体征。外阴慢性单纯性苔癣的临床表现：（1）症状：外阴瘙痒剧烈，甚则坐卧不安，影响睡眠，或伴灼热疼痛。（2）体征：病变早期皮肤黯红或粉红，角化过度则呈白色。病损范围主要累及大阴唇、阴唇间沟、阴蒂包皮、阴唇后联合等处，常呈对称性。局部皮肤增厚似皮革或苔癣样变。

27.下列各项，属黄体功能不足脾气虚弱证的主要症状是

- A.月经提前，量少，色淡暗
- B.精神倦怠
- C.腰背酸痛
- D.心悸失眠
- E.少腹胀痛

参考答案：B

参考解析：黄体功能不足脾气虚弱证症见月经提前，或兼量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差，舌淡，脉缓弱。选项B正确当选。

28.下列各项，不属于子宫肌瘤药物治疗适应证的是

- A.年轻要求生育者
- B.症状较轻
- C.身体虚弱不能手术者
- D.有手术禁忌证
- E.子宫肌瘤如孕4月大小

参考答案：E

参考解析：药物治疗适用于症状轻、近绝经年龄及全身情况不宜手术者。选项E正确当选。

29.下述诊断葡萄胎最常用而又比较准确的方法是

- A.出现卵巢黄素化囊肿
- B.妊娠试验
- C.超声诊断
- D.子宫大于孕月
- E.停经后阴道出血

参考答案：C



参考解析：超声检查为最常用而又比较准确的诊断方法。

30.治疗重度子宫内膜异位症，对于年轻无生育要求的患者，采用何种方法

- A.假孕疗法
- B.假绝经疗法
- C.手术切除病灶
- D.根治性手术
- E.半根治性手术

参考答案：E

参考解析：半根治手术：无生育要求，病灶严重，而年龄较轻者（<45岁），可行子宫和病灶全切，但尽可能保留一侧正常的卵巢组织，以避免绝经期症状过早出现。一般认为半根治术后复发率低，后遗症少。切除子宫可去除具有活力的子宫内膜细胞种植的来源，从而可减少复发机会。但因保留了卵巢仍有可能复发。

31.起病急骤，全身症状重，高热、恶寒，无汗或汗出热不解，心烦，目赤咽红，舌质红，苔黄，脉数。其证型是

- A.风寒感冒
- B.暑邪感冒
- C.风热感冒
- D.时邪感冒
- E.气虚感冒

参考答案：D

参考解析：时邪感冒的证候：起病急骤，全身症状重。高热，恶寒，无汗或汗出热不解，头痛，心烦，目赤咽红，肌肉酸痛，腹痛，或有恶心、呕吐，舌质红，舌苔黄，脉数。治法：清瘟解毒。方药：银翘散合普济消毒饮加减。选项D正确当选。

32.治疗病毒性心肌炎湿热侵心证的首选方剂是

- A.生脉散
- B.银翘散
- C.甘麦大枣汤
- D.复脉汤
- E.葛根黄芩黄连汤

参考答案：E

参考解析：病毒性心肌炎之湿热侵心证。证候：寒热起伏，全身肌肉酸痛，恶心呕吐，腹痛泄泻，心悸胸闷，肢体乏力，舌质红，苔黄腻，脉濡数或结代。治法：清热化湿，宁心复脉。方药：葛根黄芩黄连汤加减。

33.引起小儿腹泻的病因不包括的是

- A.感受外邪
- B.饮食所伤
- C.脾胃虚弱
- D.脾肾阳虚
- E.肺脾气虚

参考答案：E

参考解析：引起小儿腹泻的病因主要有：（1）感受外邪；（2）伤于饮食；（3）脾胃虚弱；（4）脾肾阳虚。故根据题干要求，此题的正确选项是E。

34.下列各项，不属肾病综合征常见并发症的是

- A.感染

- B.电解质紊乱
- C.肾静脉血栓
- D.高血压脑病
- E.生长迟缓

参考答案：D

参考解析：肾病综合征常见并发症：感染；电解质紊乱和低血容量；血栓形成；肾小管功能障碍；急性肾衰竭；肾上腺危象；生长迟缓。选项D正确当选。

35.中医认为病毒性脑炎的病情演变总不离热、痰、风的相互转化，其始动因素是

- A.风
- B.痰
- C.热
- D.瘀
- E.寒

参考答案：C

参考解析：病毒性脑炎的病邪轻重不一，但总不离热痰风的相互转化。“热盛生风，风盛生痰，痰盛生惊”。热为生风生痰的始动因素。选项C正确当选。

36.下列各项，不属注意力缺陷多动障碍临床特征的是

- A.男孩多于女孩
- B.注意力不集中
- C.智力低下
- D.做事马虎
- E.冲动任性

参考答案：C

参考解析：本病患者大多智力正常或接近正常，但因多动、注意力不集中而给学习带来一定的困难。选项C正确当选。

37.中医治疗免疫性血小板减少症气不摄血证的首选方剂是

- A.归脾汤
- B.四物汤
- C.八珍汤
- D.桃仁汤
- E.生脉散

参考答案：A

参考解析：免疫性血小板减少症气不摄血证，治法：益气健脾，摄血养血。方药：归脾汤加减。选项A正确当选。

38.过敏性紫癜与血小板减少性紫癜鉴别最简便的实验室检查是

- A.血沉
- B.血常规
- C.大便常规
- D.尿常规
- E.骨髓检查

参考答案：B

参考解析：免疫性血小板减少症多为散在针尖大小出血点，不高出皮肤，易磕碰处分布较多，血小板计数减少，出血时间延长，骨髓中成熟巨核细胞减少。选项B正确当选。

39.水痘患儿，低热恶寒，鼻塞流涕，疹色红润，疱浆清亮，点粒稀疏，根盘红晕不明显，

舌质红，苔薄白，脉浮数。其证型是

- A.风热重证
- B.肺胃蕴热证
- C.毒热重证
- D.邪郁肺卫证
- E.毒在气营证

参考答案：D

参考解析：水痘的邪郁肺卫证。证候：发热轻微，或无热，鼻塞流涕，喷嚏，咳嗽，起病后1~2天出皮疹，疹色红润，疱浆清亮，根盘红晕，皮疹瘙痒，分布稀疏，多见于躯干、颜面及头皮，舌质淡，苔薄白，脉浮数。选项D正确当选。

40.婴儿心肺复苏操作过程中，胸部按压的幅度是

- A.2cm
- B.3cm
- C.4cm
- D.5cm
- E.6cm

参考答案：C

参考解析：婴儿心肺复苏术方法是患儿仰卧于硬板床上，两拇指放置于胸骨下1/3处，其余四指环绕胸廓，按压时仅拇指用力。按压幅度婴儿约为4cm，儿童约为5cm。选项C正确当选。

41.患者女性，28岁，手术后出现表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快，心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和U波出现，属

- A.轻度脱水
- B.中度脱水
- C.重度脱水
- D.低钾血症
- E.高钾血症

参考答案：D

参考解析：低钾血症临床表现有：①神经肌肉系统症状表情淡漠、倦怠嗜睡或烦躁不安；肌肉无力，腱反射迟钝或消失，眼睑下垂；当血清钾 $<2.5\text{mmol/L}$ 时，可出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难。②心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和U波出现，或T、U波融合。选项D正确当选。

42.患者，男，45岁。烧伤后见精神恍惚，语声低微，口唇紫绀，四肢厥冷，舌暗紫，有瘀点，脉细数。除相关西医治疗外，首选的中医治疗方药是

- A.清营汤加减
- B.人参养营汤加减
- C.四味回阳饮加减
- D.保元汤合固阳汤加减
- E.独参汤合四逆汤加减

参考答案：A

参考解析：休克热伤营血证，证候：精神恍惚，语声低微，唇甲紫绀，四肢厥冷，发斑出血；舌质暗紫有瘀点，脉数。治法：气血两清，益气补阴。方药：清营汤加减。选项A正确当选。

43.患者，男，60岁，鼻唇沟毛囊处出现红肿热痛小结节，逐渐肿大隆起3天，近两天中央

部坏死，出现脓栓，红肿热痛加重。处理不当容易引起

- A.面部蜂窝织炎
- B.化脓性海绵状静脉窦炎
- C.脑脓肿
- D.化脓性脑膜炎
- E.败血症

参考答案：B

参考解析：面部“危险三角区”的布，沿眼内眦静脉和眼静脉感染到颅内，引起化脓性海绵状静脉窦炎，出现延及眼部周围的红肿、硬块、疼痛，并有全身寒战高热、头痛、昏迷，甚至死亡。选项B正确当选。

44.患者，男，20岁，因施工塌方压伤右前胸引起胸痛、呼吸困难，前胸有一块胸壁软化区，并见反常呼吸运动，X线检查示右侧4~8肋骨骨折，但无血气胸。应首选的治疗措施是

- A.给氧
- B.固定胸壁
- C.肋间神经阻滞及骨折处封闭
- D.使用呼吸兴奋剂
- E.支气管扩张剂

参考答案：B

参考解析：闭合性多根多处肋骨骨折若胸壁软化范围较小，除止痛外尚需局部压迫包扎。胸壁反常呼吸运动的局部处理包扎固定法；牵引固定法；内固定法。选项B正确当选。

45.患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的是

- A.皮脂腺囊肿
- B.神经纤维瘤
- C.皮样囊肿
- D.脂肪瘤
- E.淋巴管瘤

参考答案：B

参考解析：从题干中的咖啡色斑块以及结合其他表现可诊断该患者为神经纤维瘤。神经纤维瘤有如下特点：（1）呈多发性，数目不定，几个甚至上千个不等。肿物大小不一，米粒至拳头大小，多凸出于皮肤表面，质地或软或硬，有的可下垂或者有蒂，大者可达十数千克。（2）肿瘤沿神经干走向生长，多呈念珠状，或呈蚯蚓结节状。（3）皮肤出现咖啡斑，大小不定，可为雀斑小点状，或为大片状，其分布与神经瘤分布无关，是诊断本病的重要依据。

46.甲状腺癌患者，肿块坚硬如石，推之不移，局部僵硬，形体消瘦，皮肤枯槁，声音嘶哑，腰酸无力，舌苔红，少苔，脉沉细数。治疗应首选的方剂是

- A.海藻玉壶汤合逍遥散
- B.桃红四物汤合海藻玉壶汤
- C.通窍活血汤合养阴清肺汤
- D.柴胡疏肝散合海藻玉壶汤
- E.龙胆泻肝汤合藻药散

参考答案：C

参考解析：根据患者临床表现辨证为瘀热伤阴证，治宜养阴和营，化痰散结，方选通窍活血汤合养阴清肺汤加减。选项C正确当选。

47.患者，女，30岁，双乳内多发肿块，为确定肿块为实性或囊性，最好的检查方法是

- A.钼靶 X 线摄片
- B.CT
- C.B 超
- D.近红外线透照检查
- E.热图像检查

参考答案：C

参考解析：B 型超声波检查显示肿块为实质性，边界清楚。选项 C 正确当选。

48.患者男性，45 岁，消化性溃疡反复发作 20 年，近 1 个月来出现食欲减退，上腹部饱胀及沉重感，呕吐频繁，呕吐量大且含有酸臭味的宿食，呕吐物中不含胆汁，吐后上腹饱胀减轻，腹痛消失，明显消瘦，可见到上腹部的胃蠕动波、胃型、胃震水声，应诊断为

- A.消化性溃疡合并幽门梗阻
- B.肠梗阻
- C.贲门梗阻
- D.弥漫性腹膜炎
- E.食管癌

参考答案：A

参考解析：结合患者的溃疡病史以及胃潴留的症状考虑该患者为消化性溃疡合并幽门梗阻。

49.患者突发腹痛，并逐渐转移至右下腹，进行性加剧，右下腹压痛、反跳痛阳性，腹皮挛急，可摸及包块，壮热，恶心纳差，便秘，舌红，苔黄腻，脉滑数。治疗可与大黄牡丹汤合用的方剂是

- A.复方大柴胡汤
- B.透脓散
- C.白虎汤
- D.犀角地黄汤
- E.托里消毒散

参考答案：A

参考解析：根据题干的表述可诊断为急性阑尾炎之湿热证，治宜通腑泄热，利湿解毒，方选复方大柴胡汤加减。选项 A 正确当选。

50.患者，男，3 岁，啼哭时可见腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行突现一圆形囊性包块，进入阴囊，平卧时可自行回纳。应首先考虑的是

- A.脐疝
- B.股疝
- C.切口疝
- D.腹股沟直疝
- E.腹股沟斜疝

参考答案：E

参考解析：腹股沟直疝不进入阴囊，股疝常在腹股沟韧带下方卵圆窝处出现，脐疝与题干不符，题干中未提及有切口，所以也不考虑切口疝。故本题选腹股沟斜疝。选项 E 正确当选。

51.患者，男，50 岁，诊断为结肠癌，症见腹胀，腹泻，腰膝酸软，不思饮食，四肢无力，失眠倦怠，尿少；舌淡，脉细无力。治疗应首选

- A.桃红四物汤
- B.八珍汤合麻仁滋脾丸
- C.益气固本解毒汤
- D.槐角地榆汤



E.失笑散合膈下逐瘀汤

参考答案：C

参考解析：患者的表现辨证为脾肾两虚证。证候：腹胀，腹泻，腰膝酸软，不思饮食，四肢无力，失眠倦怠，尿少；舌淡，脉细无力。治法：健脾益肾，扶正固本。方药：益气固本解毒汤加减。

52.患者，男，35岁。尿频，尿道灼痛，会阴部隐痛1周。前列腺液镜检：白细胞增多，卵磷脂小体减少。应首先考虑的中医诊断是

- A.精癯
- B.子痛
- C.子痰
- D.水疝
- E.精浊

参考答案：E

参考解析：患者出现尿频，尿道灼痛，会阴部隐痛。前列腺液镜检白细胞增多，卵磷脂小体减少。这些症状符合慢性前列腺炎的诊断要点。慢性前列腺炎中医称为精浊。选项E正确当选。

53.患者，女，38岁。商场营业员，左下肢沉重、酸胀，时有疼痛，行走时明显，检查可见左下肢浅静脉隆起、迂曲，状如蚯蚓，足靴区出现色素沉着，应诊断为

- A.动脉硬化性闭塞症
- B.下肢深静脉血栓形成
- C.游走性浅静脉炎
- D.血栓闭塞性脉管炎
- E.下肢静脉曲张

参考答案：E

参考解析：单纯性下肢静脉曲张症状：(1)患肢浅静脉隆起、扩张、迂曲，状如蚯蚓，甚者呈大团块，站立时明显；严重者可于静脉迂曲处触及“静脉结石”。(2)患肢沉重感，酸胀感，时有疼痛。尤其当患者行走久时由于血液倒流而致静脉淤积加重，回流受影响而出现诸症状。选项E正确当选。

54.患者，男，65岁，诊断为湿疹，症见皮损色暗6年余，剧痒，伴口干不欲饮，纳差，腹胀；舌质淡，苔白，脉弦细，选用的治法是

- A.清热利湿
- B.健脾利湿
- C.养血润肤，祛风止痒
- D.祛风除湿，杀虫止痒
- E.健脾利湿，清热解毒

参考答案：C

参考解析：湿疹血虚风燥证，证候：病程久，皮损色暗或色素沉着，剧痒，或皮损粗糙肥厚；伴口干不欲饮、纳差、腹胀；舌质淡，苔白，脉弦细。治法：养血润肤，祛风止痒。方药：当归饮子加减。

55.患者，男，32岁，外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑，选用的方药为

- A.龙胆泻肝汤
- B.除湿胃苓汤
- C.萆薢渗湿汤

D.黄连解毒汤

E.草薢化毒汤

参考答案：E

参考解析：该患者为尖锐湿疣湿毒下注证。证候：外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。治法：利湿化浊，清热解毒。方药：草薢化毒汤加黄柏、土茯苓、大青叶。

56.患儿，2岁。生后至今不会站立与行走，头项歪斜。其病变脏腑主要是

A.心肝

B.心肾

C.肺脾

D.心肺

E.脾肾

参考答案：E

参考解析：脾为后天之本，主运化水谷精微，为气血生化之源。肾为先天之本，小儿肾常虚表现为肾气未盛，肾精未充，骨骼未坚，齿未长或长而未坚。选项E正确当选

57.足月男婴，生后4天出现目珠发黄，全身发黄，逐日加重，伴腹部胀满，右胁下痞块，神疲纳呆，小便短黄，大便灰白，舌紫暗，舌苔白。其治疗首选方剂是

A.血府逐瘀汤加减

B.茵陈理中汤加减

C.茵陈蒿汤加减

D.羚角钩藤汤加减

E.茵陈四苓散加减

参考答案：A

参考解析：新生儿黄疸气滞血瘀证，证候：面目皮肤发黄，颜色晦滞，日益加重，腹部胀满，右胁下痞块，神疲纳呆，小便短黄，大便不调或灰白，舌紫暗有瘀斑、瘀点，舌苔黄或白。治法：化瘀消积退黄。方药：血府逐瘀汤加减。选项A正确当选。

58.患儿，5岁。咳喘反复发作2年余。昨日突发咳喘，喉间痰鸣，声高息涌，张口抬肩，呼气延长。临床诊断最可能是

A.咳嗽

B.肺炎喘嗽

C.哮喘

D.感冒夹痰

E.顿咳

参考答案：C

参考解析：哮喘是一种反复发作的哮鸣气喘疾病。临床以发作时喘促气急，喉间痰吼哮鸣，呼气延长，严重者不能平卧，呼吸困难，张口抬肩，摇身撷肚，唇口青紫为特征。选项C正确当选。

59.患儿，着凉后述胸闷气短，乏力，低热，恶心呕吐，心率快，心音低钝，心肌酶升高，心电图示ST段抬高，低电压，下列处置方法错误的是

A.加强体育锻炼，增加运动量

B.避免情绪波动

C.安静卧床

D.易消化富营养饮食

E.营养心肌，改善心肌代谢，稳定心功能

参考答案：A

参考解析：病毒性心肌炎急性期需卧床休息，以减轻心脏负荷。选项A正确当选。

60.患儿，男，4个月。母乳喂养，腹泻已两个半月，大便每日6~7次，食欲好。身体一般状况良好。应首先考虑的诊断是

- A.霉菌性肠炎
- B.大肠杆菌性肠炎
- C.病毒性肠炎
- D.生理性腹泻
- E.过敏性肠炎

参考答案：D

参考解析：根据题干中给出的信息，患儿为4个月大婴儿，除了每日大便次数增多外，其他无特殊症状的表现。生理性腹泻多见于6个月以内婴儿，生后不久即出现腹泻，除大便次数增多外，无其他症状，食欲好，不影响生长发育。因此，此题中最佳的选项是D。

61.患儿，6岁。浮肿4天，小便量少色赤，烦热口渴，头身困重，尿蛋白(+)，红细胞20个/高倍视野，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其首选方剂是

- A.五苓散
- B.龙胆泻肝汤
- C.五味消毒饮
- D.温胆汤
- E.麻黄连翘赤小豆汤

参考答案：C

参考解析：急性肾小球肾炎湿热内侵证，证候：浮肿或轻或重，小便黄赤而少，甚者尿血，烦热口渴，头身困重，常有近期疮毒史，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热利湿，凉血止血。方药：五味消毒饮合小蓟饮子加减。选项C正确当选。

62.患儿，3岁。发作性瞪目直视，神志恍惚，痰涎壅盛，喉间痰鸣，发作后玩耍如常。舌苔白腻，脉滑。其治法是

- A.涤痰开窍
- B.健脾化痰
- C.化瘀通窍
- D.息风止痉
- E.镇惊安神

参考答案：A

参考解析：根据患儿的证候表现可诊断为痰痫，治法：涤痰开窍。方药：涤痰汤。选项A正确当选。

63.患儿，男，3岁。诊断为营养性缺铁性贫血，证见面色萎黄，唇甲淡白，发黄枯燥，容易脱落，心悸气短，头晕目眩，夜寐欠安，语声低微，精神萎靡，食欲不振，舌淡红，苔薄白，脉细弱，指纹淡红。其首选方剂是

- A.归脾汤
- B.左归丸
- C.右归丸
- D.异功散
- E.参苓白术散

参考答案：A

参考解析：此患儿为心脾两虚证的表现。证候：面色萎黄或苍白，唇甲淡白，发黄枯燥，容

易脱落，心悸气短，头晕目眩，夜寐欠安，语声低弱，精神萎靡，注意力不集中，食欲不振，舌淡红，苔薄白，脉细弱，指纹淡红。治法：补脾养心，益气生血。方药：归脾汤加减。选项 A 正确当选。

64. 患儿，2 岁。持续发热 1 周，体温 39℃ 左右。查体：发热面容，双眼结膜充血，右侧颈部可触及多个蚕豆大小淋巴结，质硬，活动度尚可，口腔黏膜弥漫充血，躯干部见粟粒状均匀皮疹，疹间皮肤潮红，手指、足趾端皮肤发红，肿胀。心肺听诊未闻异常。舌质红赤，杨梅舌，指纹紫。实验室检查：血沉明显增快，C 反应蛋白阳性，抗“O”滴度正常。应首先考虑的 diagnosis 是

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 猩红热
- C. 皮肤黏膜淋巴结综合征
- D. 风湿热
- E. 幼年型类风湿关节炎

参考答案：C

参考解析：皮肤黏膜淋巴结综合征诊断要点：不明原因发热，持续 5 天或更久。双侧球结膜弥漫性充血。口腔及咽部黏膜弥漫性充血，唇发红及干裂，并呈杨梅舌。发病初期手足硬肿和掌跖发红，恢复期指（趾）端出现膜状脱皮或肛周脱屑。躯干部多形充血性红斑。颈淋巴结非化脓性肿大，实验室检查示血沉明显增快，C 反应蛋白增高。选项 C 正确当选。

65. 患儿，男，6 岁。腹痛剧烈，以右上腹为主，疼痛时发凉，恶心呕吐，并吐出蛔虫。其诊断为

- A. 呕吐
- B. 蛔厥证
- C. 腹痛
- D. 虫瘕证
- E. 肠虫证

参考答案：B

参考解析：此患儿表现为蛔虫病之蛔厥证。蛔厥证证候：具有蛔虫证的一般症状。突然右上腹阵发性绞痛，弯腰曲背，辗转不安，恶心、呕吐，肢冷汗出，常吐出蛔虫。重者腹痛持续，时轻时剧，畏寒发热，甚则出现黄疸。舌苔黄腻，脉弦数或滑数。选项 B 正确当选。

66. 患者，女，31 岁。妊娠早期少量阴道流血，色淡暗，腰酸、腹坠，孕 5 产 0，舌淡，苔白，脉沉细滑尺弱。B 超提示宫内单活胎。应首选的治疗措施是

- A. 肌注缩宫素，口服生化汤
- B. 肌注黄体酮，口服六味地黄丸
- C. 肌注黄体酮，口服寿胎丸
- D. 宫颈环扎术，口服泰山磐石散
- E. 宫颈口环扎术，口服寿胎丸

参考答案：C

参考解析：患者妊娠早期少量阴道流血，腰酸、腹坠，B 超提示宫内单活胎，可诊断为先兆流产，中医称为胎动不安。由患者临床表现辨证为肾虚证。治法为补肾益气，固冲安胎。代表方为寿胎丸加党参、白术。西医治疗：卧床休息，禁止性生活，黄体功能不足者可肌注黄体酮和维生素 E。选项 C 正确当选。

67. 患者，女，29 岁，妊娠期间身目俱黄，色鲜明如橘子色，右胁胀痛，恶心厌食，口苦咽干，胸胁痞满，倦怠乏力，尿黄便坚；舌质红，苔黄腻，脉弦滑，治疗首选

- A. 胃苓汤

- B.逍遥散
- C.茵陈蒿汤
- D.犀角地黄汤
- E.黄连解毒汤

参考答案：C

参考解析：妊娠合并急性病毒性肝炎湿热蕴结证。证候：妊娠期间身目俱黄，色鲜明如橘子色，右胁胀痛，恶心厌食，口苦咽干，胸胁痞满，倦怠乏力，尿黄便坚；舌质红，苔黄腻，脉弦滑或濡数。治法：清热利湿，佐以安胎。方药：茵陈蒿汤加金钱草、虎杖、寄生、续断。

68.患者，女，32岁，已婚未育。孕29周，昨晚因食用不洁食物出现腹泻，今晨自觉胎动异常，下列哪项提示胎儿缺氧

- A.胎动8次/12小时
- B.胎动15次/12小时
- C.胎动20次/12小时
- D.胎动25次/12小时
- E.胎动30次/12小时

参考答案：A

参考解析：胎动小于10次/12小时为胎动减少，是胎儿缺氧的重要表现。选项A正确当选。

69.患者，女，27岁。产后2周，高热汗出，烦躁，斑疹隐隐，舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。化验血：白细胞： $20 \times 10^9/L$ 。治疗应首选的方剂是

- A.解毒活血汤
- B.荆防败毒散
- C.紫雪丹
- D.安宫牛黄丸
- E.清营汤

参考答案：E

参考解析：产褥感染之热入营血证，证候：产后高热汗出，烦躁不安，皮肤斑疹隐隐；舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。治法：清营解毒，散瘀泄热。方药：清营汤加紫花地丁、蒲公英、栀子、丹皮。选项E正确当选。

70.患者，女，48岁。外阴干燥瘙痒，灼热疼痛，夜间尤甚，伴头晕目眩，腰膝酸软，双目干涩，舌红少苔，脉细数。妇科检查见局部皮肤黏膜萎缩，色素减退。其中医治法是

- A.补益肝肾，养荣润燥
- B.疏肝解郁，养血通络
- C.益气养血，润燥止痒
- D.温肾健脾，养血润燥
- E.滋肾降火，调补肝肾

参考答案：A

参考解析：患者外阴干燥瘙痒，妇科检查见局部皮肤黏膜萎缩，色素减退，诊断为外阴硬化性苔藓。头晕目眩，腰膝酸楚，舌红、苔少、脉细数，辨证为肝肾阴虚证。治法为补益肝肾，养荣润燥。选项A正确当选。

71.患者，女，36岁，带下量增多一个月，色黄，呈脓样，阴痒，口干口苦，小便黄赤，大便干结，舌苔薄黄腻，脉弦数。西医诊断为阴道炎，治疗应首选的方剂是

- A.内补丸
- B.完带汤
- C.龙胆泻肝汤

D.萹薹渗湿汤

E.仙方活命饮

参考答案：C

参考解析：此患者表现为阴道炎之肝经湿热证。证候：带下多，色白或黄，呈泡沫状或黄绿如脓，甚或杂有赤带，有臭味，外阴瘙痒，头晕目胀，心烦口苦，胸胁、少腹胀痛，尿黄便秘；舌质红，苔黄，脉弦涩。治则：清热利湿，杀虫止痒。方药：龙胆泻肝汤加苦参、百部、蛇床子。

72.患者，女，35岁，G3P2。流产后月经9~10天/28~30天，量中等，痛经(-)，基础体温为双相但下降缓慢。首先应考虑的诊断是

A.无排卵性异常子宫出血

B.黄体功能不全

C.排卵期出血

D.子宫内膜不规则脱落

E.正常月经

参考答案：D

参考解析：基础体温测定：子宫内膜不规则脱落呈双相型，但下降缓慢。选项D正确当选。

73.患者，女，20岁。1年来经行后小腹隐隐作痛，喜按，月经量少，色淡、质稀，头晕耳鸣，腰膝酸软，舌淡红，脉沉细。治疗应首选的方剂是

A.肾气丸

B.调肝汤

C.八珍益母丸

D.归肾丸

E.当归地黄饮

参考答案：B

参考解析：痛经肝肾亏损证，证候：经期或经后小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣；舌质淡，脉沉细弱。治法：滋肾养肝，调经止痛。方药：调肝汤加桑寄生、肉苁蓉。选项B正确当选。

74.患者，女，32岁。结婚5年未孕，月经规则，自觉胸脘痞闷，带下量多、色白、质黏，舌苔白腻，脉细滑。妇科检查：子宫如孕2个月大小，宫底部明显突出，质硬，B超检查为单个结节，血红蛋白90g/L。应首选的治疗措施是

A.甲睾酮加开郁二陈汤

B.雌激素加开郁二陈汤

C.输血加开郁二陈汤

D.子宫肌瘤摘除术

E.子宫次全切除术

参考答案：D

参考解析：根据症状子宫如孕2个月大小，宫底部明显突出，质硬，B超检查为单个结节，血红蛋白90g/L，提示肌瘤较大，又因患者未孕，故考虑子宫肌瘤摘除术。选项D正确当选。

75.患者，女，31岁，已婚。人工流产术后1年，经行腹痛逐渐加重，灼痛难忍，拒按，月经量多，色深红，带下色黄，有味，舌质暗，苔黄腻，脉滑数。妇科检查：后穹隆可触及蚕豆大小的触痛性结节。治疗应首选

A.血府逐瘀汤

B.清热调血汤

C.膈下逐瘀汤



D.失笑散

E.银甲丸

参考答案：B

参考解析：根据患者临床表现诊断为子宫内膜异位症之痰热互结证，治法为清热凉血，活血祛瘀，代表方为清热调血汤加红藤、薏苡仁、败酱草。选项B正确当选。

76.一农妇，诉阴道脱出一物3年，查体：宫颈已脱出至阴道口外，宫体在阴道内，双附件无异常，诊断为子宫脱垂。其程度应属于

A. I度轻

B. I度重

C. II度轻

D. II度重

E. III度

参考答案：C

参考解析：子宫脱垂分度：检查时嘱患者平卧并用力向下屏气。I度：轻型：子宫颈外口距处女膜缘<4cm，但未达处女膜缘；重型：宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈。

II度：轻型：子宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内；重型：宫颈及部分宫体已脱出于阴道口。III度：子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

77.患者，女，28岁，被诊断为内分泌性不孕，体内有一定雌激素水平首选的促排卵药为

A.氯米芬

B.溴隐亭

C.尿促性素

D.卵泡刺激素

E.促性腺激素释放激素

参考答案：A

参考解析：内分泌性不孕的治疗，促排卵是最常用的方法氯米芬为首选促排卵药，适于体内有一定雌激素水平者。

78.患者，女，27岁。人工流产后4天，寒战、高热，小腹疼痛，阴道出血时多时少，色暗如败酱，气味臭秽，腰酸下坠，舌质红，苔黄腻，脉细数。治疗应首选的方剂是

A.固经丸

B.生化汤

C.清经散

D.清热调血汤

E.仙方活命饮

参考答案：A

参考解析：流产后出血之湿热壅滞证，证候：出血量时多时少，色紫暗如败酱，质黏腻，有臭气，小腹作痛，腰酸下坠，纳呆口腻，小便黄；舌红或有紫点，苔黄腻，脉细数。治法：清利湿热，化瘀止血。方药：固经丸加马齿苋、慧苡仁、仙鹤草。选项A正确当选。

79.患者，女，31岁。葡萄胎2次清宫后2个月，阴道不规则流血持续存在，尿HCG(+)，B超检查示：子宫肌层呈蜂窝样改变。首先应考虑的诊断是

A.持续性葡萄胎

B.侵蚀性葡萄胎

C.绒癌

D.胎盘部位滋养细胞肿瘤

E.子宫内膜癌

参考答案：B

参考解析：侵蚀性葡萄胎多数发生在葡萄胎排空后6个月内。持续的阴道不规则流血。侵蚀性葡萄胎大体检查见子宫肌壁内有大小不等、深浅不一的水泡状组织，宫腔内可以没有原发病灶。选项B正确当选。

80.患者，女，51岁。月经紊乱，潮热汗出，头晕耳鸣，腰酸膝软，时有畏寒，时有烘热汗出，舌淡，苔薄，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.右归丸
- B.右归饮
- C.二仙汤
- D.二仙汤合二至丸
- E.右归丸合二至丸

参考答案：D

参考解析：绝经综合征之肾阴阳两虚证，治法：滋阴补肾，调补冲任。方药：二仙汤合二至丸。选项D正确当选。

综合分析题

患者，男，62岁。症见脘腹胀满，胁痛肢楚，神疲乏力，纳呆便溏，四肢肿胀，既往乙肝病史13年，CT可见肝区肿块，舌淡胖，苔白腻，脉弦滑。

81.其诊断是

- A.肝硬化
- B.肝炎
- C.肝癌
- D.胃癌
- E.胃溃疡

参考答案：C

参考解析：根据患者乙肝病史，肝区肿块及现症诊断为肝癌。选项C正确当选。

82.其证型是

- A.气滞血瘀证
- B.肝胆湿热证
- C.肝肾阴虚证
- D.脾虚湿困证
- E.阴阳两虚证

参考答案：D

参考解析：肝癌脾虚湿困证：相内于单纯型II期或硬化型II期伴有腹水。症见脘腹胀满，胁痛肢楚，神疲乏力，纳呆便溏，四肢肿胀；舌淡胖，苔白或腻，脉弦而滑。选项D正确当选。

83.其治疗是

- A.疏肝理气，活血化瘀
- B.益气健脾，化湿祛痰
- C.清利湿热，活血化瘀
- D.养阴散结，凉血解毒
- E.滋阴助阳

参考答案：B

参考解析：肝癌脾虚湿困证，治法：益气健脾，化湿祛痰。选项B正确当选。

84.治疗应首选

- A.小柴胡汤
- B.茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减
- C.青蒿鳖甲汤合一贯煎加减
- D.四君子汤合逍遥散加减
- E.八珍汤

参考答案：D

参考解析：肝癌脾虚湿困证，方药：四君子汤合逍遥散加减。选项D正确当选。

综合分析题

患儿，男，4岁。大便秘结，脘腹胀痛，不思饮食，手足心热，小便黄，恶心呕吐，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。

85.其诊断是

- A.乳食积滞便秘
- B.燥热内结便秘
- C.气机郁滞便秘
- D.气虚不运便秘
- E.血虚肠燥便秘

参考答案：A

参考解析：根据患儿的证候表现可诊断为便秘乳食积滞证。选项A正确当选。

86.其治法是

- A.消积导滞，清热和中
- B.清腑泄热，润肠通便
- C.疏肝理气，导滞通便
- D.健脾益气，润肠通便
- E.滋阴养血，润肠通便

参考答案：A

参考解析：便秘乳食积滞证，治法：消积导滞，清热和中。选项A正确当选。

87.治疗应首选

- A.麻子仁丸加减
- B.六磨汤加减
- C.黄芪汤加减
- D.润肠丸加减
- E.枳实导滞丸加减

参考答案：E

参考解析：便秘乳食积滞证，方药：枳实导滞丸加减。选项E正确当选。

配伍选择题

- A.热肿
- B.寒肿
- C.风肿
- D.湿肿
- E.痰肿

88.皮肉重垂胀急，深按凹陷，如烂棉不起，浅则光亮如水疱，破流黄水，浸淫皮肤的是

参考答案：D

参考解析：湿肿：皮肉重垂胀急，深按凹陷，如烂棉不起，浅则光亮如水疱，破流黄水，浸淫皮肤。见于湿疮。选项D正确当选。

89. 肿而不硬，皮色不泽，苍白或紫暗，皮肤清冷，常伴有酸痛的是

参考答案：B

参考解析：寒肿：肿而不硬，皮色不泽，苍白或紫暗，皮肤清冷，常伴有酸痛，得暖则舒。见于冻疮、脱疽。选项B正确当选。

配伍选择题

A. 寒痛

B. 气痛

C. 湿痛

D. 痰痛

E. 瘀血痛

90. 疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛的是

参考答案：D

参考解析：痰痛：疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛。见于脂瘤、肉瘤等。

91. 皮色不红、不热，酸痛，多见于脱疽的是

参考答案：A

参考解析：寒痛：皮色不红、不热，酸痛，得温则痛缓。见于脱疽、寒痹等。

配伍选择题

A. 黏膜表面麻醉

B. 局部浸润麻醉

C. 区域阻滞麻醉

D. 神经阻滞麻醉

E. 以上均非

92. 常用于眼、鼻腔、咽喉、气管及尿道等部位的表浅手术的麻醉方法是

参考答案：A

参考解析：黏膜表面麻醉：用渗透性强的局麻药与黏膜接触，产生黏膜痛觉消失的方法称为黏膜表面麻醉，亦称为黏膜麻醉。常用于眼、鼻腔、咽喉、气管及尿道等部位的表浅手术或内镜检查术。

93. 适用于皮下小囊肿摘除的麻醉方法是

参考答案：C

参考解析：区域阻滞麻醉：在手术部位的周围和基底部浸润局麻药，以阻滞进入手术区域的神经支和神经末梢，称区域阻滞麻醉。本法最适用于皮下小囊肿摘除，浅表小肿块活检，舌、阴茎或带蒂肿块等手术和乳腺手术。

配伍选择题

A. 极度口渴，乏力，眼窝明显凹陷

B. 出现烦躁、谵妄，血压下降乃至休克

C. 乏力、头昏、手足麻木，但无口渴感

D. 厌食、恶心、呕吐，脉搏细速，血压不稳定或下降，脉压变小

E. 肌痉挛性抽痛，病人神志不清，常伴有严重休克



94.低渗性缺水重度缺钠的症状是

参考答案：E

参考解析：低渗性缺水重度缺钠：血钠 $<120\text{mmol/L}$ 。除有中度缺钠症状外，还有肌痉挛性抽痛、腱反射减弱或消失，病人神志不清、木僵乃至昏迷。常伴有严重休克、少尿或无尿。尿素氮升高。选项E正确当选。

95.高渗性缺水中度缺水的症状是

参考答案：A

参考解析：高渗性缺水中度缺水：失水量占体重的 $4\%\sim 6\%$ 。极度口渴，乏力，眼窝明显凹陷，唇舌干燥，皮肤弹性差，心率加速，尿少，尿比重增高。选项A正确当选。

配伍选择题

A.肝酶谱升高

B.血清电解质紊乱

C.微量元素缺乏

D.高渗性非酮性昏迷

E.胆囊内结石，胆泥淤滞

96.属肠外营养氨基酸并发症的是

参考答案：A

参考解析：肠外营养氨基酸并发症有：高血氨、高氯性代谢性酸中毒；肝酶谱升高；脑病。

97.肠外营养糖代谢紊乱的并发症是

参考答案：D

参考解析：肠外营养糖代谢紊乱可发生高渗性非酮性昏迷。

配伍选择题

A. $20^\circ\sim 30^\circ$

B. $25^\circ\sim 35^\circ$

C. $15^\circ\sim 20^\circ$

D. $10^\circ\sim 20^\circ$

E. $15^\circ\sim 25^\circ$

98.休克时头和躯干应抬高多少度以增加回心血量

参考答案：A

参考解析：休克的一般紧急治疗，采取头和躯干抬高 $20^\circ\sim 30^\circ$ 体位，以增加回心血量。选项A正确当选。

99.休克时下肢应抬高多少度增加回心血量

参考答案：C

参考解析：休克的一般紧急治疗，采取下肢抬高 $15^\circ\sim 20^\circ$ 体位，以增加回心血量。选项C正确当选。

配伍选择题

A.4~5天

B.7天

C.7~9天

D.10~12天

E.14天

100.关节或有减张缝合的在术后拆线时间是

参考答案：E

参考解析：一般头、面、颈部4~5天拆线，下腹部、会阴部6~7日拆线，胸部、背部、上腹部、臀部7~9日拆线，四肢10~12日拆线，减张缝线14日。选项E正确当选。

101.下腹部、会阴部手术在术后拆线时间是

参考答案：B

参考解析：一般头、面、颈部4~5天拆线，下腹部、会阴部6~7日拆线，胸部、背部、上腹部、臀部7~9日拆线，四肢10~12日拆线，减张缝线14日。选项B正确当选。

配伍选择题

A.高碳酸血症

B.戳孔疝

C.腹腔内缺血

D.肝外胆管损伤

E.肠系膜血管损伤

102.属于内脏损伤的是

参考答案：D

参考解析：内脏损伤①空腔脏器损伤：包括肝外胆管、小肠、结肠、胃、输尿管和膀胱等。②实质性脏器损伤：包括肝、脾、膈肌、肾、子宫等。选项D正确当选。

103.属于腹壁并发症是

参考答案：B

参考解析：腹壁并发症 戳孔出血与腹壁血肿、戳孔感染、腹壁坏死性筋膜炎和戳孔疝等。选项B正确当选。

配伍选择题

A.仙方活命饮

B.竹叶黄芪汤

C.十全大补汤

D.托里消毒散

E.防风通圣散

104.治疗痈之阴虚火盛证首选

参考答案：B

参考解析：阴虚火盛证，证候：局部疮形平塌、根盘散漫，疮色紫滞，不易化脓腐脱，溃出脓水稀少或带血水，疼痛剧烈；伴有高热，唇燥咽干，纳呆，大便秘结，小便短赤；舌红，苔黄，脉细数。治法：滋阴生津，清热托毒。方药：竹叶黄芪汤加减。

105.治疗痈之气血两虚证首选

参考答案：C

参考解析：气血两虚证，证候：局部疮形平塌散漫，疮色晦暗，化脓迟缓，腐肉难脱，脓水清稀，闷肿胀痛，疮口易成空壳；兼有发热，精神不振，面色苍白；舌淡，苔白腻，脉数无力。治法：调补气血。方药：十全大补汤加减。

配伍选择题

A.肝破裂

B.脾破裂

- C.胰腺挫伤断裂
- D.十二指肠破裂
- E.结肠破裂

106.症状体征发展较慢，主要表现为细菌性腹膜炎的是

参考答案：E

参考解析：结肠与直肠损伤主要表现为细菌性腹膜炎。选项E正确当选。

107.主要表现为腹腔内出血和腹膜刺激征，且有右肩放射痛的是

参考答案：A

参考解析：肝破裂主要表现为腹腔内出血和腹膜刺激征，常引起出血性休克，右肩部放射性疼痛。选项A正确当选。

配伍选择题

- A.益胃汤合参苓白术散
- B.四逆加人参汤
- C.黄连解毒汤合犀角地黄汤
- D.四妙勇安汤
- E.人参养荣汤

108.治疗冷伤之气血两虚证首选的方剂为

参考答案：E

参考解析：冷伤气血两虚证，治法：益气养血，祛瘀通脉。方药：人参养荣汤加减。选项E正确当选。

109.治疗冷伤之寒盛阳衰证首选的方剂为

参考答案：B

参考解析：冷伤寒盛阳衰证，治法：回阳救逆，温通血脉。方药：四逆加人参汤加减。选项B正确当选。

配伍选择题

- A.子宫增大
- B.宫颈变软
- C.子宫肌细胞肥大
- D.足月时子宫动脉变直
- E.临产后子宫峡部可伸至6~10cm

110.妊娠期生殖系统的变化哪项不正确

参考答案：E

参考解析：临产后子宫峡部可伸至7~10cm。选项E正确当选。

111.子宫增大的原因为

参考答案：C

参考解析：子宫肌细胞肥大从而导致子宫增大，其他的是子宫增大的程度不是原因。选项C正确当选。

配伍选择题

- A.枕额径
- B.枕顶径
- C.枕下前凶径



D.双顶径

E.双额径

112.正常分娩时胎头以哪一个径线通过产道

参考答案：C

参考解析：枕下前凶径：又称小斜径，前凶门中央至枕骨隆突下方的距离，是胎头的最小径线，足月胎儿平均值约 9.5cm，胎头俯屈后以此径线通过产道。

113.胎头最大横径为

参考答案：D

参考解析：双顶径（BPD）：两顶骨隆突间的距离，为胎头最大横径，足月胎儿的平均值约 9.3cm。

配伍选择题

A.产后 3~4 天

B.产后 7 天

C.产后 10 天

D.产后 21 天

E.产后 42 天

114.产后子宫复旧缩小至降入骨盆腔内的时间是

参考答案：C

参考解析：产后第 1 日宫底稍上升至脐平，以后每日下降 1~2cm，在产后 10 日子宫下降入骨盆腔内。选项 C 正确当选。

115.产后脉搏恢复正常的时间是

参考答案：B

参考解析：产后脉搏略缓慢，每分钟 60~70 次，产后 1 周恢复正常。选项 B 正确当选。

配伍选择题

A.理中丸

B.四君子汤

C.苏叶黄连汤

D.加味温胆汤

E.干姜人参半夏汤

116.脾胃素弱，胃失和降，冲气上逆致妊娠恶阻，因热而上逆者，选用的代表方为

参考答案：D

参考解析：因热而上逆者，宜清热降逆。代表方剂如加味温胆汤。选项 D 正确当选。

117.脾胃素弱，胃失和降，冲气上逆致妊娠恶阻，因寒而上逆者，选用的代表方为

参考答案：E

参考解析：因寒而上逆者，宜温中降逆。代表方剂如小半夏加茯苓汤、干姜人参半夏汤。选项 E 正确当选。

配伍选择题

A.补中益气汤

B.胎元饮

C.寿胎丸

D.泰山磐石散

E.通乳丹

118.治疗胎漏、胎动不安气血虚弱证，应首选的方剂是

参考答案：B

参考解析：胎漏、胎动不安气血虚弱证的治法为补气养血，固肾安胎，代表方为胎元饮。选项B正确当选。

119.治疗产后缺乳气血虚弱证，应首选的方剂是

参考答案：E

参考解析：产后缺乳气血虚弱证的治法为补气养血，佐以通乳，代表方为通乳丹去木通，加通草。选项E正确当选。

配伍选择题

A.天仙藤散

B.杞菊地黄丸

C.羚角钩藤汤

D.半夏白术天麻汤

E.白术散合五苓散

120.治疗子痫脾肾两虚证首选

参考答案：E

参考解析：子痫脾肾两虚证，证候：妊娠中晚期，面目及下肢浮肿，甚或遍及全身，肤色淡黄或白，皮薄而光亮，按之凹陷，即时难起，倦怠无力，气短懒言，食欲不振，下肢逆冷，腰酸膝软，小便短少，或大便溏薄；舌淡胖边有齿痕，苔白滑或薄腻，脉沉滑无力。治法：健脾温肾，行水消肿。方药：白术散合五苓散。

121.治疗子痫气滞湿阻证首选

参考答案：A

参考解析：子痫气滞湿阻证，证候：妊娠中晚期，先由脚肿，渐及于腿，皮色不变，随按随起，头晕胀痛，胸闷肋胀，或腕胀，纳少；苔薄腻，脉弦滑。治法：理气行滞，除湿消肿。方药：天仙藤散。

配伍选择题

A.耻骨弓角度 $<90^{\circ}$

B.坐骨结节间径 $<8\text{cm}$

C.米氏菱形窝不对称，各边不等长

D.骶耻外径 $<18\text{cm}$

E.骨盆外测量各径线均较正常值小 2cm

122.以上为骨盆外测量，可提示扁平骨盆的是

参考答案：D

参考解析：骶耻外径 $<18\text{cm}$ ，常为扁平骨盆。选项D正确当选。

123.以上为骨盆外测量，可提示均小骨盆的是

参考答案：E

参考解析：骨盆外测量各径线均较正常值小 2cm 或更多者，提示均小骨盆。选项E正确当选。

配伍选择题

A.病痉、病郁冒、大便难

- B.冲心、冲胃、冲肺
- C.咳嗽、心悸、呃逆
- D.感冒、腹痛、血虚
- E.呕吐、盗汗、泄泻

124.妇科产后“三急”，指的是

参考答案：E

参考解析：产后三急指产后呕吐、盗汗、泄泻。选项E正确当选。

125.妇科产后“三病”，指的是

参考答案：A

参考解析：产后三病指产后病瘕、病郁冒、大便难。选项A正确当选。

配伍选择题

- A.人参养荣汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.归肾丸合二至丸
- D.黑逍遥散
- E.右归丸

126.治疗外阴慢性单纯性苔癣肝郁气滞证首选方剂为

参考答案：D

参考解析：外阴慢性单纯性苔癣之肝郁气滞证，治法：疏肝解郁，养血通络。方药：黑逍遥散去生姜，加川芎。选项D正确当选。

127.治疗外阴硬化性苔癣血虚化燥证首选方剂为

参考答案：A

参考解析：外阴硬化性苔癣之血虚化燥证。证候：外阴干燥瘙痒，变薄，变白，脱屑，皲裂，阴唇、阴蒂萎缩或粘连，头晕眼花，心悸怔忡，气短乏力，面色萎黄；舌淡，苔薄，脉细。治法：益气养血，润燥止痒。方药：人参养荣汤。选项A正确当选。

配伍选择题

- A.月经第5天
- B.月经第7天
- C.经前期或月经来潮6小时内
- D.经期结束第1天
- E.经期结束第7天

128.为确定排卵和黄体功能，诊断性刮宫的时间是

参考答案：C

参考解析：诊断性刮宫的作用是止血和明确子宫内膜病理诊断。为确定排卵和黄体功能，应在经前期或月经来潮6小时内诊刮。选项C正确当选。

129.若怀疑子宫内膜不规则脱落，诊断性刮宫的时间是

参考答案：A

参考解析：若怀疑子宫内膜不规则脱落，应在月经第5天诊刮。不规则阴道流血或大出血者可随时诊刮。选项A正确当选。

配伍选择题

- A.膈下逐瘀汤

- B.少腹逐瘀汤
- C.清热调血汤
- D.黄芪建中汤
- E.调肝汤

130.痛经寒凝血瘀证选用的方剂是

参考答案：B

参考解析：痛经之寒凝血瘀证。证候：经前或经期小腹冷痛，拒按，得热痛减，经量少，色黯有块，畏寒肢冷，恶心呕吐；舌黯，苔白腻，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤加苍术、茯苓、乌药。

131.痛经湿热瘀阻证选用的方剂是

参考答案：C

参考解析：痛经之湿热瘀阻证。证候：经前或经期小腹疼痛或胀痛，灼热感，或痛连腰骶，或平时小腹疼痛，经前加剧；经血量多或经期延长，色黯红，质稠或夹较多黏液，带下量多，色黄质黏有臭味，或低热起伏，小便黄赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热除湿，化瘀止痛。方药：清热调血汤加蒲公英、薏苡仁。

配伍选择题

- A.5%~15%
- B.10%~20%
- C.10%~15%
- D.20%~30%
- E.25%~30%

132.蛋白质所供热量占总热量

参考答案：C

参考解析：营养素包括蛋白质、脂肪、糖类、维生素、矿物质、水等。其中，蛋白质所供热量占总热量的10%~15%。构成人体蛋白质的氨基酸有二十余种，其中8种必须由食物供给。脂肪是供给热量的重要来源，占总热量的25%~30%，婴幼儿需要脂肪量每日4~6g/kg，6岁以上需要每日3g/kg。

133.脂肪所供热量占总热量

参考答案：E

参考解析：营养素包括蛋白质、脂肪、糖类、维生素、矿物质、水等。其中，蛋白质所供热量占总热量的10%~15%。构成人体蛋白质的氨基酸有二十余种，其中8种必须由食物供给。脂肪是供给热量的重要来源，占总热量的25%~30%，婴幼儿需要脂肪量每日4~6g/kg，6岁以上需要每日3g/kg。

配伍选择题

- A.支气管肺炎
- B.腺病毒肺炎
- C.合胞病毒肺炎
- D.支原体肺炎
- E.衣原体肺炎

134.小儿肺炎多见于6个月~2岁的婴幼儿的是

参考答案：B

参考解析：腺病毒肺炎多见于6个月~2岁的婴幼儿。发热、咳嗽、呼吸困难为主要症状。

选项 B 正确当选。

135. 小儿肺炎多见于 2 岁以内，尤以 2~6 个月婴儿多见的是

参考答案：C

参考解析：合胞病毒肺炎多见于 2 岁以内，尤以 2~6 个月婴儿多见。发热、咳嗽、喘憋为主要症状。选项 C 正确当选。

配伍选择题

A. 银翘散

B. 附子汤

C. 葛根芩连汤

D. 生脉散合复脉汤

E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

136. 病毒性心肌炎气阴亏虚证的用方是

参考答案：D

参考解析：病毒性心肌炎气阴亏虚证的治法为益气养阴，宁心复脉，代表方为炙甘草汤合生脉散加减。选项 D 正确当选。

137. 病毒性心肌炎湿热侵心证的用方是

参考答案：C

参考解析：病毒性心肌炎湿热侵心证的治法为清热化湿，宁心复脉，代表方为葛根黄芩黄连汤加减。选项 C 正确当选。

138. 病毒性心肌炎心阳虚弱证治疗首选方剂是

参考答案：E

参考解析：病毒性心肌炎湿热侵心证的治法为温振心阳，宁心复脉。代表方为桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减。选项 E 正确当选。

配伍选择题

A. 清热泻脾散

B. 参苓白术散

C. 泻心导赤散

D. 黄连解毒汤

E. 知柏地黄丸

139. 治疗鹅口疮心脾积热证，应首选

参考答案：A

参考解析：鹅口疮心脾积热证的治法为清心泻脾，代表方为清热泻脾散加减。选项 A 正确当选。

140. 治疗鹅口疮虚火上浮证，应首选

参考答案：E

参考解析：鹅口疮虚火上浮证的治法为滋阴降火，代表方为知柏地黄丸加减。选项 E 正确当选。

配伍选择题

A. 速尿

B. 白蛋白

C. 青霉素



D.肾上腺皮质激素

E.细胞毒药物

141.治疗肾病综合征首选药物是

参考答案：D

参考解析：肾上腺皮质激素目前为肾病综合征治疗首选药。选项D正确当选。

142.治疗急性肾炎清除链球菌感染灶首选药物是

参考答案：C

参考解析：对于急性肾小球肾炎有链球菌感染灶者应用青霉素10~14天，以彻底清除体内病灶中残余细菌，减轻抗原抗体反应。选项C正确当选。

配伍选择题

A.涤痰通络

B.泻火涤痰

C.涤痰开窍

D.化瘀通窍

E.健脾化痰

143.病毒性脑炎痰热壅盛证的治法宜选用

参考答案：B

参考解析：病毒性脑炎之痰热壅盛证，治法：泻火涤痰。方药：清瘟败毒饮加减。选项B正确当选。

144.病毒性脑炎痰蒙清窍证的治法宜选用

参考答案：C

参考解析：病毒性脑炎之痰蒙清窍证，治法：涤痰开窍。方药：涤痰汤加减。选项C正确当选。

145.病毒性脑炎痰瘀阻络证的治法是

参考答案：A

参考解析：病毒性脑炎之痰蒙清窍证，治法：涤痰通络，活血化瘀。方药：指迷茯苓丸合桃红四物汤加减。选项A正确当选。

配伍选择题

A.温补脾肾，益精养血

B.健运脾胃，益气养血

C.补脾养心，益气生血

D.滋养肝肾，益精生血

E.滋水涵木，益气生血

146.营养性缺铁性贫血肝肾阴虚证的治法宜选用

参考答案：D

参考解析：营养性缺铁性贫血之肝肾阴虚证。证候：头晕目涩，面色苍白，肌肤不泽，毛发枯黄，爪甲易脆，四肢震颤抽动，两颧潮红，潮热盗汗，发育迟缓，舌红，苔少或光剥，脉弦数或细数。治法：滋养肝肾，益精生血。方药：左归丸加减。

147.营养性缺铁性贫血脾胃虚弱证的治法宜选用

参考答案：B

参考解析：营养性缺铁性贫血之脾胃虚弱证。证候：面色萎黄无华，唇淡不泽，指甲苍白，长期食欲不振，神疲乏力，形体消瘦，大便不调，舌淡苔白，脉细无力，指纹淡红。治法：

健运脾胃，益气养血。方药：六君子汤加减。

配伍选择题

A.清瘟败毒饮合小承气汤

B.生脉散

C.参附汤

D.参附龙牡救逆汤

E.独参汤

148.脓毒性休克热毒内闭证的首选方剂是

参考答案：A

参考解析：脓毒性休克热毒内闭证。证候：高热，烦躁，或精神萎靡，甚则神志昏迷，强直抽搐，喉中痰鸣，胸腹灼热，面色苍白，手足厥冷，口渴喜饮，小便短赤，大便秘结，舌红，苔黄燥，脉细数。治法：清热解毒，通腑开窍。方药：清瘟败毒饮合小承气汤加减，并配用安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹，开窍醒神。

149.脓毒性休克气阴亏竭证的首选方剂是

参考答案：B

参考解析：脓毒性休克气阴亏竭证。证候：神志不清，面色苍白，呼吸促而弱，皮肤干燥，尿少口干，四肢厥冷，唇舌干绛，苔少而干，脉细数而无力。治法：益气养阴，救逆固脱。方药：生脉散加减。若兼见大片瘀斑扩大融合，是气脱血瘀之证，加丹参、赤芍、川芎，并重用人参，益气固脱化瘀。

150.脓毒性休克阴竭阳脱证的首选方剂是

参考答案：B

参考解析：脓毒性休克阴竭阳脱证，证候：神志不清，面色青灰，皮肤紫花或大片瘀斑，皮肤湿冷，四肢冰凉过肘膝，汗出如油，呼吸不整，体温不升，唇紫发青，苔白滑，脉微欲绝，或指纹淡隐。治法：益气回阳，救逆固脱。方药：参附汤或参附龙牡救逆汤加减。

