

2022 执业药师（补考）考试真题

《中药综合》

金英杰医考官方公众号

《中药综合》2022 年补考真题

大题：单选题

1. 不属于蒙药药味的是（ ）。

- A. 酸
- B. 苦
- C. 甘
- D. 辛
- E. 淡

答案：E

解析：本题主要考查的是蒙药基础知识。蒙药有六种药味，即甘、酸、咸、苦、辛、涩。所以淡味不属于蒙药药味。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

2. 表明药物产地的是（ ）。

- A. 江枳壳
- B. 绵茵陈
- C. 鹅枳实
- D. 明天麻
- E. 左秦艽

答案：A

解析：本题主要考查的是与药名有关的术语。江枳壳属于江西的道地药材，属于产地类术语；绵茵陈属于采时新陈类术语；鹅枳实、明天麻、左秦艽属于品质类术语。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

3.十二正经中属心的经脉是（ ）。

- A.足厥阴
- B.足太阴
- C.足少阴
- D.手太阴
- E.手少阴

答案： E

解析：本题主要考查的是十二经脉。足厥阴肝经，足太阴脾经，足少阴肾经，手太阴肺经，手少阴心经。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

4.用醋炮制且需包煎的是（ ）。

- A.香附
- B.没药
- C.五灵脂
- D.牛膝
- E.川芎

答案： C

解析：本题主要考查的是饮片的特殊调剂、内服特殊煎法和特殊用法、外用方法。五灵脂煎煮后容易使药液浑浊，因此需要包煎。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

5.寒湿下注的带下证的面色是（ ）。

- A.目眶黑色
- B.面色萎黄
- C.面黑而干
- D.面黄而晦如烟熏

E.两眉间青紫

答案：A

解析：本题主要考查的是望面色。目眶周围见黑色，多见于肾虚水泛；面黑而干焦，多为肾精久耗。面色萎黄，多属脾胃气虚、营血不能上荣；黄而晦暗如烟熏者，即阴黄，多属寒湿。小儿高热，面部青紫，以鼻柱两眉间及口唇四周多见，是惊风先兆，惊风证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

6.大肠湿热证多见（ ）。

- A.大便泻下而黄糜
- B.大便泻下酸腐
- C.大便完谷不化
- D.大便时干时稀
- E.大便先干后溏

答案：A

解析：本题主要考查的是望诊。大便泻下酸腐，多属食滞肠胃；大便完谷不化，多属肾阳虚衰；大便时干时稀，大便先干后溏，多属脾胃气虚。大肠湿热证多见大便泻下而黄糜。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

7.气滞血瘀痰凝导致的癥积痞块，其治法是（ ）。

- A.攻补兼施
- B.消痞散积
- C.软坚散结
- D.调和肝脾
- E.消食导滞

答案：B

解析：本题主要考查的是治法。消痞散积法：适用于气滞血瘀痰凝等所致的癥积痞块证。攻补兼施法：适用于里实积滞、邪实正虚之便秘证。软坚散结法：适用于痰浊瘀血等结

聚有形的瘰疬、癭瘤、癥瘕、久疔等。调和肝脾法适用于肝气郁结，横犯脾胃，或脾虚不运，肝失疏泄，肝脾不和之证。症见胸闷胁痛，脘腹胀痛，不思饮食，大便溏泻，或妇女乳房胀痛，月经不调及痛经等。消食导滞法适用于食积停滞证。症见脘腹搭满，恶心呕吐，嗳腐吞酸，厌食纳呆，大便泄泻。舌苔厚腻，脉滑。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

8.某女，48岁。心烦不寐，入睡困难，多梦，伴头晕，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干，舌红少津，脉细数，诊断为不寐，证属心肾不交。可选中成药是（ ）。

- A.
- B.
- C.
- D.乌灵胶囊
- E.

答案：D

解析：本题考查不寐。不寐的心肾不交证选用的中成药有乌灵胶囊、滋肾宁神丸。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

9.导致亡阴的原因不包括（ ）。

- A.泻泄过度
- B.邪热久留
- C.疲劳过度
- D.大量出血
- E.呕吐过度

答案：C

解析：本题主要考查的是阴阳亡失。亡阴,是指机体由于阴液发生突然性的大量消耗或丢失,而致阴精亏竭,滋养濡润功能丧失,全身功能严重衰竭的病机变化。多由于外感温热,热邪

炽盛;或邪热久留,大量煎灼阴液,或大出血,或吐泻过度,而耗伤阴液,或其他疾病快速消耗阴液所致。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

10.某男,45岁。房事举而不坚,伴心情抑郁,胸胁胀满,善太息,舌苔薄白,脉弦,诊断为阳痿。辨析其证候是()。

- A.心脾两虚
- B.惊恐伤肾
- C.湿热下注
- D.肾阳不足
- E.肝郁不舒

答案: E

解析: 本题主要考查的是阳痿。心情抑郁,胸胁胀满,善太息,脉弦。应辨证为肝郁不舒。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

11.中药药学服务对执业药师的要求不包括()。

- A.专业知识
- B.从业年限
- C.职业道德
- D.沟通技巧
- E.专业技能

答案: B

解析: 本题主要考查的是中药药学服务对执业药师的要求。中药药学服务对执业药师的要求包括: 专业知识、职业道德、沟通技巧、专业技能。

考点来源:

难易程度:

试题分类：

12.不含对乙酰氨基酚组分的中成药是（ ）。

- A.感冒清片
- B.强力感冒片
- C.重感灵片
- D.维C银翘片
- E.复方感冒灵片

答案：C

解析：本题主要考查的是含西药组分的中成药。重感灵片含马来酸氯苯那敏，不含对乙酰氨基酚。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

13.应避光、密封贮存的是（ ）。

- A.软膏
- B.膏药
- C.煎膏
- D.颗粒
- E.胶囊

答案：A

解析：本题主要考查的是中成药剂型与贮藏要求。软膏剂（油膏）：熔点较低，受热后极易熔化，质地变稀薄，会出现外溢现象。软膏种类多，组成复杂，性质各异，其稳定性主要决定于所用基质（脂肪油和植物油）和所含药物的理化属性。除另有规定外，软膏剂应避光，密封贮存。除另有规定外，膏药应密闭，置阴凉处贮存。除另有规定外，煎膏剂应密封，置阴凉处贮存。除另有规定外，颗粒剂应密封，在干燥处贮存，防止受潮。除另有规定外，胶囊剂应密封贮存。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

11.人体分为阴阳平衡质，偏阴质，偏阳质，其中偏阳质的特性有（ ）。

- A.畏寒喜热
- B.反应灵敏
- C.喜静少动
- D.胆小易惊
- E.体温偏低

答案： E

解析： 本题考查体质的分类。阴阳平和质： 强健壮实、 功能比较协调； 偏阳质： 代谢相对亢奋、 身体偏热、 多动、 易兴奋； 偏阴质： 代谢相对减退、 身体偏寒、 喜静少动。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

12.应该放在最底层大药斗内的是（ ）。

- A.
- B.
- C.
- D.荷叶和荷梗
- E.

答案： D

解析： 本题考查饮片的斗谱编排。中上层： 常用药物； 最高层： 质地较轻且用量较少的药物； 较下层： 质地沉重的矿石、 化石、 贝壳类和易污染的炭药； 最底层： 质地松泡且用量较大的药物。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

13.肝火上炎证的临床表现（ ）。

- A.

B.头痛眩晕，耳聋耳鸣，面红目赤，口苦，尿黄，甚则咯血、吐血、衄血，舌红苔黄，脉弦数

C.

D.

E.

答案：B

解析：本题考查肝病辨证。肝火上炎的表现：头痛眩晕，耳聋耳鸣，面红目赤，口苦，尿黄，甚则咯血、吐血、衄血，舌红苔黄，脉弦数。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

14.血常规检查中白细胞增多代表（ ）。

A.细菌感染

B.病毒性肝炎

C.再生障碍性贫血

D.结核杆菌阳性

E.白血病

答案：A

解析：本题考查血常规检查。病理性白细胞增多主要见于细菌感染、严重组织损伤或坏死、白血病、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病酮症酸中毒、有机磷农药中毒等。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

15.与宗气生成密切相关的脏腑（ ）。

A.肺、脾、肾

B.心、肺、脾

C.肺、脾、胃

D.肺、肠

E.肝、胆、肾

答案：C

解析：本题考查宗气的分类与分布。宗气：积于胸中之气，由肺吸入的清气和脾胃运化产生的水谷精气相互结合而成。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

15.临床上菊花配伍枸杞子属于（ ）。

A.

B.

C.相使配伍

D.

E.

答案：C

解析：本题考查中药配伍原则七情配伍。相须——金银花配连翘；相使——枸杞子配菊花；相恶——生姜恶黄芩；相畏——半夏畏生姜；相杀——生姜杀半夏。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

16.某男，68岁，黎明时腹泻已连续半月有余，畏寒肢冷，小便清长，舌淡苔白，脉沉细。根据五行的规律应采取的治法是（ ）。

A.

B.益火补土法

C.

D.

E.

答案：B

解析：本题考查五行学说的临床应用。益火补土法：通过温肾阳补脾阳确定的治法，又称温肾健脾法，治疗脾肾阳虚证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

大题：配伍选择题

1.根据下面选项，回答以下问题

A.火邪

B.燥邪

C.湿邪

D.热邪

E.暑邪

子题：单选题

41.口鼻干燥、咽干口渴、皮肤干涩，毛发不荣、小便短少、大便干结，常见的病因是（ ）。

A.火邪

B.燥邪

C.湿邪

D.热邪

E.暑邪

答案：B

解析：本题主要考查的是六淫。燥邪最易耗伤人体的津液，造成阴津亏虚的病变，常见口鼻干燥、咽干口渴、皮肤干涩，甚则皲裂、毛发不荣、小便短少、大便干结等。湿邪，可见头重如裹、周身困重、面垢多、大便溏泻、下利黏液脓血、小便浑浊等。火为阳邪，火性炎上，火易伤津耗气，火热易生风动血，火热易发肿疡；暑为阳邪，其性炎热，暑性升散，易扰心神，耗气伤津，暑多挟湿。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

子题: 单选题

42.头重如裹、周身困重、面垢眊多、大便溏泄、小便浑浊,常见的病因是()。

- A.火邪
- B.燥邪
- C.湿邪
- D.热邪
- E.暑邪

答案: C

解析: 本题主要考查的是六淫。燥邪最易耗伤人体的津液,造成阴津亏虚的病变,常见口鼻干燥、咽干口渴、皮肤干涩,甚则皴裂、毛发不荣、小便短少、大便干结等。湿邪,可见头重如裹、周身困重、面垢多、大便溏泻、下利黏液脓血、小便浑浊等。火为阳邪,火性炎上,火易伤津耗气,火热易生风动血,火热易发肿疡;暑为阳邪,其性炎热,暑性升散,易扰心神,耗气伤津,暑多挟湿。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

2.根据下面选项,回答以下问题

- A.妊娠末期气道受阻的失音者
- B.喃喃自语,见人便止的独语者
- C.语言重复,时断时续的郑声者
- D.言语粗鲁,骂詈不休的狂言者
- E.口干少津,咽喉不利的失音者

子题: 单选题

43.依据语声变化应诊断为实证的是()。

- A.妊娠末期气道受阻的失音者
- B.喃喃自语,见人便止的独语者
- C.语言重复,时断时续的郑声者

- D.言语粗鲁，骂詈不休的狂言者
- E.口干少津，咽喉不利的失音者

答案：A

解析：本题主要考查的是闻诊。妊娠末期气道受阻的失音者依据语声变化应诊断为实证；依据语言变化应诊断为实证的是言语粗鲁，骂詈不休的狂言者。喃喃自语、讲话无对象、见人便停止的是独语，常见于癡证，多是心气虚、精不养神的表现。神志不清、语言重复、时断时续、声音低弱的，是郑声，属于心气大伤、精神散乱的虚证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

44.依据语言变化应诊断为实证的是（ ）。

- A.妊娠末期气道受阻的失音者
- B.喃喃自语，见人便止的独语者
- C.语言重复，时断时续的郑声者
- D.言语粗鲁，骂詈不休的狂言者
- E.口干少津，咽喉不利的失音者

答案：D

解析：本题主要考查的是闻诊。妊娠末期气道受阻的失音者依据语声变化应诊断为实证；依据语言变化应诊断为实证的是言语粗鲁，骂詈不休的狂言者。，骂詈不休的狂言者。喃喃自语、讲话无对象、见人便停止的是独语，常见于癡证，多是心气虚、精不养神的表现。神志不清、语言重复、时断时续、声音低弱的，是郑声，属于心气大伤、精神散乱的虚证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

3.根据下面选项，回答以下问题

- A.肝脾不和
- B.脾胃虚弱
- C.胃强脾弱

D.脾湿不运

E.脾胃湿热

子题：单选题

45.食少，伴见面色萎黄、倦怠乏力、体重下降，常见于（ ）。

A.肝脾不和

B.脾胃虚弱

C.胃强脾弱

D.脾湿不运

E.脾胃湿热

答案：B

解析：本题主要考查的是问诊。食少，伴见面色萎黄、倦怠乏力、体重下降，常见于脾胃虚弱；食少，伴有胸闷、腹胀、倦怠肢重，常见于脾湿不运；厌食油腻厚味，常见于脾胃湿热。胸胁胀痛，善太息，食纳减少，大便溏薄--肝脾不调；易饥多食，但大便溏泻，倦怠乏力--胃强脾弱。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

46.食少，伴有胸闷、腹胀、倦怠肢重，常见于（ ）。

A.肝脾不和

B.脾胃虚弱

C.胃强脾弱

D.脾湿不运

E.脾胃湿热

答案：D

解析：本题主要考查的是问诊。食少，伴见面色萎黄、倦怠乏力、体重下降，常见于脾胃虚弱；食少，伴有胸闷、腹胀、倦怠肢重，常见于脾湿不运；厌食油腻厚味，常见于脾胃湿热。胸胁胀痛，善太息，食纳减少，大便溏薄--肝脾不调；易饥多食，但大便溏泻，倦怠乏力--胃强脾弱。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

子题: 单选题

47. 厌食油腻厚味, 常见于 ()。

- A. 肝脾不调
- B. 脾胃虚弱
- C. 胃强脾弱
- D. 脾湿不运
- E. 脾胃湿热

答案: E

解析: 本题主要考查的是问诊。食少, 伴见面色萎黄、倦怠乏力、体重下降, 常见于脾胃虚弱; 食少, 伴有胸闷、腹胀、倦怠肢重, 常见于脾湿不运; 厌食油腻厚味, 常见于脾胃湿热。胸胁胀痛, 善太息, 食纳减少, 大便溏薄--肝脾不调; 易饥多食, 但大便溏泻, 倦怠乏力--胃强脾弱。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

4. 根据下面选项, 回答以下问题

- A. 儿茶
- B. 水牛角
- C. 马勃
- D. 鹿角霜
- E. 麝香

子题: 单选题

48. 《中国药典》规定, 用时捣碎、先煎煮的饮片是 ()。

- A. 儿茶
- B. 水牛角
- C. 马勃

D.鹿角霜

E.麝香

答案：D

解析：本题主要考查的是饮片的特殊调剂、内服特殊煎法和特殊用法、外用方法。《中国药典》规定，用时捣碎、先煎煮的饮片是鹿角霜。《中国药典》规定，用时打碎、包煎的饮片是儿茶。《中国药典》规定，可镑片、先煎的饮片是水牛角。马勃用时剪成小块；麝香内用时研碎，入丸散，不入煎剂。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

49.《中国药典》规定，用时打碎、包煎的饮片是（ ）。

A.儿茶

B.水牛角

C.马勃

D.鹿角霜

E.麝香

答案：A

解析：本题主要考查的是饮片的特殊调剂、内服特殊煎法和特殊用法、外用方法。《中国药典》规定，用时打碎、包煎的饮片是儿茶。《中国药典》规定，用时打碎、包煎的饮片是儿茶。《中国药典》规定，可镑片、先煎的饮片是水牛角。马勃用时剪成小块；麝香内用时研碎，入丸散，不入煎剂。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

50.《中国药典》规定，可镑片、先煎的饮片是（ ）。

A.儿茶

B.水牛角

- C.马勃
- D.鹿角霜
- E.麝香

答案：B

解析：本题主要考查的是饮片的特殊调剂、内服特殊煎法和特殊用法、外用方法。《中国药典》规定，可镑片、先煎的饮片是水牛角。《中国药典》规定，用时打碎、包煎的饮片是儿茶。《中国药典》规定，可镑片、先煎的饮片是水牛角。马勃用时剪成小块；麝香内用时研碎，入丸散，不入煎剂。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

5.根据下面选项，回答以下问题

- A.地枫皮
- B.土荆皮
- C.苦楝皮
- D.香加皮
- E.木鳖子

子题：单选题

51.外用适量，研末，用猪脂调敷患处的饮片是（ ）。

- A.地枫皮
- B.土荆皮
- C.苦楝皮
- D.香加皮
- E.木鳖子

答案：C

解析：本题主要考查的是有毒、小毒中药的用法用量及调配。用猪脂调敷患处的饮片是苦楝皮；用油或醋调涂患处的饮片是木鳖子；用醋或酒浸后涂擦患处的饮片是土荆皮。地枫皮，内服煎汤，小毒，6-9g；香加皮，内服煎汤，有毒，3-6g，不宜过量。

考点来源：

难易程度：

试题分类:

子题: 单选题

52.外用适量,研末,用油或醋调涂患处的饮片是()。

- A.地枫皮
- B.土荆皮
- C.苦楝皮
- D.香加皮
- E.木鳖子

答案: E

解析: 本题主要考查的是有毒、小毒中药的用法用量及调配。用猪脂调敷患处的饮片是苦楝皮;用油或醋调涂患处的饮片是木鳖子;用醋或酒浸后涂擦患处的饮片是土荆皮。地枫皮,内服煎汤,小毒,6-9g;香加皮,内服煎汤,有毒,3-6g,不宜过量。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

子题: 单选题

53.外用适量,用醋或酒浸后涂擦患处的饮片是()。

- A.地枫皮
- B.土荆皮
- C.苦楝皮
- D.香加皮
- E.木鳖子

答案: B

解析: 本题主要考查的是有毒、小毒中药的用法用量及调配。用猪脂调敷患处的饮片是苦楝皮;用油或醋调涂患处的饮片是木鳖子;用醋或酒浸后涂擦患处的饮片是土荆皮。地枫皮,内服煎汤,小毒,6-9g;香加皮,内服煎汤,有毒,3-6g,不宜过量。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

6.根据下面选项,回答以下问题

- A.麝香通心滴丸

- B.鼻炎康片
- C.利鼻片
- D.伸筋活络丸
- E.通痹胶囊

子题：单选题

54.含有蟾蜍毒素，肝功能不全者慎用的是（ ）。

- A.麝香通心滴丸
- B.鼻炎康片
- C.利鼻片
- D.伸筋活络丸
- E.通痹胶囊

答案：A

解析：本题主要考查的是引起肝损伤的中药及其主要化学物质。含有蟾蜍毒素，肝功能不全者慎用的是麝香通心滴丸。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

55.含有生物碱，肝功能不全者慎用的是（ ）。

- A.麝香通心滴丸
- B.鼻炎康片
- C.利鼻片
- D.伸筋活络丸
- E.通痹胶囊

答案：E

解析：本题主要考查的是引起肝损伤的中药及其主要化学物质。通痹胶囊含有马钱子碱、乌头碱，肝功能不全者慎用。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

56.含有生物碱，肝功能不全者禁用的是（ ）。

- A.麝香通心滴丸
- B.鼻炎康片
- C.利鼻片
- D.伸筋活络丸
- E.通痹胶囊

答案：D

解析：本题主要考查的是引起肝损伤的中药及其主要化学物质。含有生物碱，肝功能不全者禁用的是伸筋活络丸。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

9.根据下面选项，回答以下问题

- A.《新修本草》
- B.《重修政和经史证类备用本草》
- C.《本草纲目》
- D.《神农本草经》
- E.《本草经集注》

子题：单选题

59.我国历史上第一部药典性本草典籍是（ ）。

- A.《新修本草》
- B.《重修政和经史证类备用本草》
- C.《本草纲目》
- D.《神农本草经》
- E.《本草经集注》

答案：A

解析：本题主要考查的是常用的古文献典籍。我国历史上第一部药典性本草典籍是《新修本草》；首次将药物分类按自然属性区分的本草典籍是《本草经集注》。《重修政和经史证类备急本草》--现存最早的完整的古本草合刊本；《本草纲目》--古代最系统、最完整以及科学程度最高的药学著作；《神农本草经》--最早的本草学专著，载药 365 种。

药物三品分类原则：上品 120 种，无毒；中品 120 种，无毒有毒斟酌其宜；下品 125 种，多毒。 考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

60.首次将药物分类按自然属性区分的本草典籍是（ ）。

- A.《新修本草》
- B.《重修政和经史证类备用本草》
- C.《本草纲目》
- D.《神农本草经》
- E.《本草经集注》

答案：E

解析：本题主要考查的是常用的古文献典籍。我国历史上第一部药典性本草典籍是《新修本草》；首次将药物分类按自然属性区分的本草典籍是《本草经集注》。《重修政和经史证类备急本草》--现存最早的完整的古本草合刊本；《本草纲目》--古代最系统、最完整以及科学程度最高的药学著作；《神农本草经》--最早的本草学专著，载药 365 种。药物三品分类原则：上品 120 种，无毒；中品 120 种，无毒有毒斟酌其宜；下品 125 种，多毒。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

10.根据下面选项，回答以下问题

- A.阴中求阳
- B.阳病治阴
- C.扶阳益阴
- D.阳中求阴
- E.阴病治阳

子题：单选题

61.“益火之源，以消阴翳”的治则又称为（ ）。

- A.阴中求阳

- B.阳病治阴
- C.扶阳益阴
- D.阳中求阴
- E.阴病治阳

答案：E

解析：本题主要考查的是阴阳学说的临床应用。“益火之源，以消阴翳”的治则又称为阴病治阳，针对的是阳虚证。“壮水之主，以制阳光”的治则又称为阳病治阴，针对的是阴虚证。阴中求阳，阳中求阴都是利用了阴阳互根互用的原理采取的治法，因此不选；扶阳益阴治疗的是阴阳两虚证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

62.“壮水之主，以制阳光”的治则又称为（ ）。

- A.阴中求阳
- B.阳病治阴
- C.扶阳益阴
- D.阳中求阴
- E.阴病治阳

答案：B

解析：本题主要考查的是阴阳学说的临床应用。“益火之源，以消阴翳”的治则又称为阴病治阳，针对的是阳虚证。“壮水之主，以制阳光”的治则又称为阳病治阴，针对的是阴虚证。阴中求阳，阳中求阴都是利用了阴阳互根互用的原理采取的治法，因此不选；扶阳益阴治疗的是阴阳两虚证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

11.根据下面选项，回答以下问题

- A.滋水涵木法
- B.益火补土法

- C.泻南补北法
- D.培土制水法
- E.佐金平木法

子题：单选题

45.运用五行相生规律确定，治疗肝肾阴虚证的治法是（ ）。

- A.滋水涵木法
- B.益火补土法
- C.泻南补北法
- D.培土制水法
- E.佐金平木法

答案：A

解析：本题主要考查的是五行学说的临床应用。滋水涵木法：通过滋补肝肾之阴，以涵敛潜制肝阳的治法，又称滋肾养肝法、滋补肝肾法，治疗肝肾阴虚证，属于运用五行相生规律确定的治法。泻南补北法：泻心火、补肾水的治法，又称泻火补水法、滋阴降火法，治疗心肾不交证，属于运用五行相克规律确定的治法。益火补土法：通过温肾阳补脾阳确定的治法，又称温肾健脾法，治疗脾肾阳虚证，利用五行相生规律确定的治法；培土制水法，通过健脾达到利水的功效，又称敦土利水法，治疗脾虚导致的水肿，属于利用五行相克规律确定的治法；佐金平木法，即补肺平肝，又称滋肺清肝法，治疗肝火犯肺证，属于五行相克规律确定的治法。 考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

46.运用五行相克规律确定，治疗心肾不交证的治法是（ ）。

- A.滋水涵木法
- B.益火补土法
- C.泻南补北法
- D.培土制水法
- E.佐金平木法

答案：C

解析：本题主要考查的是五行学说的临床应用。滋水涵木法：通过滋补肝肾之阴，以涵敛潜制肝阳的治法，又称滋肾养肝法、滋补肝肾法，治疗肝肾阴虚证，属于运用五行相生规律确定的治法。泻南补北法：泻心火、补肾水的治法，又称泻火补水法、滋阴降火法，治疗心肾不交证，属于运用五行相克规律确定的治法。益火补土法：通过温肾阳补脾阳确定的治法，又称温肾健脾法，治疗脾肾阳虚证，利用五行相生规律确定的治法；培土制水法，通过健脾达到利水的功效，又称敦土利水法，治疗脾虚导致的水肿，属于利用五行相克规律确定的治法；佐金平木法，即补肺平肝，又称滋肺清肝法，治疗肝火犯肺证，属于五行相克规律确定的治法。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

12.根据下面选项，回答以下问题

- A.气陷证
- B.气滞证
- C.气逆证
- D.气虚证
- E.气闭证

子题：单选题

49.症见头目昏花、少气倦怠、腹部有坠胀感，所属的证候是（ ）。

- A.气陷证
- B.气滞证
- C.气逆证
- D.气虚证
- E.气闭证

答案：A

解析：本题主要考查的是气机失调。头目昏花、少气倦怠、腹部有坠胀感，所属的证候是气陷证；头痛、眩晕、暖气、呃逆，所属的证候是气逆证。气滞证常见胸胁胀痛，善太息，精神抑郁，脉弦等症状；气虚证常见气短神疲，乏力，语声低弱，脉虚弱等症状；气闭即气不能外达而郁闭于内。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

50.症见头痛、眩晕、暖气、呃逆，所属的证候是（ ）。

- A.气陷证
- B.气滞证
- C.气逆证
- D.气虚证
- E.气闭证

答案：C

解析：本题主要考查的是气机失调。头目昏花、少气倦怠、腹部有坠胀感，所属的证候是气陷证；头痛、眩晕、暖气、呃逆，所属的证候是气逆证。气滞证常见胸胁胀痛，善太息，精神抑郁，脉弦等症状；气虚证常见气短神疲，乏力，语声低弱，脉虚弱等症状；气闭即气不能外达而郁闭于内。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

13.根据下面选项，回答以下问题

- A.寒湿内盛
- B.湿热伤中
- C.肝气乘脾
- D.脾胃虚弱
- E.食滞肠胃

子题：单选题

51.某男，42岁。泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，舌苔白腻，脉濡缓。四诊合参，辨证其证候是（ ）。

- A.寒湿内盛
- B.湿热伤中
- C.肝气乘脾
- D.脾胃虚弱
- E.食滞肠胃

答案：A

解析：本题主要考查的是泄泻。泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，舌苔白腻，脉濡缓。四诊合参，辨折其证候是寒湿内盛；泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌红苔黄腻，脉滑数。四诊合参，辨析其证候是湿热伤中。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

52.某男，36岁。泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌红苔黄腻，脉滑数。四诊合参，辨析其证候是（ ）。

- A.寒湿内盛
- B.湿热伤中
- C.肝气乘脾
- D.脾胃虚弱
- E.食滞肠胃

答案：B

解析：本题主要考查的是泄泻。泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，舌苔白腻，脉濡缓。四诊合参，辨折其证候是寒湿内盛；泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌红苔黄腻，脉滑数。四诊合参，辨析其证候是湿热伤中。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

14.根据下面选项，回答以下问题

- A.真方白丸子
- B.薏苡仁汤
- C.防风汤
- D.补阳还五汤

E.半夏白术天麻汤

子题：单选题

61.某男，52岁。关节活动不利，肌肤麻木不仁，肌肉酸楚、重着、疼痛、肿胀散漫；舌淡苔白腻，脉濡缓。宜选用的基础方剂是（ ）。

A.真方白丸子

B.薏苡仁汤

C.防风汤

D.补阳还五汤

E.半夏白术天麻汤

答案：B

解析：本题主要考查的是痹证和中风。关节活动不利，肌肤麻木不仁，肌肉酸楚、重着、疼痛、肿胀散漫；舌淡苔白腻，脉濡缓。辨证为痹证之着痹，宜选用的基础方剂是薏苡仁汤；平素肌肤不仁，手足麻木，突发口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌强语赛；舌淡苔薄白，脉浮数。辨证为中风之风痰入络证，宜选用的基础方剂是真方白丸子；半身不遂，肢软无力，面色萎黄；舌淡紫苔薄白，脉细弱，辨证为中风之气虚血瘀证，宜选用的基础方剂是补阳还五汤。防风汤是治疗行痹的方剂；半夏白术天麻汤是治疗眩晕痰湿中阻证的方剂。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

62.某女，62岁。平素肌肤不仁，手足麻木，突发口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌强语赛；舌淡苔薄白，脉浮数。宜选用的基础方剂是（ ）。

A.真方白丸子

B.薏苡仁汤

C.防风汤

D.补阳还五汤

E.半夏白术天麻汤

答案：A

解析：本题主要考查的是痹证和中风。关节活动不利，肌肤麻木不仁，肌肉酸楚、重着、疼痛、肿胀散漫；舌淡苔白腻，脉濡缓。辨证为痹证之着痹，宜选用的基础方剂是薏苡仁汤；平素肌肤不仁，手足麻木，突发口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌强语赛；舌淡苔薄白，脉浮数。辨证为中风之风痰入络证，宜选用的基础方剂是真方白丸子；半身不遂，

肢软无力，面色萎黄；舌淡紫苔薄白，脉细弱，辨证为中风之气虚血瘀证，宜选用的基础方剂是补阳还五汤。防风汤是治疗行痹的方剂；半夏白术天麻汤是治疗眩晕痰湿中阻证的方剂。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

子题：单选题

63.某男，53岁。半身不遂，肢软无力，面色萎黄；舌淡紫苔薄白，脉细弱。宜选用的基础方剂是（ ）。

- A.真方白丸子
- B.薏苡仁汤
- C.防风汤
- D.补阳还五汤
- E.半夏白术天麻汤

答案：D

解析：本题主要考查的是痹证和中风。关节活动不利，肌肤麻木不仁，肌肉酸楚、重着、疼痛、肿胀散漫；舌淡苔白腻，脉濡缓。辨证为痹证之着痹，宜选用的基础方剂是薏苡仁汤；平素肌肤不仁，手足麻木，突发口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌强语蹇；舌淡苔薄白，脉浮数。辨证为中风之风痰入络证，宜选用的基础方剂是真方白丸子；半身不遂，肢软无力，面色萎黄；舌淡紫苔薄白，脉细弱，辨证为中风之气虚血瘀证，宜选用的基础方剂是补阳还五汤。防风汤是治疗行痹的方剂；半夏白术天麻汤是治疗眩晕痰湿中阻证的方剂。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

[64~65]

- A.脾胃气虚
- B.阴虚燥热
- C.气阴两虚
- D.肾阴亏虚
- E.阴阳两虚

64.某男，65岁。烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦，舌红薄苔黄，脉滑数。四诊合参，辨析其证候是（ ）。

65.某男，53岁。尿频量多，浊如膏脂，腰膝酸软，头晕耳鸣，多梦遗精，乏力；舌红少苔，脉细数。四诊合参，辨析其证候是（ ）。

答案：B、D

解析：本题主要考查的是消渴。烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦，舌红薄苔黄，脉滑数。四诊合参，辨析其证候是阴虚燥热；尿频量多，浊如膏脂，腰膝酸软，头晕耳鸣，多梦遗精，乏力；舌红少苔，脉细数。四诊合参辨析其证候是肾阴亏虚。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

[66~68]

A.小蓟饮子

B.八正散

C.代抵当汤

D.无比山药丸

E.济生肾气丸

66.某女，32岁。小便量极少、短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，口渴不欲饮；舌红苔黄腻，脉数。诊断为癃闭，证属膀胱湿热，宜选用的基础方剂是（ ）。

67.某男，49岁。尿如细线，甚则阻塞不通，烦躁口苦；舌紫暗有瘀点、苔黄腻，脉涩。诊断为癃闭，证属湿热瘀阻，宜选用的基础方剂是（ ）。

68.某男，72岁。小便点滴不爽，排出无力，面色㿔白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝酸软无力，舌淡胖苔薄白，脉沉细。诊断为癃闭，证属肾阳衰惫，宜选用的基础方剂是（ ）。

答案：B、C、E

解析：本题主要考查的是癃闭。癃闭，证属膀胱湿热，宜选用的基础方剂是八正散；为癃闭，证属湿热瘀阻，宜选用的基础方剂是代抵当汤；癃闭，证属肾阳衰惫，宜选用的基础方剂是济生肾气丸。

考点来源：

难易程度：

试题分类:

[69-70]

- A.丹栀逍遥散
- B.补中益气汤
- C.血府逐瘀汤
- D.逍遥散
- E.清骨散

69.某男, 60岁。反复发热, 体温时低时高, 劳累后加剧, 伴倦怠乏力, 气短懒言, 自汗, 食少便溏;舌淡苔薄白, 脉细弱。宜选用的基础方剂是()。

70.某女, 50岁。夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥。舌红有裂纹, 苔少, 脉细数。宜选用的基础方剂是()。

答案: B、E

解析: 本题主要考查的是内伤发热。反复发热, 体温时低时高, 劳累后加剧, 伴倦怠乏力, 气短懒言, 自汗, 食少便溏;舌淡苔薄白, 脉细弱。辨证为内伤发热之气虚发热, 宜选用的基础方剂是补中益气汤;夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥。舌红有裂纹, 苔少, 脉细数。辨证为内伤发热之阴虚发热, 宜选用的基础方剂是清骨散。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

[71-73]

- A.脾虚湿盛
- B.肾阳亏虚
- C.肝郁脾虚
- D.湿热下注
- E.脾肾两虚

71.某女, 35岁。带下量多, 色白, 质稀薄, 绵绵不断, 无臭, 面色晄白, 四肢倦怠, 腕肘不舒, 纳少便溏;舌淡胖苔白, 脉细缓。辨析其证候是()。

72.某女, 45岁。带下量多, 绵绵不断, 质清稀如水, 腰痛如折, 畏寒肢冷, 小腹冷感, 面色晦暗, 小便清长, 大便溏薄;舌淡苔白润, 脉沉迟。辨析其证候是()。

73.某女, 50岁。带下量多, 色白质黏, 有臭气, 豆腐渣样, 外阴瘙痒, 小腹作痛, 口苦口黏, 胸闷纳呆, 小便短赤;舌红苔黄腻, 脉滑数。辨析其证候是()。

答案: A、B、D

解析: 本题主要考查的是带下过多。带下量多, 色白, 质稀薄, 绵绵不断, 无臭, 面色晄白, 四肢倦怠, 脘肋不舒, 纳少便溏;舌淡胖苔白, 脉细缓。辨析为带下过多之脾虚湿盛证;带下量多, 绵绵不断, 质清稀如水, 腰痛如折, 畏寒肢冷, 小腹冷感, 面色晦暗, 小便清长, 大便溏薄;舌淡苔白润, 脉沉迟。辨析为带下过多之肾阳亏虚证;带下量多, 色白质黏, 有臭气, 豆腐渣样, 外阴瘙痒, 小腹作痛, 口苦口黏, 胸闷纳呆, 小便短赤;舌红苔黄腻, 脉滑数。辨析为带下过多之湿热下注证。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

[80-82]

A.藁本

B.细辛

C.升麻

D.独活

E.川芎

80.为足太阳本经药, 亦治督脉为病的是()。

81.为足阳明、足太阴引经药, 亦治带脉为病的是()。

82.为少阳本经引经药, 亦入手、足厥阴气分的是()。

答案: A、C、E

解析: 本题主要考查的是中药归经配伍。藁本气味辛温, 无毒, 足太阳本经药, 亦治督脉为病;升麻气味甘苦平微寒, 无毒, 为足阳明、足太阴引经药, 亦入手阳明、手太阴经, 并治带脉为病;川芎气味辛温, 无毒, 少阳本经引经药, 入手、足厥阴气分等;细辛气味辛温, 无毒, 入足少阴、厥阴经血分, 又为手少阴引经之药, 并黄柏气味苦寒, 无毒, 入足少阴经, 为足太阳引经药;独活气味辛苦微温, 无毒, 入足少阴经气分。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

[83~84]

- A.生姜汁
- B.米汤
- C.黄酒
- D.蜂蜜
- E.淡盐水

83.为增强大活络丸的活血通络作用，宜用的药引是（ ）。

84.为增强大补阴丸入肾之功，宜用的药引是（ ）。

答案：C、E

解析：本题主要考查的是中成药与药引的联合应用。为增强大活络丸的活血通络作用，宜用的药引是黄酒；为增强大补阴丸入肾之功，宜用的药引是淡盐水。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

[88~90]

- A.副作用
- B.特异质反应
- C.变态反应
- D.后遗作用
- E.药物依赖性

88.男，56。因瘀血肿病，服用含大黄 6g 的汤剂，出现腹泻，属于（ ）。

89.女，48。因上呼吸道感染，用炎琥宁注射液 0.2g 静脉滴注，10 分钟后出现面色苍白，大汗淋漓，随即神志不清，心率 100 次/min，血压 60/40，属于（ ）。

90.男，76。因便秘长期服用番泻叶，每日用开水泡水，近几日未服用，出现厌食，腹痛，全身痛，焦虑不安，面色潮红，失眠，呼吸急促，心率加快，属于（ ）。

答案：A、C、E

解析：本题主要考查的是中药药物不良反应/事件的发生机制。临床利用大黄逐瘀通经的功效治疗瘀血肿痛，其泻下攻积的功效就会导致腹泻的副作用。药物的过敏反应本质上是一种病理性免疫反应，炎琥宁注射液可引起皮疹等过敏样反应、过敏性哮喘、过敏性休

克。患者长期服用番泻叶可产生生理依赖性，主要症状包括焦虑不安、全身疼痛、失眠、面热潮红、厌食、体温上升、呼吸频率加快、心率加快、呕吐、腹痛等。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

1.根据以上材料，回答下列问题

A.小肠

B.肝

C.大肠

D.胃

E.膀胱

1.在吸收水谷精微的同时，也吸收了大量的水液的脏腑是（ ）。

2.能够调畅气机的脏腑是（ ）。

3.能够传化糟粕，并吸收部分水液的脏腑是（ ）。

答案：A、B、C

解析：本题考查藏象。

考点来源：小肠：（1）受盛、化物。受盛——小肠接受经胃初步消化的食糜；化物——食糜在脾气与小肠的共同作用化为精微和糟粕两部分。（2）泌别清浊：指小肠对食糜进一步消化，将其分为清浊两部分，并将清（水谷精微）吸收，将浊（食物残渣）传输于大肠。（3）小肠主液：指小肠在吸收水谷精微的同时，吸收大量津液的生理功能。大肠：（1）传化糟粕：指大肠接受由小肠下移的食物残渣，吸收水分，形成糟粕，经肛门排泄粪便的功能。（2）大肠主津：指大肠接受食物残渣，吸收多余水分的功能。肝：（1）主疏泄——中心环节是调畅全身气机。①调畅情志；②协调脾升胃降；③促进胆汁生成与排泄；④促进血液运行；⑤促进津液代谢；⑥调畅排精行经。（2）主藏血：贮藏血液、调节血量、防止出血。胃：主受纳腐熟水谷。受纳——指胃具有接受和容纳饮食水谷的功能；腐熟——指胃气能将食物初步消化，并形成食糜。膀胱：贮尿、排尿。

难易程度：

试题分类：

大题：综合分析题

[91~94]

(一)

某男，64岁。患水肿病数月，刻下症见全身水肿，双下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶；苔白腻，脉沉缓。检验结果显示血清尿素氮 12.5mmol/L，血清肌酐 202umol/L，血尿酸 512umol/L，血清肌酸激酶 200U/L，血清总胆红素 17.0umol/L。

91.检验结果中反映肾功能的指标是（ ）。

- A.血清尿素氮、血清肌酐
- B.血清肌酸激酶、血尿酸
- C.血清尿素氮、血清总胆红素
- D.血清肌酸激酶、血清尿素氮
- E.血清总胆红素、血清肌酐

答案：A

解析：本题主要考查的是肾功能检查。检验结果中反映肾功能的指标是血清尿素氮、血清肌酐。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

92.宜选用的基础方剂是（ ）。

- A.实脾饮
- B.五皮散合胃苓汤
- C.疏凿饮子
- D.越婢加术汤
- E.济生肾气丸合真武汤

答案：B

解析：本题主要考查的是水肿。全身水肿，双下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶；苔白腻，脉沉缓。应辨证为水肿之水湿浸渍证，方剂宜选用五皮散合胃苓汤。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

93.宜选用的中成药是 ()。

- A. 肾炎解热片
- B. 肾炎温阳片
- C. 肾炎灵胶囊
- D. 肾炎四味片
- E. 肾炎消肿片

答案: E

解析: 本题主要考查的是水肿。水肿之水湿浸渍证, 中成药宜选用肾炎消肿片。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

94.该患者长期服用小剂量阿司匹林, 有可能引起升高的生化检验指标是 ()。

- A. 血尿酸
- B. 血清肌酐
- C. 血清肌酸激酶
- D. 血清尿素氮
- E. 血清总胆红素

答案: A

解析: 本题主要考查的是血尿酸。该患者长期服用小剂量阿司匹林, 有可能引起升高的生化检验指标是血尿酸。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

(二)

某男，45岁。有吸烟、饮酒嗜好。外感1周后，出现咳嗽，喉中痰鸣，咳痰量多，色黄质黏稠，气味腥，面赤，身热，息粗，胸肋胀满，咳时引痛，口干而黏，欲饮水；舌红苔黄腻，脉滑数。

95.四诊合参，辨析其证候是（ ）。

- A.肺阴亏耗
- B.风热犯肺
- C.风燥伤肺
- D.痰湿蕴肺
- E.痰热郁肺

答案：E

解析：本题主要考查的是咳嗽。咳嗽，喉中痰鸣，咳痰量多，色黄质黏稠，气味腥，面赤，身热，息粗，胸肋胀满，咳时引痛，口干而黏，欲饮水；舌红苔黄腻，脉滑数。辨证为咳嗽之痰热郁肺证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

96.应采用的治法是（ ）。

- A.滋阴润肺，止咳化痰
- B.清热肃肺，豁痰止咳
- C.健脾燥湿，化痰止咳
- D.疏风清肺，润燥止咳
- E.疏风清热，宣肺止咳

答案：B

解析：本题主要考查的是咳嗽。咳嗽之痰热郁肺证，宜选用的治法是清热肃肺，豁痰止咳。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

97.宜选用的中成药是（ ）。

- A.二母宁嗽丸

- B.风热咳嗽胶囊
- C.清肺化痰丸
- D.蛇胆陈皮胶囊
- E.百合固金丸

答案：C

解析：本题主要考查的是咳嗽。咳嗽之痰热郁肺证，宜选用的中成药是清肺化痰丸、清肺抑火丸、复方鲜竹沥液。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

[98~99]

(三)

某男，56岁。素患胸痹，间断服用中成药，病情稳定。秋冬换季，气温骤降，猝然胸闷心痛，心痛彻背，气短心悸，形寒，手足不温，冷汗自出，面色苍白；舌紫暗有瘀斑，脉沉细。诊断为胸痹，证属寒凝心脉。

98.应采用的治法是（ ）。

- A.理气活血，通脉止痛
- B.辛温散寒，宣通心阳
- C.通阳泄浊，豁痰宣痹
- D.益气活血，通脉止痛
- E.暂缺

答案：B

解析：胸痹的寒凝心脉证，宜采用的治法是辛温散寒，宣通心阳。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

99.宜选用的基础方剂是（ ）。

- A.瓜蒌薤白半夏汤
- B.补阳还五汤

C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤

D.人参养荣汤合生脉散

E.血府逐瘀汤

答案：C

解析：胸痹的寒凝心脉证，宜采用的基础方剂是枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

[100~102]

（四）

某女，38岁。胃脘胀痛，痛连两胁，遇烦恼痛甚，暖气则舒，善太息，大便不畅；舌淡红苔薄白，脉弦。诊断为胃痛，证属肝气犯胃。

100.应采用的治法是（ ）。

A.疏肝解郁，理气止痛

B.疏肝和胃，散寒止痛

C.疏肝和胃，理气化痰

D.疏肝和胃，温经止痛

E.疏肝解郁，养血和胃

答案：A

解析：胃痛的肝气犯胃证采用的治法是疏肝解郁，理气止痛。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

101.宜选用的中成药是（ ）。

A.胃痛宁片

B.沉香化气丸

C.胃尔康片

D.胃乐新颗粒

E.温胃舒胶囊

答案：B

解析：胃痛的肝气犯胃证选用的中成药有沉香化气丸、朴沉化郁丸、舒肝健胃丸、舒肝和胃丸、调胃舒肝丸。胃痛宁片--湿热中阻证；胃尔康片、胃乐新颗粒--胃阴亏耗证；温胃舒胶囊--脾胃虚寒证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

102.服用上药后诸症缓解，但患者未及时复诊，仍自行服药数月，胃痛复发。症见胃脘隐隐灼痛，食少不饥，嘈杂，口干咽燥，便结不畅；舌红少津，脉细数。应采用的治法是（ ）。

- A.温中健脾，行气和胃
- B.清化湿热，理气和胃
- C.养阴益胃，和中止痛
- D.消食导滞，和胃止痛
- E.温胃散寒，行气止痛

答案：C

解析：根据胃脘隐隐灼痛，食少不饥，嘈杂，口干咽燥，便结不畅；舌红少津，脉细数，辨证为胃阴亏耗证，宜采用的治法是养阴益胃，和中止痛。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

[104~106]（五）

某男，36岁。眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，颜面潮红，急躁易怒，失眠多梦，遇烦劳郁怒加重；舌红苔黄，脉弦数。诊断为眩晕，证属肝阳上亢。

104.宜选用的基础方剂是（ ）。

- A.天麻钩藤饮
- B.归脾汤
- C.左归丸
- D.通窍活血汤
- E.芎芷石膏汤

答案：A

解析：眩晕的肝阳上亢证眩晕的方剂是天麻钩藤饮。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

105.患者服药后，诸症缓解 5 年后因眩晕复发就诊，体胖，自述头重昏蒙，时而视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐；舌苔白腻，脉濡。辨析其证候是（ ）。

- A.肝郁脾虚
- B.痰湿中阻
- C.血瘀痰阻
- D.气血亏虚
- E.肾虚阳亢

答案：B

解析：根据体胖，自述头重昏蒙，时而视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐；舌苔白腻，脉濡。辨证为痰湿中阻证。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

106.宜选用的中成药是（ ）。

- A.松龄血脉康胶囊
- B.参茸阿胶
- C.芎菊上清丸
- D.半夏天麻丸
- E.古汉养生精

答案：D

解析：眩晕的痰湿中阻证选用的中成药有半夏天麻丸、眩晕宁颗粒、晕复静片。

考点来源：

难易程度：

试题分类:

[107~108]

(六)

某女, 56岁。患痹证5年, 证属尪痹, 治以桃红饮(桃仁、红花、川芎、当归尾、麝香、威灵仙)合独活寄生汤(独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、甘草、川芎、人参、芍药、当归、地黄)加减。

107.关于方中饮片品种选择的说法, 错误的是()。

- A.威灵仙宜选用酒威灵仙
- B.川芎宜选用生川芎
- C.牛膝宜选用怀牛膝
- D.杜仲宜选用生杜仲
- E.地黄宜选用熟地黄

答案: D

解析: 杜仲宜选用盐杜仲, 引药入肾, 增强补肝肾强筋骨作用。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

108.麝香多入丸散, 《中国药典》规定其每日内服剂量()。

- A.0.01-0.03
- B.0.03-0.1g
- C.0.1-0.3
- D.0.3-0.5g
- E.0.5-1g

答案: B

解析: 桃红饮中麝香多入丸散用, 《药典》规定其内服剂量为每日0.03~0.1g。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

96.丹参多酚酸盐不合理使用情况属于(超剂量用药)

解析:

97.药方中中药饮片为蜜麻黄，药师在调配中错拿成生麻黄，核对中及时发现，又改为蜜麻黄，用药错误等级为（B级）

大题：多选题

111.喘咳气逆，呼吸急促，痰黏而带泡沫，头痛鼻塞、无汗，恶寒发热，舌苔薄白，脉浮紧，诊断为喘证，证属风寒闭肺，可选用（ ）。

- A.小青龙胶囊
- B.葶贝胶囊
- C.风寒咳嗽颗粒
- D.苓桂咳喘宁胶囊
- E.桂龙咳喘宁胶囊

答案：ACDE

解析：本题主要考查的是喘证。喘证，证属风寒闭肺，中成药可选用小青龙胶囊、风寒咳嗽颗粒、苓桂咳喘宁胶囊、桂龙咳喘宁胶囊。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

112.药学咨询服务对指导患者安全、有效、合理用药具有重大意义。下列关于应用药品的特殊提示，说法正确的有（ ）。

- A.对于肝功能不全者，应完全禁用具有肝毒性的药物
- B.婴幼儿及儿童用药应避免或减少使用猛药重剂
- C.对于哺乳期患者，应于哺乳前给药
- D.老年人用药应从“最小剂量”开始
- E.老年人使用滋补药时，应遵照中医辨证论治原则

答案：BDE

解析：肝功能不全对体内药物的药动学影响重大，一般情况下，其对药物代谢的影响与疾病的严重程度呈正比。执业药师在指导此类患者的用药时要注意在明确诊断的前提下，选择低风险药物，避免或减少使用对肝脏毒性大的药物，注意药物之间的相互作用，在联合用药时，要避免肝毒性药物的合用。要选择肝毒性小，从肾脏排泄的药物。对于哺乳期患者，于一天只服一次的药品，建议晚上给药；一天服用多次的药物，建议哺乳后立即给药。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

113.属于奇恒之腑的有（ ）。

- A.脑
- B.骨
- C.胆
- D.髓
- E.脉

答案: ABCDE

解析: 本题主要考查的是藏象。奇恒之腑, 即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

114.宜空腹服用的有（ ）。

- A.桂枝汤
- B.保和丸
- C.十枣汤
- D.酸枣仁汤
- E.桃核承气汤

答案: CE

解析: 本题主要考查的是服药时间。峻下逐水药宜空腹服, 可使药力直达病所, 如十枣汤。驱虫药空腹服可使药效更佳; 攻积导滞药空腹服可使泻下之力更强。活血化瘀药宜空腹服药, 如桃核承气汤。桂枝汤宜清晨至午前服; 保和丸宜饭后服; 酸枣仁汤宜睡前服。

考点来源:

难易程度:

试题分类:

115.可通过与血浆蛋白竞争相结合影响华法林药效的作用中药有（ ）。

A.丹参

B.黄连

C.黄柏

D.甘草

E.五味子

答案：ABC

解析：本题考查中西药联用的药动学的相互作用。影响分布：丹参、黄连、黄柏与华法林联用能够改变病理状态下血浆蛋白水平。

考点来源：

难易程度：

试题分类：

116.以下关于肾的生理功能，说法正确的是（ ）。

A.丹参

B.黄连

C.黄柏

D.甘草

E.五味子