

临床执业（含助理）医师资格考试 100 考题

例题 1. 小儿年龄分期中的婴儿期是指

- A. 从出生结扎脐带到满 28 天
- B. 从出生到 1 岁
- C. 3 周岁到 6~7 岁
- D. 从 6 岁至 12~14 岁
- E. 从 6 岁至 12 岁

正确答案：B

例题 2. 意外事故较多见，营养性疾病亦多见的的年龄段是

- A. 学龄期
- B. 青春期
- C. 婴儿期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

正确答案：D

例题 3. 最能反映小儿近期营养状态变化的指标

- A. 身高
- B. 体重
- C. 胸围
- D. 腹围
- E. 头围

正确答案：B

例题 4. 出齐的小儿乳牙数目是

- A. 14 个
- B. 20 个
- C. 22 个
- D. 18 个
- E. 16 个

正确答案：B

例题 5. 6 个月以下小儿免疫预防接种不包括

- A. 乙肝疫苗
- B. 卡介苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 百白破疫苗
- E. 脊髓灰质炎疫苗

正确答案：C

例题 6. 3 个月婴儿，体重 5kg，人工喂养，每日喂 8% 糖牛奶量，和补水量是

- A. 400ml，150 ml
- B. 450 ml，750 ml
- C. 500 ml，250 ml
- D. 600 ml，750 ml
- E. 700 ml，250 ml

正确答案：C

例题 7. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的发病机制与维生素 D 缺乏性佝偻病最根本的不同在于

- A. 神经系统兴奋性较高
- B. 甲状旁腺反应迟钝，甲状旁腺激素代偿不足
- C. 食物中钙含量过低
- D. 维生素 D 缺乏的程度较重
- E. 食物中磷含量过高

正确答案：B

例题 8. 佝偻病恢复期长骨 X 线片改善的特点是

- A. 骨临时钙化带重新出现
- B. 临时钙化带消失
- C. 干骺端增宽
- D. 骨质稀疏，密度减低

E. 干骺端呈毛刷状®

正确答案：A

例题 9. 蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少的顺序是

A. 躯干——臀部——四肢——腹部——面颊

B. 四肢——躯干——腹部——臀部——面颊

C. 躯干——臀部——腹部——四肢——面颊

D. 腹部——躯干——臀部——四肢——面颊

E. 腹部——躯干——面颊——臀部——四肢

正确答案：D

例题 10. 女孩，2 岁。生长发育迟缓及智力发育落后。查体：眼裂小、眼外眦上斜、眼距宽、外耳小、鼻梁低平，皮肤细腻。为明确诊断首选的检查是

A. 尿三氯化铁试验

B. 尿蝶呤分析

C. 血 T₃、T₄、TSH

D. 骨龄测定

E. 染色体核型分析

正确答案：E

例题 11. 诊断新生儿 ABO 溶血，最重要的检查是

A. 血常规

B. 血型

C. 肝功能与胆红素

D. 改良直接抗人球蛋白试验

E. 血涂片查红细胞形态

正确答案：D

例题 12. 男孩 1 岁半。生后半年发现尿有霉臭味，经常呕吐，1 岁时发现智力较同龄儿落后。查体：目光呆滞，皮肤白皙，毛发浅黄。明确诊断的检查是

血苯丙氨酸浓度测定

B. 血 T₃、T₄测定

C. 染色体核型分析®

D. 头颅 CT

E. 脑电图

正确答案：A

例题 13. 确诊风湿热的主要表现哪项是错误的

A. 心脏炎

B. 游走性多发性关节炎

C. 舞蹈病

D. 发热

E. 环形红斑

正确答案：D

例题 14. 新生儿缺氧缺血性脑病时发生惊厥, 首选的药物是

A. 甘露醇

B. 地塞米松

C. 苯巴比妥

D. 苯妥英钠

E. 呋塞米

正确答案：C

例题 15. 下列川崎病的治疗中, 易发生冠状动脉瘤和影响冠脉修复, 而不宜单独使用的是

A. 阿司匹林

B. 泼尼松

C. 静脉注射丙种球蛋白

D. 双嘧达莫

E. 心脏手术

正确答案：B

例题 16. 判断小儿支气管肺炎严重程度的指标是

A. 白细胞高低

- B. 呼吸频率
- C. 有无累及其他系统
- D. 胸片显示程度
- E. 感染菌群

正确答案：C

例题 17. 胸骨左缘第 2、3 肋间闻及 2~3 级收缩期杂音, 第二心音固定分裂常见于

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 肺动脉瓣关闭不全

正确答案：D

例题 18. 所谓无血流动力学变化的 Roger 病是指

- A. 原发性房间隔缺损
- B. 继发性房间隔缺损
- C. 小型室间隔缺损
- D. 中型室间隔缺损
- E. 大型室间隔缺损

正确答案：C

例题 19. 男婴, 8 个月。3 天来腹泻 6~8 次/日, 为黄色水样便, 呕吐 3~5 次/日, 为胃内容物, 尿量减少, 哭时少泪。查体: 精神萎靡, 口唇干燥, 呼吸略深长, 皮肤弹性差, 眼窝及前囟明显凹陷, 血钠 130 mmol/L。最可能的诊断是

- A. 重度低渗性脱水
- B. 中度低渗性脱水
- C. 中度等渗性脱水
- D. 重度等渗性脱水
- E. 轻度等渗性脱水

正确答案：C

例题 20. 女, 2 岁。腹泻 3 天, 诊断为重型腹泻。经静脉补充有效量的 3 : 2 : 1 液治疗, 脱水明显纠正, 尿量增加, 但患儿仍有腹胀, 经检查, 肌张力低, 首先需考虑

- A. 低钠血症
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 低镁血症
- E. 低氯血症

正确答案: C

例题 21. 患者, 男, 68 岁, 反复咳嗽、咳痰、气促 41 年, 心悸、水肿 5 年, 近 1 周来症状加重入院。查体: 呼吸急促, 双肺可闻及干湿啰音, P_2 亢进, 三尖瓣区闻及 3/6 级收缩期杂音。肝右肋下 4cm, 压痛 (+), 肝颈静脉回流征阳性, 下肢水肿。此时首选的治疗是使用

- A. 强心剂
- B. 利尿剂
- C. 心血管扩张剂
- D. 抗生素
- E. 祛痰剂

正确答案: D

例题 22. COPD 发生肺动脉高压最主要的机制是

- A. 低氧、 CO_2 潴留所致肺小动脉收缩
- B. 肺小动脉内膜广泛增厚
- C. 肺小动脉内原位血栓形成
- D. 肺毛细血管断裂所致血管阻力增加
- E. 慢性缺氧所致血液黏滞度增加

正确答案: A

例题 23. 慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血最多见于

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管肺癌

C. 支气管扩张

D. 肺结核

E. 肺炎

正确答案:C

例题 24. 老年患者突然发生寒战、高热、咳嗽、咳痰，痰粘稠，砖红色，胶冻状，引起感染最可能的病原菌是

A. 葡萄球菌

B. 克雷伯杆菌

C. 铜绿假单胞菌

D. 流感嗜血杆菌

E. 嗜肺军团杆菌

正确答案:B

例题 25. 易并发脓胸、脓气胸的肺炎是

A. 呼吸道合胞病毒肺炎

B. 腺病毒肺炎

C. 金黄色葡萄球菌肺炎

D. 支原体肺炎

E. 衣原体肺炎

正确答案:C

例题 26. 肺炎伴感染性休克常见于以下肺部炎症，除了

A. 肺炎球菌肺炎

B. 金黄色葡萄球菌肺炎

C. 克雷伯杆菌肺炎

D. 绿脓杆菌肺炎

E. 支原体肺炎

正确答案:E

例题 27. 早期发现肺结核的最主要方法是

A. 询问病史

B. X 线检查

C. 痰菌检查

D. 血沉检查

E. 结核变态反应

正确答案:B

例题 28. 引起 I 型呼吸衰竭最常见的疾病是

A. 慢性支气管炎

B. 阻塞性肺气肿

C. 气管异物

D. 膈肌麻痹

E. ARDS

正确答案:E

例题 29. 呼吸衰竭最主要的临床表现是

A. 呼吸费力伴呼气相延长

B. 呼吸频率增快

C. 呼吸困难与发绀

D. 神经精神症状

E. 双肺有大量湿啰音

正确答案:C

例题 30. 急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 最重要的诊断依据是

A 肺内分流量减少

B. 肺泡气-动脉血氧分压差降低

C. 氧合指数 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) $< 300\text{mmHg}$

D. 呼吸频率增加, 每分钟大于 28 次

E. 血气分析显示为低氧伴轻度二氧化碳潴留

正确答案:C

例题 31. 慢性肺心病患者提示右心功能不全的主要体征是

A. 双下肢水肿

B. 肝静脉回流征阳性

- C. 心脏向左扩大
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- E. 肝大，触痛阳性

正确答案:B

例题 32. 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是

- A. 血沉检查
- B. X 线检查
- C. 痰结核菌检查
- D. 结核菌素试验
- E. 血结核抗体检查

正确答案:C

例题 33. 预后最差的肺癌是

- A. 鳞形细胞癌
- B. 小细胞癌
- C. 腺癌
- D. 大细胞癌
- E. 细支气管肺泡癌

正确答案:B

例题 34. 最有助于诊断支气管肺癌的检查是

- A. 肺动脉造影
- B. 胸部 B 超
- C. 痰培养+药敏
- D. 支气管镜检
- E. 支气管造影

正确答案:D

例题 35. 肺弥散功能障碍最常出现

- A. PaO_2 正常， PaCO_2 上升
- B. PaO_2 下降， PaCO_2 上升

- C. PaO_2 正常, PaCO_2 正常
- D. PaO_2 正常, PaCO_2 下降
- E. PaO_2 下降, PaCO_2 正常或下降

正确答案:E

例题 36. 男性, 68 岁, 慢性咳嗽 12 年, 活动后气急 3 年, 下列哪项对诊断慢性阻塞性肺疾病最有价值

- A. PaO_2 降低
- B. $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 80\%$
- C. FEV_1 占预计值百分比 $< 80\%$
- D. $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 70\%$
- E. 最大呼气中期流速降低

正确答案:D

例题 37. 男 65 岁, 慢支 30 年, 近 3 年来下肢水肿, 活动后气短, 3 天前受凉后加重, 神志恍惚嗜睡, 血气分析: $\text{pH} 7.15$, $\text{PaCO}_2 80\text{mmHg}$, $\text{PaO}_2 45\text{mmHg}$, $\text{BE} -10\text{mmol/L}$, 此结果符合

- A. 呼吸性酸中毒失代偿期
- B. 呼吸性酸中毒代偿期
- C. 呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒+代谢性酸中毒
- E. 呼吸性酸中毒+代谢性酸中毒

正确答案:E

例题 38. 支气管扩张最有意义的体征是

- A. 贫血貌
- B. 杵状指
- C. 发绀
- D. 固定吸气性哮鸣音
- E. 局限性固定持久湿啰音

正确答案:E

例题 39. 胸片可见环形透亮区、肺门上提、肺纹呈垂柳状改变的多为

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 干酪样肺炎
- D. 纤维空洞性肺结核
- E. 结核球

正确答案:D

例题 40. 关于抗结核药物副作用下列哪条是错误的

- A. 异烟肼：肝功损害
- B. 利福平：肝功损害
- C. 吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害
- D. 链霉素：耳鸣耳聋
- E. 乙胺丁醇：视神经炎

正确答案:C

例题 41. 全子宫切除术时无需切断的韧带是

- A. 宫骶韧带
- B. 骨盆漏斗韧带
- C. 卵巢固有韧带
- D. 子宫圆韧带
- E. 子宫主韧带

正确答案：B

例题 42. 关于子宫峡部解剖学特点，错误的是

- A. 非孕期长约 1 cm
- B. 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分
- C. 上端为组织学内口
- D. 下端与子宫颈内腔相连
- E. 妊娠末期可达 7 ~ 10 cm

正确答案：C

例题 43. 排卵前雌激素的主要来源是

- A. 子宫内膜
- B. 黄体细胞
- C. 卵泡膜细胞
- D. 初级卵泡
- E. 滋养细胞

正确答案：C

例题 44. 孕妇血清绒毛膜促性腺激素 (hCG) 浓度达高峰是在妊娠

- A. 5~7 周
- B. 8~10 周
- C. 11~13 周
- D. 14~16 周
- E. 17~19 周

正确答案：B

例题 45. 卵巢功能检查不包括的是

- A. 宫颈细胞学检查
- B. 阴道脱落细胞检查
- C. 宫颈黏液检查
- D. 基础体温测定
- E. 月经期前子宫内膜组织检查

正确答案：A

例题 46. 末次月经第一天为 2016 年 7 月 6 日，计算预产期应是

- A. 2017 年 5 月 12 日
- B. 2017 年 4 月 13 日
- C. 2017 年 5 月 14 日
- D. 2017 年 5 月 15 日
- E. 2017 年 5 月 16 日

正确答案：B

例题 47. 治疗重度子痫前期首选的药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 硫酸镁
- C. 双氢克尿塞
- D. 20%的甘露醇
- E. 白蛋白

正确答案：B

例题 48. 念珠菌性阴道炎典型的白带是

- A. 凝乳块状
- B. 泡沫状
- C. 黄色脓性
- D. 水样
- E. 血性

正确答案：A

例题 49. 卵巢纤维瘤伴胸腹水形成称为

- A. Meigs 综合征
- B. Down's 综合征
- C. Meniere 综合征
- D. Cushing 病
- E. 类癌综合征

正确答案：A

例题 50. 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是

- A. 阴道流血时间长短
- B. 距葡萄胎排空后时间长短
- C. 尿中 hCG 值高低
- D. 子宫大小程度不同
- E. 活组织镜下见有无绒毛结构

正确答案：E

51. 术中识别输卵管的标志是

- A. 输卵管伞部
- B. 输卵管间质部
- C. 输卵管系膜
- D. 输卵管漏斗
- E. 输卵管外侧端

正确答案：A

52. 卵巢动脉来自

- A. 腹主动脉
- B. 髂总动脉
- C. 髂内动脉
- D. 髂外动脉
- E. 肾动脉

正确答案：A

53. 女性第二性征发育最早的标志是

- A. 月经来潮
- B. 乳房发育
- C. 身高增长
- D. 阴毛出现
- E. 卵巢增大

正确答案：B

54. 妊娠早期羊水的主要来源是

- A. 母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
- B. 胎儿皮肤
- C. 胎儿尿液
- D. 胎儿肺
- E. 胎膜

正确答案：A



55. 正常妊娠 38 周时的羊水量约为

- A. 600 ml
- B. 800 ml
- C. 1000 ml
- D. 1200 ml
- E. 1500 ml

正确答案：C

56. 正常妊娠于 32 周末时宫底高度应为

- A. 脐上 3 横指
- B. 脐与剑突之间
- C. 耻骨联合上刚能触及
- D. 脐耻之间
- E. 剑突下 2 横指

正确答案：B

57. 前置胎盘时阴道流血特征是

- A. 有痛性阴道流血
- B. 宫缩时阴道流血停止
- C. 阴道流血量与贫血程度不成正比
- D. 阴道流血与外伤有关
- E. 无痛性阴道流血

正确答案：E

58. 外阴阴道假丝酵母菌病的主要感染方式是

- A. 内源性感染
- B. 性生活直接传播
- C. 经接触感染衣物传播
- D. 经血液传播
- E. 垂直传播

正确答案：A

59. 可致血清雌激素升高的卵巢肿瘤是

- A. 卵巢浆液性囊腺癌

B. 内胚窦瘤

C. 畸胎瘤

D. 无性细胞瘤

E. 颗粒细胞瘤

正确答案：E

60. 初孕妇,28岁。妊娠32周,2天前突发头痛,视物模糊。查体P 70次/分,BP 170/120 mmHg,脚踝部凹陷性水肿,神经系统检查未发现异常。产科检查胎心率120次/分,为评估病情严重程度,首选的检查是

A. 眼底检查

B. 甲状腺功能测定

C. 尿常规

D. 头颅CT

E. 心脏彩超

正确答案：A

例题 61. 属于骨折专有体征的是

A. 张力水疱

B. 肿胀疼痛

C. 皮下瘀斑

D. 反常活动

E. 活动受限

正确答案：D

例题 62. 属于骨折早期并发症的是

A. 创伤性关节炎

B. 缺血性骨坏死

C. 关节僵硬

D. 骨筋膜室综合征

E. 坠积性肺炎

正确答案：D

例题 63. 符合骨折功能复位标准的是

- A. 骨折部分的分离移位不必完全矫正
- B. 儿童下肢骨干骨折缩短 2cm 以内
- C. 骨折部分的旋转移位不必完全矫正
- D. 复位后骨折断端对位达 1/5
- E. 允许下肢骨折存在与关节活动方向垂直的侧方成角

正确答案：B

例题 64. 女，75 岁。摔倒时右手撑地，腕部疼痛、肿胀。查体：右腕部呈“枪刺刀”畸形。诊断为

- A. Galeazzi 骨折
- B. Colles 骨折
- C. Monteggia 骨折
- D. Chance 骨折
- E. Smith 骨折

正确答案：B

例题 65. 不属于肱骨髁上骨折的临床表现是

- A. 肘部疼痛肿胀
- B. 肘部皮下瘀斑
- C. 肘后三角异常
- D. 手部皮肤苍白、皮温较低
- E. 前臂缺血性肌坏死

正确答案：C

例题 66. 男，40 岁。因车祸右小腿受伤，经拍 X 线片，诊断为右胫骨中下 1/3 交界处斜形骨折，其易发生

- A. 骨筋膜室综合征
- B. 脂肪栓塞
- C. 延迟愈合或不愈合
- D. 血管损伤

E. 损伤性骨化

正确答案：C

例题 67. 诊断脊髓损伤最有价值的检查是

A. MRI

B. ECT

C. X 线片

D. CT

E. B 超

正确答案：A

例题 68. 男，34 岁。由于侧身倒地右掌支撑，只右肩部肿胀，疼痛剧烈。检查：右肩轻度外展，弹性固定，方肩畸形，Dugas 征（搭肩试验）阳性。临床诊断是

A. 肱骨外科颈骨折

B. 臂丛损伤

C. 锁骨骨折

D. 肩关节挫伤

E. 肩关节脱位

正确答案：E

例题 69. 保存断肢最好的方法是

A. 浸泡于生理盐水中

B. 浸泡于抗生素溶液中

C. 浸泡于新洁尔灭溶液中

D. 包装于口袋内干燥冷藏

E. 置于冰块内

正确答案：D

例题 70. 慢性骨髓炎最有意义的诊断依据是

A. 皮肤有窦道并见死骨排出

B. 局部肿痛及患肢功能障碍

C. 寒战、高热等感染中毒症状

D. 白细胞总数及中性粒细胞增高

E. X 线未见骨质破坏和骨膜反应

正确答案：A

例题 71. 女，78 岁。跌倒后感右髋部疼痛 1 小时来诊。X 线片检查示右股骨颈头下型骨折，Pauwells 角为 60° 。最适宜的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 右下肢皮牵引
- C. 石膏固定
- D. 休息制动
- E. 手法复位

正确答案：A

例题 72. 胫骨易发生骨折的部位是

- A. 上端干骺端部位
- B. 横切面三棱形部位
- C. 横切面四边形部位
- D. 踝上部位
- E. 横切面三棱形与四边形移行部位

正确答案：E

例题 73. 男，45 岁，乘汽车时急刹车，左髌关节挫伤，X 线示股骨头向后方脱位，未见股骨头及髌臼骨折。髌关节畸形位置应该为

- A. 屈曲、内旋、内收
- B. 反屈曲、内收、外旋
- C. 屈曲、外展、外旋
- D. 屈曲、外展、内旋
- E. 过伸位、内收、内旋

正确答案：A

例题 74. 男，24 岁。左腕部切割伤 12 小时，伤及桡神经，其临床表现是

- A. 拇、示、中指不能屈曲
- B. 不能屈腕

- C. 手部内在肌萎缩®
- D. 手背虎口区域麻木
- E. 手掌桡侧感觉减弱

正确答案：D

例题 75. 女, 50 岁。右肩部疼痛, 不能梳头。查体: 右肩三角肌萎缩, 肩关节外展、外旋、后伸明显受限。X 线片未见骨质疏松, 肩峰下钙化。其首选诊断为

- A. 肩周炎
- B. 肩关节结核
- C. 肩关节肿瘤®
- D. 肱骨外上髁炎
- E. 风湿性关节炎

正确答案：A

例题 76. 女, 48 岁, 晨起左中指发僵、疼痛, 缓慢活动后可消失, 屈伸中指时有弹响。最可能的诊断是

- A. 类风湿性关节炎®
- B. 狭窄性腱鞘炎
- C. 腱鞘囊肿
- D. 滑膜炎
- E. 创伤性关节炎

正确答案：B

例题 77. 脊髓型颈椎病最重要的诊断依据为

- A. 头痛头晕®
- B. 双上肢麻木
- C. 眼痛、面部出汗失常
- D. 肢体发凉、无或少汗
- E. 四肢麻木、无力, 病理反射 (+)

正确答案：E

例题 78. 男, 35 岁, 腰痛伴右侧下肢放射性痛 3 个月, 无明显发热、盗汗。查体: 右侧直腿抬高试验阳性, 小腿前外侧和足底感觉减退, 拇背伸肌力减退。

17. 最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 腰肌劳损
- C. 腰椎肿瘤
- D. 腰椎结核
- E. 强直性脊柱炎

正确答案: A

例题 79. 急性化脓性骨髓炎最常见的致病菌是

- A. 乙型溶血性链球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 肺炎双球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案: E

例题 80. 男, 14 岁, 左胫骨近端疼痛 2 个月, 呈进行性加重。X 线片检查发现左胫骨干骺端骨膜反应呈“日光射线”形态。最可能的诊断是

- A. 骨肉瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨结核
- E. 骨囊肿

正确答案: A

例题 81. 变性蛋白质的主要特点是

- A. 不易被蛋白酶水解
- B. 分子量降低
- C. 溶解性增加

D. 生物学活性降低[®]

E. 共价键被破坏

正确答案：D

例题 82. 属于必需脂肪酸的是

A. 亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸

B. 油酸、亚麻酸、花生四烯酸

C. 亚油酸、软脂酸、花生四烯酸

D. 亚麻酸、硬脂酸、亚油酸

E. 亚麻酸、~~亚油酸~~、软脂酸

正确答案：A

例题 83. 不属于参与细胞内信息传递的第二信使物质是

A. cAMP

B. 钙离子

C. IP_3

D. DAG

E. ATP

正确答案：E

例题 84. 酶化学修饰调节最多见的是

A. 别构调节

B. 磷酸化/去磷酸化

C. 酶原激活

D. 催化物调节

E. 温度调节

正确答案：B

例题 85. 发生在肝生化转化第二阶段的是

A. 葡萄糖醛酸结合反应

B. 氧化反应

C. 还原反应

D. 水解反应

E. 酯化反应

正确答案：A

例题 86. 属于酮体的是

A. α -酮戊二酸

B. 乙酰乙酸

C. 肌醇

D. 胆汁酸

E. 琥珀酰 CoA

正确答案：B

例题 87. 嘌呤核苷酸的分解代谢终产物是

A. 尿酸

B. 酮体

C. β -丙氨酸

D. β -氨基羟丁酸

E. 尿素

正确答案：A

例题 88. 比较不同个体之间的心泵功能, 宜选用的评定标准是

A. 每搏输出量

B. 每分输出量

C. 射血分数

D. 心指数

E. 心脏做功量

正确答案：D

例题 89. 血液中 CO_2 的主要运输形式是

A. 和水结合形成碳酸

B. 形成碳酸氢盐

C. 形成一氧化碳血红蛋白

D. 形成氨基甲酸血红蛋白

E. 物理溶解

正确答案：B

例题 90. 能使胰蛋白酶原转变为胰蛋白酶的最重要的物质是

A. 胃酸

B. 胰蛋白酶

C. 糜蛋白酶

D. 肠激酶

E. 组织液

正确答案：D

例题 91. 内脏痛的主要特点是

A. 刺痛

B. 慢痛

C. 定位不精确

D. 必有牵涉痛

E. 对牵拉不敏感

正确答案：C

例题 92. 心动周期中, 主动脉压的最高值为

A. 舒张压

B. 循环系统平均充盈压

C. 平均动脉压

D. 收缩压

E. 脉压

正确答案：D

例题 93. 下列有关肺表面活性物质的描述不正确的是

A. 维持肺泡的扩张状态

B. 降低肺泡表面的张力

C. 稳定肺泡容积

D. 降低肺的顺应性

E. 防止毛细血管内的液体流入肺泡内

正确答案：D

例题 94. 某患者突起畏寒、寒战，体温 39°C ，这种体温升高是由于

A. 产热中枢抑制

B. 散热中枢抑制

C. 皮肤血管收缩

D. 调定点上移

E. 体温调节功能障碍

正确答案：D

例题 95. 下列哪种组织细胞再生能力最强

A. 骨组织

B. 神经节细胞

C. 软骨细胞

D. 心肌

E. 神经胶质细胞

正确答案：E

例题 96. 细胞坏死的主要形态学特征是

A. 核分裂

B. 细胞核异型

C. 线粒体肿胀

D. 细胞核碎裂

E. 细胞质脂质增多

正确答案：D

例题 97. 原位癌是指

A. 异型增生细胞累及全层，侵破基膜

B. 异型细胞累及上皮层的下 $1/3$

C. 上皮细胞异乎常态的增生

D. 异型细胞累及上皮层的下 $2/3$

E. 异型细胞累及上皮全层，未突破基膜

正确答案：E

例题 98. 脂褐素大量增加最常见于

A. 细胞萎缩

B. 细胞坏死

C. 细胞凋亡

D. 细胞水样变

E. 细胞玻璃样变

正确答案：A

例题 99. 不属于血栓结局描述的是

A. 溶解

B. 钙化

C. 软化

D. 机化

E. 硬化

正确答案：E

例题 100. 癌与肉瘤的主要区别是

A. 发生的部位不同

B. 肿瘤的颜色不同

C. 肿瘤的质地不同

D. 发生的年龄不同

E. 组织来源不同

正确答案：E