


国家执业药师资格考试经典 500 考题

药学综合知识与技能

金英杰国家医学考试研究中心 编

编委会成员	赵鸿峰	薄丽佳	刘 洋
	王冬竹	赵 静	李 娜
	查文琴	王 洁	杨 玥
	李月莲	杨 雪	

 北京出版集团公司
北京教育出版社

亲爱的考生您好：

请添加微信号，并**回复“考试”**，进入**“2019执业药师备考交流群”**，金英杰专业指导员
每日定期发送纯干货备考资料，以及报名指导流程图解，药师报考咨询第一时间掌握。

本书内存过大，后续内容请在群内领取。

祝您考试顺利！



模拟试卷(一)

规定时间:120分钟

自测时间_____

试题预计完成时间_____

一、最佳选择题

1.引起人体出现**鼻出血、便血、尿血及凝血时间延长**的药物是

- A.瘦肉精
B.克灭鼠
C.敌敌畏
D.巴比妥

E.百草枯
2. **香豆素类**灭鼠药中毒的特效解毒剂是

- A.维生素K
B.乙酰胺
C.烟酰胺
D.维生素E

3. **乙酰胺**可以用于解救

- A.有机氟农药中毒
B.有机磷农药中毒
C.有机硫农药中毒
D.灭鼠药中毒
E.有机氯农药中毒

(2017年真题) 4.药师在**审核处方**时无需要求确认或重新开处方的情形是



举一反三


- A.诊断为麻疹 使用阿莫西林抗感染治疗
B.将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
C.给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
D.头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
E.低分子肝素的给药方法为静脉滴注

5.灭鼠药**磷酸锌、磷酸铝、磷酸钙中毒**禁用

- A.氨茶碱
B.阿扑吗啡
C.阿托品
D.乙酰半胱氨酸
E.谷胱甘肽

6.解救有机磷中毒过程中 如**阿托品应用过量**应立即给予

- A.毛果芸香碱
B.东莨菪碱
C.麻黄碱
D.山莨菪碱



举一反三

E.茶碱

7.有机磷农药中毒时 应用**胆碱酯酶复活剂**应注意的是

- A.中毒已超过3日或慢性中毒患者 复活剂剂量加倍
B.中度中毒时 复活剂不应稀释且需快速注射
C.重度中毒时 应立即采用大剂量突击疗法 以控制中毒症状
D.不能与酸性药物配伍 以免影响药物稳定性
E.切勿两种或三种复活剂同时应用 以免其毒性增加

(2017年真题) 8.患者给药房购买**鱼肝油** 药师应给予

- A.鱼油
B.维生素A
C.维生素D
D.维生素AD
E.维生素E

9. **阿米替林中毒**心衰患者选用

- A.东莨菪碱
B.阿托品

C.碳酸氢钠

D.氯米帕明

E.毛花苷丙

10.对**三环类抗抑郁药**中毒和解救的叙述 错误的是

- A.三环类抗抑郁药的中毒与血药浓度相关
B.三环类抗抑郁药具有中枢和周围抗胆碱能作用
C.三环类抗抑郁药中毒表现为兴奋状态、抑制状态和心脏毒性
D.心脏传导障碍和心律失常 是三环类抗抑郁药中毒常见的致死原因
E.该类药物治疗的特异性解毒药物是氟马西尼

11.为解救**苯巴比妥中毒**的患者 在10%葡萄糖注射液中应该加入的药物是



举一反三

- A.氯化氨注射液
B.氯化钙注射液
C.抗坏血酸注射液
D.碳酸氢钠注射液
E.维生素B₆注射液

(2017年真题) 12.双歧三联活菌制剂说明书标明“**冷处**”贮存 其贮存条件是指

- A.温度超过20℃
B.温度10~30℃
C.温度不超过20℃且避光
D.温度不超过-5℃且避光
E.温度在2~10℃之间

13.治疗**巴比妥类药物中毒**时不正确的是

- A.1:5000高锰酸钾溶液洗胃
B.洗胃后将高锰酸钾溶液留于体内以促进药物排泄

C. 20%甘露醇 200 mL 静注利尿

D. 5%碳酸氢钠静滴碱化尿液 加速排泄

E. 深昏迷时可选用尼可刹米

14. 苯巴比妥急性中毒时 可加速其在尿中排泄的药物是

A. 氯化铵

B. 碳酸氢钠

C. 葡萄糖

D. 生理盐水

E. 硫酸镁

15. 下列药物中用于全麻苏醒的药物是

A. 间羟胺

B. 回苏灵

C. 氟马西尼

D. 尼可刹米

E. 亚甲蓝

(2017 年真题) 16. 因可提高血液携氧量 被长跑运动员用于提高成绩 因而被列为兴奋剂管理的药物是

A. 甲睾酮

B. 可卡因

C. 哌替啶

D. 人促红素

E. 麻黄碱

17. 治疗带状疱疹宜选用的药物是

A. 拉米夫定

B. 金刚乙胺

C. 齐多夫定

D. 扎那米韦

E. 阿昔洛韦

18. 缺铁性贫血最早和最常见的症状是

A. 食欲不振

B. 乏力、困倦、活动耐力减退

C. 头晕

D. 记忆力减退

E. 结膜及甲床苍白

19. 治疗缺铁性贫血的铁制剂 含铁量不正确的是

A. 硫酸亚铁 20%

B. 乳酸亚铁 19%

C. 葡萄糖亚铁 12%

D. 富马酸亚铁 32.9%

E. 右旋糖酐亚铁 5%

(2017 年真题) 20. 万古霉素 0.5 g 加入 5%葡萄糖注射液 100 mL 中静脉滴注 要求滴注时间不得少于 1 h 已知每毫升 15 滴 每分钟最多可滴注的滴数是

A. 7 滴

B. 15 滴

C. 25 滴

D. 50 滴

E. 60 滴

21. 患者 女 33 岁 实验室检查: 血红蛋白 95 g/L 临床诊断为缺铁性贫血 处方为口服硫酸亚铁片 下列向患者交代的用药注意事项 错误的是

A. 不宜与钙剂同时服用

B. 宜空腹服用

C. 宜同时补充维生素 C

D. 不宜同时进食牛奶和蛋类

E. 避免应用抑酸药

22. 采用催吐的方法清除胃内毒物适用于

A. 孕妇

B. 食道静脉曲张、胃溃疡出血的病人

C. 昏迷状态的病人

D. 神志清醒的病人

E. 冠心病的病人

23. 下列金属解毒剂中 尤以铅中毒疗效好的是

A. 二巯丙醇

B. 二巯基丁二酸钠

C. 依地酸钙钠

D. 硫代硫酸钠

E. 亚甲蓝

(2017 年真题) 24. 急性胰腺炎伴脂质代谢紊乱的患者 静脉滴注的药物是

A. 胰岛素注射液

B. 生长抑素注射液

C. 葡萄糖注射液

D. 乌司他汀注射液

E. 脂肪乳注射液

25. 重金属中毒时 不应该用的解救药物是

A. 二巯丙醇 (BAL)

B. 青霉胺 (D-盐酸青霉胺)

C. 依地酸钙钠 (解铅乐)

D. 亚甲蓝 (美蓝)

E. 硫代硫酸钠 (次亚硫酸钠)

26. 用于紧急避孕的药物是

A. 左炔诺孕酮

B. 黄体酮

C. 甲睾酮

D. 罗格列酮

E. 丁螺环酮

27. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应 可选用的止吐药是

A. 奥美拉唑

B. 雷尼替丁

C. 昂丹司琼

D. 维生素 B₆

E. 茶苯海明

(2017 年真题) 28. 下列药物中 适宜在睡前服用的是

- A. 泼尼松
C. 多潘立酮
E. 奥利司他



- B. 美洛昔康
D. 辛伐他汀

29. 癌症疼痛的治疗 应按照疼痛的程度选用不同阶段的镇痛药物 下列属于**第三阶梯**的镇痛药物是

- A. 双氯芬酸
C. 可待因
E. 吗啡

- B. 塞来昔布
D. 布桂嗪

30. 患者 女 55岁 关节痛半年 临床诊断为**类风湿关节炎** 既往有**十二指肠溃疡病**

史 应**首选**的NSAIDs类药物是  

- A. 塞来昔布
C. 布洛芬
E. 萘普生

- B. 吲哚美辛
D. 双氯芬酸

31. 治疗**类风湿关节炎**时 必须提醒患者每周用药一次 避免用药过量造成再生障碍性贫血等**药源性疾病**的药物是

- A. 来氟米特
C. 雷公藤
E. 甲氨蝶呤

- B. 泼尼松
D. 白芍总苷

(2017年真题) 32. **癫痫持续**状态**首选**的治疗方案是

- A. 口服丙戊酸钠 200mg
C. 静脉注射丙戊酸钠 200mg
E. 肌肉注射地西洋 10mg

- B. 静脉注射地西洋 10mg
D. 口服地西洋 10mg

33. 关于**非甾体类抗炎药**选药原则的说法 正确的是

- A. 解除平滑肌痉挛性疼痛可首选非甾体类抗炎药
B. 非甾体类抗炎药可替代抗感染治疗
C. 治疗未明原因的发热可立即应用非甾体类抗炎药
D. 非甾体类抗炎药可用于治疗骨关节炎
E. 非甾体类抗炎药常用于创伤剧痛

34. 伴有神经症状的**巨幼细胞性贫血**患者 在补充**叶酸**的基础上 还应补充 A.

- 维生素 B₁₂
C. 维生素 C
E. 维生素 B₁

- B. 维生素 B₆
D. 维生素 B₂

35. **妊娠期**妇女服用抗癫痫药**卡马西平**可导致缺乏的维生素是

- A. 维生素 E
C. 维生素 D
E. 维生素 A
B. 维生素 K
D. 维生素 C

(2017年真题) 36. 下列关于**巨幼细胞性贫血**的说法 错误的是  

A. 老年人和酗酒者为高危人群 B.

恶性贫血者需要终生维持治疗

C. 可静脉滴注维生素 B₁₂ 100~500 μg qd

D. 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

E. 在不确定只是单纯叶酸缺乏引起的贫血时叶酸应联合维生素 B₁₂

治疗

37. **过量**服用**维生素 D** 所发生中毒的典型临床表现是

- A. 骨骼发育不良或骨软化
C. 骨质疏松症或骨折
E. 高尿酸血症或疼痛
B. 间质性肾炎或肾结石
D. 横纹肌溶解或肌痛

38. **痛风**时**尿酸盐结晶**为

- A. 草酸盐结晶
C. 磷酸盐结晶
E. 胆红素结晶
B. 尿酸盐结晶
D. 酪氨酸

39. **秋水仙碱**治疗痛风急性发作为**首选** 推荐的首剂量是 A.

- 0.5~1mg
C. 2~5mg
E. 10~20mg
B. 1~2mg
D. 5~10mg

(2017年真题) 40. 会干扰乙醇代谢过程导致**“双硫仑样”**反应 用药期间禁饮酒的药物是

- A. 对乙酰氨基酚
C. 阿司匹林
E. 伊曲康唑
B. 阿奇霉素
D. 甲硝唑

二、配伍选择题

(2017年真题) 【41~42】

- A. 阿昔洛韦软膏
C. 氯化可的松软膏
B. 维 A 酸乳膏
D. 复方苯甲酸酊

E. 炉甘石洗剂

41. 治疗**水泡型脚癣**宜选用

42. 治疗**中度痤疮**宜选用

【43~45】

A. 针灸

B. 冲洗

C. 利尿

D. 洗胃

E. 吸氧

43. **眼内污染毒物**时应予

44. 加速**尚未吸收毒物**的排泄应予

45. 加速**已吸收毒物**的排泄应予

【46~47】

A. 双解磷

B. 亚硝酸钠

C. 盐酸烯丙吗啡

D. 谷胱甘肽

E. 乙酰胺

46. 主要用于**丙烯腈、氟化物、一氧化碳**等中毒解救是  

47. 主要用于**吗啡、哌替啶急性中毒**解救的是  

【48~49】



A. 氯霉素

B. 链霉素

C. 洋地黄毒苷

D. 地高辛

E. 青霉素

48. **肝病**患者合并**心功能不全**使用强心药时应选用  

49. **肝病**患者合并**痢疾、伤寒**时使用何种药物需密切观察**血象变化**  

(2017 年真题)【50~52】

A. 双眼

B. 左耳

C. 左眼

D. 右耳

E. 右眼

50. 处方中外文缩写 **DD** 代表

51. 处方中外文缩写 **DU** 代表

52. 处方中外文缩写 **DS** 代表

【53~55】

A. 可出现面部潮红、心慌、头痛

B. 可出现室性心动过速

C. 可诱发哮喘

D. 可致耳聋

E. 可致头晕、口干、嗜睡

53. 老年人应用**普萘洛尔**

54. 老年人同时应用**庆大霉素与利尿剂**

55. 老年人应用**胺碘酮**

【56~58】

A. 镇咳药

B. 镇痛药

C. 抗感冒药

D. 扩张血管药

E. 利尿药

56. 可使驾驶员出现**定向力障碍**的药物是

57. 可导致驾驶员**多尿或多汗**的药物是

58. 可使驾驶员出现**眩晕或幻觉**的药物是

【59~61】

A. 诊断痛风

B. 诊断心肌梗塞

C. 诊断消化性溃疡



D. 诊断急性胰腺炎

E. 诊断红细胞增多症

血液生化检查结果的临床意义

59. **淀粉酶**检查超过正常值  

60. **尿酸**检查超过正常值  

61. **肌酸激酶**检查超过正常值  

(2017 年真题)【62~64】

A. 阿托品 + 碘解磷定

B. 氟马西尼

C. 硫代硫酸钠

D. 乙酰半胱氨酸

E. 纳洛酮

62. **有机磷中毒**的解救药物是

63. **地西洋中毒**的解救药物是

64. **阿片类药物中毒**的解救药物是

【65~68】

A. 阿司匹林

B. 叶酸

C. 阿托伐他汀

D. 呋塞米

E. 布地奈德

65. 对合并**同型半胱氨酸血症**的高血压患者提倡联合应用

【举一 反三】

66. **可逆转动脉粥样硬化** 对合并 **缺血性** 心脏病的高血压患者提倡联合应用

【举一 反三】

67. 对合并**血栓高危**的高血压患者 为进行一、二级预防提倡联合应用

【举一 反三】

68. 对**高血压肾病** 患者在应用 **血管紧张素转换酶抑制剂** 的基础上联合应用

【举一 反三】

【69~71】

A. 缬沙坦

B. 美托洛尔

C. 利血平

D. 氢氯噻嗪

E. 赖诺普利

69. 适用于高血压合并**糖尿病、肾损害**患者的药物是

70. 适用于高血压合并**心绞痛**患者的药物是

71. 适用于**老年高血压**合并**心力衰竭**患者的药物是

【72~75】

A. 心脏

B. 脑

C. 肾脏

D. 肺

E. 血管和视网膜

72. 致**脑动脉痉挛** 发生**头痛、呕吐、情绪激动**属于

73. 导致**动脉粥样硬化、眼底出血**等情况属于

74. 可出现**液尿增多、代谢性酸中毒**等属于

75. 血压升高加重心脏负荷 引起**心律失常、冠心病**等属于

【2017年真题】【76~78】

A. 维A酸片

B. 左旋多巴片

C. 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

D. 非洛地平片

E. 去氨加压素片

76. **高蛋白饮食**在肠内产生氨基酸 会影响其吸收,降低疗效的药物是

77. 与葡萄柚汁同服可**提高生物利用度**的药物是

【举一 反三】

78. **高脂饮食**可促进其吸收的药物是

【举一 反三】

【79~82】

A. 氯霉素

B. 米诺环素

C. 阿奇霉素

D. 左氧氟沙星

E. 庆大霉素

79. 可导致**牙齿黄染及牙釉质**发育不全的药物是

80. 可导致**动物承重关节**发育不良的药物是

81. 可导致**耳蜗神经损伤及耳毒性**的药物是

82. 因体内**肝酶不足** 易发生**灰婴综合征**的药物是

【83~85】

A. 骨髓抑制

B. 呼吸抑制、体温过低及进食不佳

C. 免疫机制改变

D. 惊厥

E. 甲状腺功能受抑制

83. 乳母应用**他巴唑**可致婴儿出现

84. 乳母应用**卡那霉素**可致婴儿出现

85. 乳母应用**吲哚美辛**可致婴儿出现

【86~87】

A. 四环素

B. 红霉素

C. 青霉素

D. 氯霉素

E. 头孢唑林

86. 易于在乳汁中排出的**弱碱性**抗生素是

87. 不易于在乳汁中排出的**弱酸性**抗生素是

【2017年真题】【88~90】

A. 复方磺胺甲噁唑

B. 头孢克洛

C. 诺氟沙星

D. 阿莫西林

E. 华法林

88. 老年人因**血浆蛋白含量低** 用药后游离药物浓度可能明显增加的药物是

89. 可分泌到乳汁中 引起**新生儿黄疸**的药物是

90. 可能影响**儿童骨骼发育**的药物是

三、综合分析选择题

(一)

【91~93】

患者 男 33岁 因胃痛前来就诊 患者自述每次餐后1h左右会有胃痛感 之后会逐渐缓解 近期排便发现大便呈黑色 经医生问诊得知 患者平时工作应酬繁忙 进餐时间不规律 经临床检查 **幽门螺杆菌阴性** 又经胃镜检查后确诊为**胃溃疡**

91. 对于Hp阴性的胃溃疡 治疗方案是

