

中药学综合知识与技能

1. 执业药师的基本技能是指在提供药学服务的各个环节所必须具备的专业技术方法与工作能力。不属于执业药师基本技能的是 (E)
 - A. 处方审核
 - B. 处方调剂
 - C. 处方点评
 - D. 用药咨询
 - E. 药品配送
2. 系统整理南北朝以前中药学资料的本草著作是 (C)
 - A. 《神农本草经》
 - B. 《雷公炮风论》
 - C. 《本草经集注》
 - D. 《重修政礼本草》
 - E. 《本草纲目》
3. “壮水之主，以制阳光”治法的适应证是 (B)
 - A. 阳虚
 - B. 阴虚
 - C. 阳盛
 - D. 阴盛
 - E. 阴阳两虚
4. 中医学称为“刚脏”的是 (A)
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
5. 某女，41岁。近日因家事而情志抑郁，乳房胀痛，胃胀痞满，暖气频作，月经延后；舌淡红苔白，脉弦。根据藏象理论，其病机是 (B)
 - A. 心主血脉功能失常
 - B. 肝主疏泄功能失常
 - C. 脾主运化功能失常
 - D. 肺主气功能失常
 - E. 肾藏精功能失常
6. 易于生风动血的外邪是 (E)
 - A. 风邪
 - B. 寒邪
 - C. 湿邪

- D. 暑邪
- E. 火邪

7. 头晕耳鸣，视物旋转，闭目可缓解，恶心呕吐；舌苔白腻，脉濡，其临床意义是（B）

- A. 阴虚阳亢
- B. 痰浊中阻
- C. 心脾两虚
- D. 风火上扰
- E. 肾精不足

8. 并开药名是指将 2~3 种疗效相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的处方名称。“炒三仙”调配时应给付的饮片是（B）

- A. 炒神曲、炒谷芽、炒山楂
- B. 炒神曲、炒麦芽、炒山楂
- C. 炒神曲、炒麦芽、炒稻芽
- D. 炒麦芽、炒谷芽、炒稻芽
- E. 炒稻芽、炒麦芽、炒山楂

9. 青光眼患者禁用的中药是（D）

- A. 闹羊花
- B. 白附子
- C. 马钱子
- D. 洋金花
- E. 千金子

10. 某女，45 岁。心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒；舌红少津，脉细数。应采用的治法是（C）

- A. 补血养心，益气安神
- B. 温补心阳，安神定悸
- C. 滋阴清火，养心安神
- D. 活血化瘀，理气通络
- E. 化气行水，宁心安神

11. 血清肌钙蛋白 | (cTnI) 增高的临床意义是 (A)

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性肾衰竭
- D. 急性脑梗死
- E. 急性胃肠炎

12. 中药传统养护技术对抗贮存法是采用两种或两种以上药物同贮，相互克制，起到防止虫蛀、霉变作用的养护方法。采用对抗贮存法养护蛤蚧时，可同贮的中药饮片是（D）

- A. 牡丹皮
- B. 大蒜

- C. 细辛
- D. 花椒
- E. 冰片

13. 维吾尔药的药性,系指根据药物作用于机体后发生的不同反应和疗效而决定的药物属性。不属于维吾尔药药性的是(E)

- A. 热
- B. 湿
- C. 寒
- D. 干
- E. 凉

14. 中药饮片正名是规范化的饮片名称,除正名以外的名称为别名。“青果”的别名是(B)

- A. 西青果
- B. 橄榄
- C. 诃子
- D. 使君子
- E. 玉果

15. 中药汤剂煎药量应当根据儿童和成人分别确定。儿童每剂汤药一般煎药量为(B)

- A. 50~100ml
- B. 100~300ml
- C. 200~400ml
- D. 300~500ml
- E. 400~600ml

16. 某男,57岁。小便不通或点滴不爽,排出无力,腰膝酸软,畏寒肢冷;舌淡胖苔薄白,脉沉细。诊断为癃闭,证属肾阳衰惫。宜选用的中成药是(B)

- A. 癃清片
- B. 济生肾气丸
- C. 前列通片
- D. 癃闭舒胶囊
- E. 前列通瘀胶囊

17. 某男,48岁。诊断为原发性肝癌,证属瘀毒内结、正虚邪实。予以艾迪注射液100ml+5%葡萄糖注射液250ml静脉滴注,一日1次。药师审核处方的问题是(D)

- A. 药证不符
- B. 给药方式不当
- C. 超剂量使用
- D. 溶媒用量不足
- E. 溶媒选用不当

18. 某男,75岁。近1月余,耳鸣如蝉,昼夜不息,安静时尤甚,听力逐渐下降,伴有腰膝酸软,头晕目眩,偶有虚烦失眠,夜尿频多;舌淡红少苔,脉细弱。宜选用的基础方剂是(D)

- A. 天王补心丹
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 益气聪明汤
- D. 耳聋左慈丸
- E. 人参养荣汤

19. 某女，35岁。头身困重，脘腹胀满，食纳减少，便溏稀薄，带下色白；舌淡红苔白腻，脉迟缓。辨析其证候是（A）

- A. 寒湿困脾
- B. 脾气虚
- C. 脾虚下陷
- D. 脾阳虚
- E. 脾胃湿热

20. 罂粟壳按照麻醉药管理，属于特殊管理的中药饮片。关于中药饮片罂粟壳用法用量及调配管理的说法，正确的是（A）

- A. 连续使用罂粟壳不得超过7天，处方保存3年备查
- B. 处方书写罂粟壳时，应给付生罂粟壳
- C. 罂粟壳的成人一次常用量为每天3~9g
- D. 罂粟壳必须凭具有麻醉药处方权的执业医师签名的淡黄色麻醉药处方方可调配
- E. 罂粟壳应与群药一起调配，不得单方发药，每张处方不得超过二日用量

21. 对于临床复杂的病情，常需要选择两种或两种以上的中成药联合应用，以取得更好的疗效。下列不宜联合使用的中成药是（C）

- A. 二陈丸和平胃散
- B. 附子理中丸和四神丸
- C. 大活络丸和天麻丸
- D. 乌鸡白凤丸和香砂六君丸
- E. 金匱肾气丸和生脉散

22. 某男，58岁。腰脊酸软，尿后余沥，小便频数，滑精早泄，听力减退；舌淡苔白，脉细弱。辨析其证候是（C）

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 肾气不固
- D. 肾精不足
- E. 心肾不交

23. 某女，35岁。自觉咽喉部不适，常感咽部干燥，微痛，干痒，灼热，有异物感，干咳少痰，伴颧红潮热，耳鸣多梦；舌红苔少，脉细数。宜选用的中成药是（D）

- A. 清咽利膈丸
- B. 六神丸
- C. 板蓝根颗粒
- D. 知柏地黄丸

E. 金嗓开音丸

24. 某男，59岁。腰痛日久，酸软无力，缠绵不愈，局部发凉，喜温喜按，遇劳更甚，卧则减轻，少腹拘急，面色晄白，头晕耳鸣，肢冷畏寒；舌淡，脉沉细无力。宜选用的基础方剂是（B）

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 四妙丸
- D. 四逆散
- E. 乌头汤

25. 某男，1岁。食欲不振，噎腐酸馊，偶见呕吐食物，脘腹胀满，大便酸臭，夜眠不安，手足心热；舌红苔黄厚腻，指纹紫滞。应采用的治法是（E）

- A. 健脾助运，消食化滞
- B. 健脾益气，清热通腑
- C. 和胃消食，清化湿热
- D. 健脾益气，佐以助运
- E. 消乳化食，和中导滞

26. 某男，45岁。5年前从高处坠落导致头部外伤，虽经积极治疗，仍遗留头痛，痛处固定，如刺如锥；舌紫暗，边有瘀点，苔薄白，脉细涩。辨析其证候是（B）

- A. 风寒头痛
- B. 瘀血头痛
- C. 风热头痛
- D. 肝阳头痛
- E. 血虚头痛

27. 某男，62岁。阳痿不举，失眠多梦，神疲乏力，食少纳呆，腹胀便溏；舌苔薄白，脉细弱。宜采用的治法是（E）

- A. 温肾助阳
- B. 益肾宁神
- C. 疏肝解郁
- D. 补肾疏肝
- E. 补益心脾

28. 中药饮片的剂量往往因疾病种类、病情轻重、用药目的不同而呈现不同特征。关于白芍使用目的与剂量的说法，正确的（A）

- A. 用于缓急止痛时，用量偏大
- B. 用于平抑肝阳时，用量偏小
- C. 用于平抑肝阳时，用量偏大
- D. 用于柔肝健脾时，用量中等
- E. 用于缓急止痛时，用量中等

29. 某男，60岁。胃癌晚期，胃脘刺痛，倦怠乏力，不欲饮食，噎气呕恶，身体消瘦；舌有

瘀点，脉弦细弱。应采用的治疗原则是 (D)

- A. 扶正
- B. 祛邪
- C. 祛邪为主兼以扶正
- D. 先扶正后祛邪
- E. 先祛邪后扶正

30. 中医遣方时正确应用中药的不同炮制品有利于提高临床疗效。关于方剂选用中药炮制品的说法，错误的是 (E)

- A. 越鞠丸行气解郁，方中香附宜选用生品
- B. 如圣散固涩止血，方中干姜宜烧灰存性
- C. 血府逐瘀汤活血行气，方中枳壳宜选生品
- D. 温脾汤温阳攻下，方中大黄宜选用生品
- E. 十灰散凉血止血，方中大蓟宜选用生品

31. 关于中药饮片鸦胆子不良反应表现及机制的说法，错误的是 (E)

- A. 内服可引起患者胃肠道充血
- B. 外用可引起患者皮肤过敏反应
- C. 鸦胆子苷、双氢鸦胆子苷是其毒性成分
- D. 其水溶性苦味成分为剧烈的细胞原浆毒
- E. 其水溶性苦味成分对皮肤和黏膜有强烈的刺激性

32. 药物有升降浮沉的药性，治法亦有升降浮沉的因势利导，参合两者即为升降浮沉配伍。下列不属于升降浮沉配伍的是 (E)

- A. 交通心肾
- B. 升阳散火
- C. 釜底抽薪
- D. 固涩止汗
- E. 辛甘化阳

33. 某女，32岁。月经周期延后，量少，色淡红，质黏稠，头晕，心悸气短，脘闷恶心，口腻多痰，带下量多黏腻；舌淡胖苔白腻，脉滑。宜选用的基础方剂是 (A)

- A. 芎归二陈汤
- B. 归肾丸
- C. 乌药汤
- D. 归脾汤
- E. 大补元煎

34. 胃脘疼痛，口中泛酸，嗳气则舒，其临床意义是 (C)

- A. 肝胆实热
- B. 脾胃湿热
- C. 肝胃蕴热
- D. 脾虚不运
- E. 食积内停

35. 某女，49岁。近半年经常寐中汗出，醒后汗止，时有自汗，口渴咽干，五心烦热，两颧色红；舌红少苔，脉细数。宜选用的基础方剂是（A）

- A. 当归六黄汤
- B. 归脾汤
- C. 玉屏风散
- D. 逍遥散
- E. 龙胆泻肝汤

36. 某男，56岁。咳嗽反复发作，咳声重浊，痰黏色白，胸闷脘痞，食少体倦，大便时溏。诊断为咳嗽，辨析其证候是（A）

- A. 痰湿蕴肺
- B. 风寒袭肺
- C. 风燥伤肺
- D. 风热犯肺
- E. 痰热郁肺

37. 某女，28岁。经期小腹灼热胀痛，拒按，经色暗红，质稠有块；平素带下量多，色黄，时常伴经前低热，小便色黄；舌红苔黄腻，脉滑数。辨析其证候是（C）

- A. 气滞血瘀
- B. 寒凝血瘀
- C. 湿热瘀阻
- D. 气血虚弱
- E. 肝肾亏虚

38. 具有促进其他药物透过血脑屏障作用的中药是（C）

- A. 丹参
- B. 白芷
- C. 冰片
- D. 羌活
- E. 银杏叶

39. 某女，27岁。产后2个月，乳房肿胀疼痛，皮色微红，伴恶寒发热，周身酸楚口渴，便秘；舌红苔薄，脉数。宜选用的中成药是（B）

- A. 牛黄解毒丸
- B. 活血解毒丸
- C. 乳核散结片
- D. 乳疾灵颗粒
- E. 当归苦参丸

40. 中药归经配伍可以使药效更加集中于某一经络、某一脏腑上，从而提高临床疗效可作为手少阴引经药的是（A）

- A. 细辛
- B. 独活

- C. 升麻
- D. 川芎
- E. 藁本

[41-43]

- A. 石韦散
- B. 小蓟饮子
- C. 八正散
- D. 程氏萆分清饮
- E. 沉香散

41. 某女，40岁。每因郁怒之后，小便涩滞，淋漓不宣，少腹胀满疼痛；舌苔薄白脉弦。宜选用的基础方剂是（E）

42. 某女，28岁。小便频数短涩，尿色黄赤，少腹急胀痛，腰痛拒按，大便秘结；舌红苔腻，脉滑数。宜选用的基础方剂是（C）

43. 某男，40岁。小便浑浊如米泔水，尿时热涩疼痛，口干；舌红苔黄腻，脉濡数。宜选用的基础方剂是（D）

[44-46]

- A. 肝郁血热
- B. 瘀血阻络
- C. 气阴两虚
- D. 肾阳不足
- E. 气血两虚

44. 某女，36岁。月经出血量多，色淡，淋漓不尽，面色无华，气短懒言，食欲不振，大便溏泄；舌淡苔薄白，脉细弱。诊断为崩漏，辨析其证候是（E）

45. 某女，29岁。月经经血非时而下，量时多时少，时出时止，淋漓不断，经色暗有血块；舌紫暗苔薄白，脉涩。诊断为崩漏，辨析其证候是（B）

46. 某女，43岁。月经提前，量多，经色深红，质稠，有血块，少腹胀痛，口苦咽干；舌红苔薄黄，脉弦数。诊断为月经先期，辨析其证候是（A）

[47~48]

- A. 少阴头痛
- B. 太阳头痛
- C. 厥阴头痛
- D. 少阳头痛
- E. 阳明头痛

47. 根据经脉分布，以确定病位所在，两侧头痛，所属的是（D）

48. 根据经脉分布，以确定病位所在，前额部疼痛所属的是（E）

[49~50]

- A. 人参归脾丸
- B. 中满分消丸
- C. 加味保和丸

D. 桂附理中丸

E. 人参健脾丸

49. 某男，67岁。大便时溏时泻，水谷不化，泄泻多在黎明之前，腹痛喜暖，伴面色萎黄，肢倦乏力，形寒肢冷，腰膝酸软；舌淡苔白，脉迟弱。宜选用的中成药是（D）

50. 某女，72岁。大便时溏时泻，水谷不化，稍进油腻食物即泻，迁延反复，纳食减少，食后脘闷不舒，伴面色萎黄，神疲肢倦，乏力；舌淡苔白，脉细弱。宜选用的中成药是（E）

51-52

A. 异功散

B. 养胃增液汤

C. 不换金正气散

D. 保和丸

E. 良附丸

51. 某男，3岁，纳食减少，口渴欲饮，饮水较多，皮肤失润，烦躁少寐，手足心热，大便偏干，小便短黄；舌红少津，苔花剥，脉细数。宜选用的基础方剂是（B）

52. 某女，4岁。平日身体瘦弱，不思进食，食不知味，面色少华，神倦乏力，多汗，大便溏薄，多见不消化食物；舌淡苔薄白，脉缓无力。宜选用的基础方剂是（A）

53~55

A. 阴凉、通风处

B. 密闭、阴凉处

C. 阴凉、干燥处

D. 通风、干燥处

E. 密封、凉暗处

53. 含淀粉多的药材和饮片，如天麻、山药、粉葛等，应贮于（D）

54. 含挥发油多的药材和饮片，如薄荷、当归、川芎等，应贮于（C）

55. 含糖分及黏液质较多的饮片，如肉苁蓉、熟地黄、天冬等，应贮于（D）

56~58

A. 复方罗布麻颗粒

B. 仙灵骨葆胶囊

C. 珍菊降压片

D. 维C银翘片

E. 雷公藤多苷片

根据临床相关不良反应报告

56. 可能引起恶心、呕吐、皮疹、瘙痒、腹痛、腹泻、腹胀、心悸、胸闷、肝功能异常等不良反应的中成药是（B）

57. 可能引起全身皮疹伴瘙痒、严重荨麻疹、间质性肾炎、白细胞减少、溶血性贫血、过敏性休克等不良反应的中成药是（D）

58. 可能引起低钾血症、低氯血症、低钠血症、肾功能异常、心前区疼痛、心律失常、白细胞减少等不良反应的中成药是（C）

59~61

- A. 自汗漏汗
- B. 凶门迟闭
- C. 恶心呕吐
- D. 畏寒肢冷
- E. 易于感冒

59. 气的推动作用失常，可见的症状是 (B)
60. 气的固摄作用失常，可见的症状是 (A)
61. 气的温煦作用失常，可见的症状是 (D)

62~64

- A. 清法
- B. 吐法
- C. 温法
- D. 下法
- E. 消法

62. 针对气滞血瘀痰凝等所致的癥积痞块证，应采用的治法是 (E)
63. 针对水饮痰湿瘀血等停留体内的里实证，应采用的治法是 (D)
64. 针对误食毒物，为时不久，毒物尚在胃脘的实证，应采用的治法是 (B)

65~66

- A. 阴阳两虚
- B. 气虚
- C. 津液亏虚
- D. 血虚
- E. 气血两虚

65. 某男，77岁。头昏神疲，语声低微，自汗，肢体无力；舌淡苔薄白，脉虚无力。辨析其病机是 (B)
66. 某女，49岁。形体消瘦，口干咽燥，不欲饮水；舌光红无苔，脉细数。辨析其病机是 (C)

67~68

- A. 寒痰
- B. 湿痰
- C. 风痰
- D. 热痰
- E. 燥痰

67. 痰少而黏难咳者，多属 (E)
68. 痰多色黄黏稠者，多属 (D)

69~71

- A. 牡丹皮
- B. 代代花
- C. 苦杏仁
- D. 地榆炭

E. 桃仁

按照传统斗谱编排的基本原则

69. 宜放置在斗架下层的饮片是 (D)

70. 宜放置在斗架高层的饮片是 (B)

71. 生品入煎剂应后下的饮片是 (C)

72~73

A. 小青龙汤与抗组胺药联用

B. 含鞣质较多的中成药与铁剂联用

C. 五味子糖浆与磺胺类药联用

D. 逍遥散与催眠镇静类药联用

E. 含乙醇的中成药与硝酸甘油联用

72. 中西药合理联用可起到协同增效作用的是 (D)

73. 中西药合理联用可起到降低西药不良反应作用的是 (A)

74~76

A. 焦三仙煎汤

B. 蜂蜜冲水

C. 鲜芦根煎汤

D. 生姜煎汤

E. 黄酒或白酒

74. 至宝锭常用的药引是 (A)

75. 银翘解毒丸常用的药引是 (C)

76. 通宣理肺丸常用的药引是 (D)

77~78

A. 心脾两虚

B. 心肾不交

C. 痰热扰心

D. 心胆气虚

E. 肝火扰心

77. 某女, 40岁。虚烦不眠, 触事易惊, 心悸气短, 自汗乏力; 舌淡, 脉弦细。诊断为不寐, 辨析其证候是 (D)

78. 某女, 35岁。入睡困难, 甚则彻夜不眠, 急躁易怒, 头晕头胀, 目赤耳鸣, 口干而苦, 便秘溲赤; 舌红苔黄, 脉弦而数。诊断为不寐, 辨析其证候是 (E)

79~80

A. 耗气伤津

B. 善行数变

C. 易发肿疡

D. 凝滞主痛

E. 黏滞重浊

79. 寒邪的性质与致病特点是 (D)

80. 湿邪的性质与致病特点是(E)

81~83

- A. 心脾两虚
- B. 心气虚
- C. 心肺气虚
- D. 心血虚
- E. 心肾不交

81. 某女, 50岁。心悸怔忡, 失眠多梦, 健忘, 食少便溏, 倦怠乏力; 舌淡嫩, 脉细弱。辨析其证候是(A)

82. 某男, 45岁。心悸健忘, 头晕耳鸣, 虚失眠, 潮热盗汗, 时有梦遗; 舌淡红无苔, 脉细数。辨析其证候是(E)

83. 某女, 37岁。心悸心烦, 失眠健忘, 眩晕, 面色无华; 舌淡少苔, 脉细弱。辨析其证候是(D)

84~85

- A. 温脾汤
- B. 半硫丸
- C. 六磨汤
- D. 麻子仁丸
- E. 黄芪汤

84. 某女, 40岁。体倦乏力, 少气懒言, 每天苦于排便, 大便并不干结, 但排出困难, 用力努挣则汗出短气, 便后乏力更甚; 舌苔淡白脉弱。宜选用的基础方剂是(E)

85. 某女, 36岁。大便干结, 腹胀腹痛, 口臭, 面红心烦, 小便短赤; 舌红苔黄燥, 干滑数, 宜选用的基础方剂是(D)

84~85

- A. 温脾汤
- B. 半硫丸
- C. 六磨汤
- D. 麻子仁丸
- E. 黄芪汤

84. 某女, 40岁。体倦乏力, 少气懒言, 每天苦于排便, 大便并不干结, 但排出困难, 用力努挣则汗出短气, 便后乏力更甚; 舌苔淡白, 脉弱。宜选用的基础方剂是(E)

85. 某女, 36岁。大便干结, 腹胀腹痛, 口干口臭, 面红心烦, 小便短赤; 舌红苔黄燥, 脉滑数, 宜选用的基础方剂是(D)

86~88

- A. 九味羌活丸
- B. 风湿定片
- C. 痹痛宁胶囊
- D. 腰痹通胶囊
- E. 益肾蠲痹丸

86. 因含寻骨风，肾功能不全患者禁用的中成药是(E)

87. 因含马钱子，不可过量、久服的中成药是(C)

88. 因含熟地黄，脾虚便溏患者慎用的中成药是(D)

89-90

A. 速效救心丸

B. 益心舒胶囊

C. 丹蒺片

D. 冠心苏合滴丸

E. 活心丸

89. 胸闷，心前区刺痛，心悸，气短，乏力，舌紫，脉细。宜选用的中成药是(E)

90. 胸闷隐痛，心悸气短，动则汗出，头晕乏力，心烦失眠，面色不华，舌淡红有瘀斑苔少，脉结。宜选用的中成药是(B)

某男，17岁，皮肤大片风团，色红，瘙痒剧烈，伴有脘腹疼痛，暖气恶心，神疲纳呆，大便秘结；舌红苔薄黄，脉弦滑数。诊断为瘾疹。

91. 应采用的治法是(B)

A. 疏风散寒止痒

B. 疏风解表，通腑泄热

C. 养血祛风，润燥止痒

D. 疏风清热止痒

E. 清热凉血，祛风止痒

92. 宜选用的中成药是(B)

A. 荆肤止痒颗粒

B. 防风通圣丸

C. 皮敏消胶囊

D. 消风止痒颗粒

E. 润燥止痒胶囊

某男，52岁。肥胖，嗜好烟酒。胁肋重着疼痛，口苦口黏，胸闷纳呆，小便色黄，大便不爽；舌红苔黄腻，脉弦滑数。超声检查结果提示中度脂肪肝。血生化检验结果：总胆固醇8.2mmol/L，三酰甘油(甘油三酯)3.5mmol/L，高密度脂蛋白0.45mmol/L，低密度脂蛋白7.1mmol/L，血清总蛋白55g/L。

93. 与脂肪肝发病关系密切的检验指标是(D)

A. 高密度脂蛋白

B. 总胆固醇

C. 低密度脂蛋白

D. 三酰甘油

E. 血清总蛋白

94. 中医诊断为胁痛，证属肝胆湿热，宜选用的基础方剂是(D)

A. 柴胡疏肝散

B. 血府逐瘀汤

C. 一贯煎

D. 龙胆泻肝汤

E 逍遥散

某女，68岁。素患缺铁性贫血，常规口服硫酸亚铁片治疗。本次因失眠就诊，症见不寐，心悸易惊，多梦，健忘，神疲乏力；舌淡苔白，脉细弱。医师处方柏子养心丸（水蜜丸），口服，一次6g，一日2次。

95. 执业药师审核，认为处方不合理，其原因是（A）

- A. 柏子养心丸含朱砂，不能与还原性铁剂同服
- B. 柏子养心丸的用法用量错误
- C. 柏子养心丸含铁落，与硫酸亚铁同用，属于重复用药
- D. 柏子养心丸的主治病证与患者的临床表现不一致
- E. 柏子养心丸不宜用于不寐合并缺铁性贫血的患者

96. 医师根据执业药师审方建议，更换处方药品为乌灵胶囊。原不合理处方中用药错误的分级是（A）

- A. B级
- B. A级
- C. C级
- D. D级
- E. E级

97. 患者家中备有健脾生血片，欲加服，执业药师给予建议，正确的是（C）

- A. 健脾生血片健脾和胃、养血安神，病证相符，可以同用
- B. 健脾生血片含叶酸，有利于贫血治疗，可以同用
- C. 健脾生血片含硫酸亚铁，属于重复用药，不宜同用
- D. 健脾生血片含维生素B12有利于贫血治疗可以同用
- E. 健脾生血片慎用于缺铁性贫血患者，不宜同用

某男，81岁。患消渴病20年，小便频数，甚则饮一溲一，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷；舌白少津，脉沉细无力。

98. 四诊合参，辨析其证候是（B）

- A. 气阴两虚
- B. 阴阳两虚
- C. 肾阴亏虚
- D. 脾胃气虚
- E. 阴虚燥热

99. 根据辨证，宜选用的中成药是（B）

- A. 麦味地黄丸
- B. 金匱肾气丸
- C. 人参固本丸
- D. 补中益气丸
- E. 知柏地黄丸

100. 患者在服用上述中成药期间，应注意的问题是（C）

- A. 该药含有黄柏，不宜联用寒凉药
- B. 该药含有人参，不宜食白萝卜
- C. 该药含有附子，不可过量久服
- D. 该药含有黄芪，若腹胀应停用
- E. 该药含有麦冬，若腹泻应停用

101. 服药 1 个月上述症状缓解，停药后，近日又见溺痛，不甚赤涩，但淋漓不已，时作时止，遇劳即发，腰膝酸软，神疲乏力；舌淡，脉细弱。宜选用的中成药是(E)

- A. 萆薢分清丸
- B. 六味地黄丸
- C. 肾炎灵胶囊
- D. 分清五淋丸
- E. 前列回春胶囊

某女，33 岁。浮肿 1 年，腰以下为甚，按之凹陷，不易恢复，脘腹胀闷，纳少，面色不华，神疲乏力，四肢倦怠，畏寒，小便短少，大便溏薄；舌淡苔白腻，脉沉缓。诊断为水肿。

102. 四诊合参，辨析其证候是 (D)

- A. 肾阳虚衰
- B. 湿热壅盛
- C. 水湿浸渍
- D. 脾阳虚衰
- E. 风水相搏

103. 应采用的治法是 (D)

- A. 疏风清热，宣肺行水
- B. 宣肺解毒，利湿消肿
- C. 温肾助阳，化气行水
- D. 温阳健脾，行气利水
- E. 分利湿热，化气行水

104. 宜选用的基础方剂是 (D)

- A. 疏凿饮子
- B. 济生肾气丸
- C. 甘姜苓术汤
- D. 实脾饮
- E. 越婢加术汤

某男，59 岁。近 3 年经常眩晕，头胀头痛，昨日突发口眼喎斜，舌强，语言不利，半身不遂；舌红苔黄，脉弦。诊断为中风。

105. 四诊合参，辨析其证候是(A)

- A. 风阳上扰
- B. 风痰入络
- C. 阴虚风动
- D. 血虚生风
- E. 热极生风

106. 应采用的治法是 (D)

- A. 益气养血，化瘀通络
- B. 补益肝肾，活血化痰
- C. 滋阴清热，祛痰活血
- D. 平肝潜阳，活血通络
- E. 祛风化痰，通络开窍

107. 宜选用的基础方剂是 (D)

- A. 真方白丸子
- B. 血府逐瘀汤
- C. 补阳还五汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 通窍活血汤

某男，28岁。于烈日下工作后，出现高热，汗多，头痛面红，烦躁，小便赤；舌红少津，脉洪大。辨证为阳暑，治以白虎汤（石膏、知母、甘草、粳米）。

108. 执业药师应具有临床思维，能根据临床诊断及方药组成分析处方的合理性。此方体现的治法是 (C)

- A. 清营凉血
- B. 清脏腑热
- C. 清气分热
- D. 清热解毒
- E. 气血两清

109. 此方中知母应选用的炮制品是 (C)

- A. 盐炙品
- B. 酒炙品
- C. 生品
- D. 清炒品
- E. 麸炒品

110. 执业药师告知患者正确的煎服方法是 (A)

- A. 石膏先煎；饭后服
- B. 石膏包煎；饭前服
- C. 石膏包煎；饭后服
- D. 石膏先煎；饭前服
- E. 石膏先煎；空腹服

111. 在疾病的预防中，扶助正气、提高抗病能力应采取的主要方法有 (ABCD)

- A. 重视精神调养
- B. 加强身体锻炼
- C. 注意生活起居
- D. 人工免疫预防
- E. 避免病邪侵害

112. 某男，59岁。胁下积块，固定不移，胀痛拒按；舌边瘀斑苔薄，脉弦。诊断为积聚(肝硬化)，证属气滞血阻，可选用的中成药有(DE)

- A. 和络舒肝胶囊
- B. 慢肝养阴胶囊
- C. 化癥回生片
- D. 肝脾康胶囊
- E. 中华肝灵胶囊

113. 关于妊娠期及哺乳期妇女用药指导的说法，正确的有(ABCE)

- A. 选择临床中使用时间长且安全的药物
- B. 给药时注意从低剂量开始
- C. 注意用药妊娠禁忌
- D. 哺乳期间一天只服用一次的药物，建议早上服用
- E. 对于一天服用多次的药物，建议哺乳后立即给药

114. 根据药性及治疗疾病的不同，药物的服用时间也各不相同。适宜饭前服用的中成药有(BD)

- A. 牛黄清火丸
- B. 六味地黄丸
- C. 保和丸
- D. 参苓白术散
- E. 大山楂丸

115. 某男，26岁。颜面、胸背皮疹红肿疼痛，平日皮肤油腻，伴有口臭，便秘，溲黄；舌红苔黄腻，脉滑数。诊断为粉刺，证属胃肠湿热，可选用的中成药有(ABE)

- A. 消痤丸
- B. 金花消痤丸
- C. 化瘀祛斑胶囊
- D. 当归苦参丸
- E. 清热暗疮片

116. 根据中医“异病同治”理论，多种疾病出现心脾两虚或气血亏虚证候时，可用归脾汤治疗，该类疾病有(ABCD)

- A. 心悸
- B. 不寐
- C. 汗证
- D. 郁证
- E. 喘证

117. 中药处方对饮片的调配、煎法、用法等方面的特殊要求，常以脚注形式体现用时需捣碎的中药饮片有(ACDE)

- A. 丁香
- B. 补骨脂
- C. 川楝子

- D. 五味子
- E. 豆蔻

118. 正治是临床常用的治则，主要治法有(AE)

- A. 以热治寒
- B. 以热治热
- C. 以寒治寒
- D. 以通治通
- E. 以寒治热

119. 可见肾虚证的月经病有(ABCDE)

- A. 月经先期
- B. 月经后期
- C. 月经先后无定期
- D. 月经过少
- E. 崩漏

120. 某男，30岁。感冒后咳嗽，服用安嗽糖浆，因其含有西药成分盐酸麻黄碱避免重复用药，不宜与安嗽糖浆同时服用的中成药有(BCD)

- A. 消痰咳片
- B. 消咳宁片
- C. 镇咳宁糖浆
- D. 良园枇杷叶膏
- E. 化痰平喘片