

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

乡村全科助理医师精选300题

套卷二【151-300题】

金英杰医学教育

151.(A1/A2型题)中风的发病好发年龄为

- A.60岁以上
- B.30岁以上
- C.50岁以上
- D.40岁以上
- E.55岁以上

答案:D

解析:中风的发病特点具有突然昏仆,不省人事,半身不遂,偏身麻木,口舌喎斜,言语蹇涩等特定的临床表现。轻证仅见眩晕,偏身麻木,口眼喎斜,半身不遂等;多急性起病,好发于40岁以上年龄。

152.(A1/A2型题)食物中毒的技术处理总则中,关于对病人采取紧急处理,错误的是

- A.及时报告当地食品卫生监督机构
- B.停止食用中毒食品
- C.采取病人标本以备送检
- D.对病人进行急救治疗
- E.封存中毒食品或疑似中毒食品

答案:E

解析:“封存中毒食品或疑似中毒食品”属于对中毒食品控制处理的范畴。

153.(A1/A2型题)某居室经检测空气中氡含量较高,空气氡最可能来自

- A.房屋地基土壤
- B.吸烟
- C.家用电器
- D.油漆.涂料
- E.燃料燃烧

答案:A

解析:此题暂无解析

154.(A1/A2型题)引起肉毒中毒最多见的食品是

- A.肉制品
- B.鱼制品
- C.自制发酵食品
- D.豆制品
- E.罐头食品

答案:C

解析:引起中毒的食品,种类因地区和饮食习惯不同而异。国内以家庭自制植物性发酵品为多见,如臭豆腐.豆酱.面酱.豆豉等。在新疆察布查尔地区引起中毒的食品多为家庭自制谷类或豆类发酵食品,在青海主要为越冬密封保存的肉制品。在国外,大多也是由各类家庭自制制品引起。

155.(A1/A2型题)蔬菜水果的主要卫生问题不包括

- A.细菌及寄生虫的污染
- B.农药污染
- C.工业废水中有机化学物质的污染
- D.霉菌及霉菌毒素污染
- E.其他有害物质如硝酸盐和亚硝酸盐的污染

答案:D

解析:蔬菜.水果的主要卫生问题:(1)细菌及寄生虫的污染。(2)有害化学物质对蔬菜.水果的污染:①农药污染;②工业废水;③其他有害物质:如蔬菜.水果在不恰当的存放.贮藏或腌制时,亚硝酸盐的量即可增加。

156.(A1/A2型题)经过净化处理和加氯消毒后,供作生活饮用的水源水,总大肠菌群值不超过

- A.102个/L
- B.103个/L
- C.104个/L
- D.105个/L
- E.106个/L

答案:C

解析:此题暂无解析

157.(A1/A2型题)以下哪项是生物-心理-社会医学模式的特点

- A.理论和方法简单,易于掌握
- B.从系统理论看待人类生命
- C.着重识别疾病的病因
- D.依赖高技术的诊疗手段
- E.片面.封闭

答案:B

解析:此题暂无解析

158.(A1/A2型题)以下哪一项是以病人为中心的医学模式的基本特点

- A.帮助病人建立正确的健康信念模型
- B.进入病人的世界
- C.提高病人的遵医行为
- D.以医生的眼光去看待疾病
- E.提高病人的自我服务能力

答案:B

解析:此题暂无解析

159.(A1/A2型题)下列哪一项属于家庭外资源

- A.环境资源
- B.维护支持
- C.爱的支持
- D.信息和教育
- E.结构支持

答案:A

解析:家庭资源:可分为家庭内资源和家庭外资源。(1)家庭内资源包括:①经济支持:家庭对成员提供的各种金钱、财物的支持;②维护支持:家庭对其成员名誉、地位、权利和健康的维护和支持;③医疗处理:为家人提供及安排医疗照护;④爱的支持:家人对成员的关怀及精神支持,满足家人感情须要;⑤信息和教育:为家人提供医疗信息、建议及家庭内部的健康教育;⑥结构支持:家庭住所或设施的改变,以适应患病成员需求。(2)家庭外资源包括:①社会资源:亲朋好友及社会团体的关怀与支持;②文化资源:文化、传统、习俗教育等方面的支持;③宗教资源:宗教信仰、宗教团体的支持;④经济资源:来自家庭之外的收入、赞助、保险、福利等;⑤教育资源:教育制度、方式、水平等;⑥环境资源:居住区环境、社区设施、公共环境等;⑦医疗资源:医疗保健机构、卫生保健制度及卫生服务的可及性和可用性。当家庭内资源不足或缺乏时,家庭医生应帮助病人及家庭寻找和利用家庭外资源。

160.(A1/A2型题)在以家庭为单位的健康照顾中,家庭的功能不包括

- A.抚养和赡养
- B.家庭教育
- C.满足情感需要
- D.满足生殖和性需要
- E.经济功能

答案:B

解析:家庭的功能包括:抚养和赡养、满足情感需要、满足生殖和性需要、社会化、经济功能、赋予成员地位。二。

161.(A1/A2型题)6岁男孩,发病第1天体温为37.5度,伴咽痛,未予治疗,第2天体温达41度,伴神志恍惚及抽搐。经输液,抗生素等治疗,第3天体温降至38.2度,其体温变化过程

- A.低热→超高热→中等热
- B.中等热→高热→中等热
- C.低热→高热→高热
- D.中等热→超高热→中等热
- E.低热→高热→中等热

答案:E

解析:此题暂无解析

162.(A1/A2型题)发热最常见的原因是

- A.颅脑损伤
- B.变态反应
- C.无菌性坏死物质的吸收
- D.内分泌与代谢障碍
- E.感染

答案:E

解析:根据是否有感染,发热的病因常分为感染性和非感染性两大类,而以感染性更常见。

163.(A1/A2型题)稽留热最常见于下列何种疾病

- A.肺结核
- B.大叶性肺炎
- C.急性肾盂肾炎
- D.疟疾
- E.肠炎

答案:B

解析:稽留热指体温恒定地维持在 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上的高水平,达数天或数周,24小时内体温波动范围不超过 1°C ,常见于大叶性肺炎.斑疹伤寒及伤寒高热期。

164.(A1/A2型题)患者男,食海鲜后20分钟,胸腹部皮肤出现局限性.暂时性.水肿性隆起的皮肤损害,大小不一,形状不定,呈淡红色,此皮损称

- A.风团
- B.丘疹
- C.抓痕
- D.苔藓样变
- E.萎缩

答案:A

解析:风团是真皮浅层水肿性.暂时性.局限性.隆起性损害,皮损可呈淡红色或苍白色,大小不一,形态不规则,周围有红晕,常突然发生,短时间内消退,消退后不留痕迹,自觉剧痒,最常见于荨麻疹。故选A。

165.(A1/A2型题)有关风团的描述错误的是

- A.风团是水肿性隆起的损害
- B.伴剧烈瘙痒
- C.消退后不留痕迹
- D.常突发,短时间内可消退
- E.风团又称风疹

答案:E

解析:此题暂无解析

166.(A1/A2型题)下列属于继发性皮疹的是

- A.斑
- B.丘疹
- C.结节
- D.风团
- E.鳞屑

答案:E

解析:此题暂无解析

167.(A1/A2型题)疥疮的好发部位是

- A.头颈部
- B.四肢
- C.掌跖

D.指缝

E.背部

答案:D

解析:指缝.外生殖器好发+夜间剧烈瘙痒+隧道和丘疱疹,提示疥疮。

168.(A1/A2型题)糜烂与溃疡的区别是皮损的

A.形态不同

B.部位不同

C.大小不同

D.颜色不同

E.深浅不同

答案:E

解析:此题暂无解析

169.(A1/A2型题)急性渗出性湿疹忌用哪种剂型

A.油剂

B.粉剂

C.软膏

D.糊剂

E.洗剂

答案:C

解析:皮疹急性期忌用软膏或有刺激性药物。故选C。二。

170.(A1/A2型题)肾性水肿易出现于

A.眼睑.颜面

B.胸腔.腹腔

C.胫前.足踝

D.背部.骶部

E.阴囊.会阴

答案:A

解析:水肿首先发生在组织疏松的部位,如眼睑或颜面部.足踝部,以晨起为明显,严重时涉及下肢及全身。肾性水肿的性质是软而易移动,临床上呈现凹陷性浮肿,即用手指按压局部皮肤可出现凹陷。心源性水肿从足部等低垂部位开始,逐渐向上延及全身。故本题选A。

171.(A1/A2型题)局限性水肿常见于

A.心力衰竭

B.肝硬化

C.肾病综合征

D.局部静脉回流受阻

E.血管神经性水肿

答案:D

解析:此题暂无解析

172.(A1/A2型题)下列哪项可引起局部水肿

- A.右心衰竭
- B.丝虫病
- C.营养不良
- D.肾病综合征
- E.肝硬化

答案:B

解析:此题可用排除法, A引起心源性水肿, C引起营养不良性水肿, D引起肾源性水肿, E引起肝源性水肿, 均属于全身性水肿。故选B。

173.(A1/A2型题)一全身性水肿患者, 下列哪项原因可不予考虑

- A.心力衰竭
- B.肾衰竭
- C.晚期肝硬化
- D.甲状腺功能减退

答案:D

解析:此题暂无解析

174.(A1/A2型题)下面关于呼吸困难的表述说法错误的是

- A.呼吸困难往往有呼吸频率、节律和幅度的改变
- B.COPD后期出现劳力性呼吸困难
- C.混合型呼吸困难的发病机制为小气道狭窄和肺泡弹性回缩力下降
- D.心源性呼吸困难最常见的原因慢性充血性心力衰竭
- E.Fallot四联症患者常常蹲踞位以缓解呼吸困难

答案:C

解析:混合性呼吸困难的主要发生机制为气体交换面积减少、弥散功能下降等换气功能障碍。

175.(A1/A2型题)女65岁, 近3年来常于餐后平躺时出现胸骨后烧灼样疼痛, 口服吗叮啉有效, 最可能是

- A.心绞痛
- B.胸膜炎
- C.胃溃疡
- D.十二指肠溃疡
- E.反流性食管炎

答案:E

解析:此题暂无解析

176.(A1/A2型题)胸痛多在休息时发生, 活动时或转移其注意力可消失, 最可能的诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.急性心包炎
- C.胸膜炎
- D.心脏神经症

E.心绞痛

答案:D

解析:此题暂无解析

177.(A1/A2型题)餐后较久或数餐后呕吐,多见于

A.幽门梗阻

B.幽门管溃疡

C.精神性呕吐

D.胃张力下降

E.食物中毒

答案:A

解析:此题暂无解析

178.(A1/A2型题)呕吐伴上腹部节律性.周期性痛可见于

A.肠钩虫病

B.肝硬化伴食管胃底静脉曲张

C.消化性溃疡

D.流行性出血热

E.遗传性毛细血管扩张症

答案:C

解析:此题暂无解析

179.(A1/A2型题)对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是

A.全程血尿

B.合并尿道刺激症

C.尿潜血阳性

D.肉眼血尿

E.变形红细胞血尿

答案:E

解析:肾小球源性血尿红细胞会变形破碎这是最有意义的鉴别方法。

180.(A1/A2型题)患者,女,40岁,孕2产1,近半年偶有接触性出血。妇科检查:宫颈糜烂面积占宫颈面积1/2,子宫及双侧附件无异常发现。该患者进一步的检查是

A.宫颈刮片检查

B.阴道镜

C.宫腔镜

D.腹腔镜

E.诊断性宫颈锥切术

答案:A

解析:此题暂无解析

181.(A1/A2型题)对增生性脊柱炎描述,错误的是

A.顽固性腰背痛,晨起更重

B.平卧可缓解疼痛

C.好发于50岁以上年龄

D.局部常有压痛

E.又称退行性脊柱炎

答案:D

解析:此题暂无解析

182.(A1/A2型题)对结核性关节炎描述不正确的是

A.儿童与青壮年多见

B.不出现关节畸形

C.伴有低热.盗汗

D.负重大关节易受累

E.有时有窦道形成

答案:B

解析:结核性关节炎以儿童和青壮年多见。负重大.活动多.易受创伤的关节易患结核,其中脊柱最常见。早期症状和体征不明显。活动期常有疲劳.低热.盗汗及食欲下降。晚期关节畸形和功能障碍。如关节旁有窦道形成,常可见有干酪样物质流出。故选B。二。

183.(A1/A2型题)头痛伴癫痫见于

A.偏头痛

B.青光眼

C.三叉神经痛

D.神经功能性头痛

E.脑内寄生虫病

答案:E

解析:此题暂无解析

184.(A1/A2型题)抽搐患者转诊前应检查下列哪项指标后立即转诊

A.呼吸

B.血压

C.血糖

D.脉率

E.意识

答案:C

解析:此题暂无解析

185.(A1/A2型题)患者,女,38岁,近3年时有发作性眩晕,伴耳鸣.听力减退.恶心.呕吐及眼球震颤,每次发作持续3~5天,最可能的诊断是()。

A.迷路炎

B.前庭神经元炎

C.梅尼埃病

D.小脑肿瘤

E.位置性晕厥

答案:C

解析:梅尼埃病以发作性眩晕伴耳鸣、听力减退及眼球震颤为主要特点,严重时可能伴有恶心、呕吐、面色苍白和出汗,发作多短暂,很少超过2周。具有复发性特点。故选C。

186.(A1/A2型题)眩晕伴听力减退最可能的病因是

- A.前庭神经元炎
- B.梅尼埃病
- C.高血压
- D.晕动症
- E.位置性眩晕

答案:B

解析:此题暂无解析

187.(A1/A2型题)颈动脉窦综合征的特点是

- A.可伴有抽搐
- B.在体位骤变时发生晕厥
- C.晕厥于咳嗽时发生
- D.心率明显加快
- E.血压升高

答案:A

解析:颈动脉窦综合征可表现为发作性晕厥或伴有抽搐。故选A。

188.(A1/A2型题)接近于人事不省的意识状态,患者处于熟睡状态,不易唤醒,在强烈刺激下可被唤醒,但很快又再入睡,称为

- A.嗜睡
- B.意识模糊
- C.昏睡
- D.浅昏迷
- E.深昏迷

答案:C

解析:此题暂无解析

189.(A1/A2型题)确定深昏迷最有价值的体征是

- A.全身深浅反射消失
- B.生命体征有改变
- C.呼之不应
- D.眼球固定
- E.对外界刺激无反应

答案:A

解析:此题暂无解析

190.(A1/A2型题)失眠症患者最常见的主诉是

- A.入睡困难
- B.容易惊醒

- C.早醒
- D.白天想睡
- E.梦魇

答案:A

解析:此题暂无解析

191.(A1/A2型题)有关COPD的外因,错误的是

- A.长期吸烟与慢支发生有密切关系
- B.发病与过敏因素无关
- C.理化因素的慢性刺激为诱因
- D.气候寒冷为发作的重要诱因
- E.感染是慢支发生与发展的重要因素

答案:B

解析:COPD是多种因素长期相互作用的结果:①有害气体和有害颗粒,如香烟、烟雾、粉尘、刺激性气体(二氧化硫、二氧化氮、氯气、臭氧等);理化因素如刺激性烟雾、粉尘、大气污染的慢性刺激,可为慢支的诱发因素。②感染因素:病毒、支原体、细菌等感染是发生发展的重要原因之一。③免疫、年龄和气候等因素均与慢性支气管炎有关,寒冷空气有利于继发感染,老年人呼吸道容易反复感染。④过敏因素与慢支也有一定关系,喘息型慢性支气管炎患者往往有过敏史。

192.(A1/A2型题)慢性阻塞性肺疾病最主要的病理生理特征是

- A.气道结构重塑
- B.肺泡通气量下降
- C.持续性气流受限
- D.明显的肺外效应
- E.肺泡弹性回缩力减退

答案:C

解析:慢性阻塞性肺疾病,简称慢阻肺,是以持续气流受限为特征的可以预防 and 治疗的疾病。

193.(A1/A2型题)患者,男性,45岁。春季反复呼吸困难,咳嗽伴喘息5年。实验检查示:嗜酸性粒细胞增多,血清IgE增高。患者最可能的问题是

- A.过敏性肺炎
- B.支气管哮喘
- C.慢性支气管炎
- D.风湿性心脏病
- E.支气管扩张

答案:B

解析:此题暂无解析

194.(A1/A2型题)女,31岁。反复发作性干咳伴胸闷3年,多于春季发作,无发热、咯血及夜间阵发性呼吸困难,多次胸片检查无异常,常用抗生素治疗效果不明显。无高血压病史。全身体检无阳性体征。为明确诊断首选的检查是

- A.胸部CT

- B.心脏超声波
- C.支气管激发试验
- D.动脉血气分析
- E.纤维支气管镜

答案:C

解析:患者有反复发作的季节性干咳胸闷病史,无胸部感染表现,抗生素无效,故应考虑支气管哮喘可能型。具备以下一项试验阳性对哮喘诊断具有重要意义:①若基础FEV₁(或PEF)<80%正常值,吸入β₂激动剂后FEV₁(或PEF)增加15%以上。②PEF变异率≥20%。③支气管激发试验(或运动激发试验)阳性。所以该患者首选支气管激发试验确定有无哮喘。故选C。

195.(A1/A2型题)在哮喘的药物治疗中,以何种为主导

- A.β受体激动剂
- B.糖皮质激素
- C.免疫抑制剂
- D.肥大细胞膜稳定剂
- E.茶碱类药物

答案:B

解析:此题暂无解析

196.(A1/A2型题)支气管哮喘的主要临床表现是

- A.吸气性呼吸困难伴三凹征
- B.发作性呼吸困难伴窒息感
- C.反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- D.带哮鸣音的混合性呼吸困难
- E.呼吸困难伴哮鸣音

答案:C

解析:此题暂无解析

197.(A1/A2型题)关于支气管哮喘体征,下述哪项不正确

- A.发作时胸部呈过度充气状态
- B.有广泛的哮鸣音
- C.吸气音延长
- D.在轻度哮喘时哮鸣音可不出现
- E.严重哮喘时可出现奇脉

答案:C

解析:此题暂无解析

198.(A1/A2型题)提示支气管哮喘患者病情危重的是

- A.呼气相延长
- B.脉压增加
- C.呼吸性碱中毒
- D.胸腹矛盾运动
- E.烦躁不安

答案:D

解析:此题暂无解析

199.(A1/A2型题)支气管哮喘患儿长期控制治疗首选

- A.M受体阻断剂吸入
- B.抗生素静脉滴注
- C. β_2 受体激动剂吸入
- D.茶碱类(如氨茶碱)静脉滴注
- E.糖皮质激素吸入

答案:E

解析:吸入型糖皮质激素是哮喘长期控制的首选药物,也是目前最有效的抗炎药物,经激素吸入疗法能使哮喘得以缓解的患儿,应继续吸入维持量糖皮质激素,至少6个月~2年或更长时间。故本题应选E。过关键点睛:本题属于记忆性题,需记牢首选的糖皮质激素。

200.(A1/A2型题)男性,25岁学生,近2周来因“备考”较劳累后感觉乏力。今日突发寒颤、发热,咳血1口而就诊。查体:T39°C,右上肺可闻及少许湿??音。WBC $10.8 \times 10^9/L$,N0.85,胸片见右上肺大片状浓淡不均、密度增高阴影。最可能的诊断是

- A.右上肺炎球菌肺炎
- B.右上肺干酪性肺炎
- C.右上肺支原体肺炎
- D.右上肺过敏性肺炎
- E.右上肺癌

答案:A

解析:肺炎链球菌肺炎患者常有受凉淋雨、疲劳、醉酒、精神刺激、病毒感染史,常有口角或鼻周单纯性疱疹。有败血症者,皮肤和黏膜可有出血点。实变时有典型的体征,如叩浊、语颤增强和支气管呼吸音。消散期可闻及湿??音。X线片可见大片实变影。患者符合肺炎链球菌肺炎的临床表现,所以本题选A。

201.(A1/A2型题)男,65岁。间断咳嗽、咳痰5年,1周来因发热、咳黄痰就诊。曾口服“感冒药”和“祛痰药”无明显效果。查体:T38.5°C,口唇略发绀,双下肺可闻及少量湿罗音。为明确诊断,首选的检查是

- A.血气分析
- B.肺功能
- C.痰培养+药敏
- D.胸部X线片
- E.支气管镜

答案:D

解析:此题暂无解析

202.(A1/A2型题)男,21岁。畏寒、高热、咳嗽伴左胸痛5天,查体:BP80/50mmHg,心率120次/分,胸部X线片见左肺下叶大片状致密影。实验室检查:血WBC $12.2 \times 10^9/L$,N0.87,该患者最可能感染的病原体是

- A.肺炎支原体

- B.肺炎链球菌
- C.军团菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.结核枝杆菌

答案:B

解析:此题暂无解析

203.(A1/A2型题)轻症.重症肺炎区别的重要依据是

- A.发热程度
- B.呼吸困难程度
- C.痰液性状
- D.除呼吸系统表现外有其他系统受累的表现
- E.肺部??音的位置

答案:D

解析:此题暂无解析

204.(A1/A2型题)支气管肺炎患儿停用抗生素的时间是抗生素用至体温正常后

- A.1~2天
- B.3~4天
- C.5~7天
- D.8~10天
- E.10~15天

答案:C

解析:支气管肺炎抗生素一般用至体温正常后的5~7天,临床症状、体征消失后3天。葡萄球菌性肺炎易复发及产生并发症,体温正常后继续用药2周,总疗程6周。支原体肺炎至少用药2~3周。故本题选C。

205.(A1/A2型题)女,23岁,工人。发热,干咳1个月,发病时胸部X线片示肺纹理增多,先后使用“青霉素”“头孢菌素”抗感染治疗半月余症状未见好转。查体:T39.8℃,消瘦,双侧颈部可触及多个成串小淋巴结,双肺未闻及干湿??音。PPD试验(一)胸部X线片示双肺弥漫分布直径约2mm的小结节影,该患者最可能的诊断是

- A.真菌性肺炎
- B.病毒性肺炎
- C.过敏性肺炎
- D.急性粟粒性肺结核
- E.细菌性肺炎

答案:D

解析:本例年轻女性,发热,干咳,消瘦,双侧颈部可触及多个成串小淋巴结,胸部X线片示双肺弥漫分布小结节影,使用“青霉素”“头孢菌素”无效,首先考虑为急性粟粒性肺结核。急性粟粒性肺结核起病急,持续高热,中毒症状严重,全身浅表淋巴结肿大,可见由肺尖至肺底的粟粒状结节阴影,直径2mm左右,检查PPD试验多为阴性,本例符合此诊断。细菌性肺炎一般使用青霉素及头孢菌素有效;其他各项胸部X线片均不出现小结节影。

206.(A1/A2型题)男30岁,咳嗽3个月,偶有咳痰带血,乏力,体重下降,无发热,查体双侧颈淋巴结蚕豆大,稍硬,无触痛,右上肺少许湿??音,最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺结核
- C.肺炎
- D.肺脓肿
- E.支气管扩张

答案:B

解析:此题暂无解析

207.(A1/A2型题)肺结核大咯血最主要的致死原因是

- A.失血性休克
- B.重度贫血
- C.窒息
- D.心力衰竭
- E.呼吸衰竭

答案:C

解析:肺结核是咯血常见病因,其发生率占20%~90%。当肺结核空洞腔内动脉瘤破裂时,则可引起大咯血,甚至因大咯血而窒息死亡。故选C。

208.(A1/A2型题)关于抗结核药物副作用下列哪条是错误的

- A.异烟肼:肝功损害
- B.利福平:肝功损害
- C.吡嗪酰胺:肝功损害.肾功损害
- D.链霉素:耳鸣耳聋
- E.乙胺丁醇:视神经炎

答案:C

解析:此题暂无解析

209.(A1/A2型题)男,25岁。无诱因突发心悸1小时来诊。查体BP130/80mmHg,心率240次/分,律齐。压迫颈动脉窦后心率突然降至70次/分,律齐。该患者最可能的诊断是

- A.心动过缓-心动过速综合征
- B.阵发性室上性心动过速
- C.室性心动过速
- D.心房扑动
- E.窦性心动过速

答案:B

解析:此题暂无解析

210.(A1/A2型题)心律失常最基本的症状是

- A.心源性休克
- B.气促
- C.晕厥

- D.心悸
- E.急性肺水肿

答案:D

解析:心源性休克、晕厥是心律失常很严重的表现,急性肺水肿是左心衰竭的表现,气促是呼吸困难的表现,心律失常最基本的症状是心悸。故选D。

211.(A1/A2型题)阵发性室上性心动过速不伴有心力衰竭者首选

- A.静脉滴注利多卡因
- B.静脉注射维拉帕米
- C.口服苯妥英钠
- D.静脉滴注10%氯化钾
- E.口服美西律

答案:B

解析:阵发性室上性心动过速急性发作期,应根据患者的具体情况作出适当处理。如患者心功能和血压正常,可尝试刺激迷走神经的方法。药物治疗应选择钙拮抗剂,静脉注射维拉帕米或地尔硫草。故选B。洋地黄已较少应用,但对于伴有心功能不全患者仍作为首选。利多卡因用于室性心律失常。故不选A。C和D均不符。美西律为I类即钠通道阻滞药,主要用于急、慢性室性心律失常,故不选E。过关点睛:阵发性室上性心动过速并伴有心力衰竭时,应静脉注射维拉帕米或地尔硫草,疗效可达90%以上。

212.(A1/A2型题)患者男,41岁。近期出现头晕、乏力,连续3天血压140~150/90~96mmHg。患者的血压属于

- A.正常值
- B.正常高值
- C.I级高血压
- D.II级高血压
- E.III级高血压

答案:C

解析:此题暂无解析

213.(A1/A2型题)男,45岁。一年前发现血压170/110mmHg,长期口服氨氯地平药物治疗,2个月前诊断为糖尿病,口服降糖药物治疗,目前血压血糖均在正常范围。该患者高血压诊断正确的是

- A.高血压3级,中危
- B.高血压1级
- C.高血压2级,中危
- D.高血压3级,高危
- E.高血压2级,高危

答案:D

解析:此题暂无解析

214.(A1/A2型题)男,66岁。2天前与人争吵时觉头晕,当时测血压140/80_Hg,今天骑车10公里到县医院就诊,到达时测血压160/85mmHg。关于此时该患者的血

压诊断, 正确的说法是

- A. 诊断为高血压1级, 低危
- B. 诊断为单纯收缩期高血压2级, 中危
- C. 诊断为高血压2级, 中危
- D. 暂不能诊断高血压, 须多次测量安静休息时血压后才可能明确诊断
- E. 诊断为单纯收缩期高血压2级, 但须进一步检查后才能明确危险分组

答案:D

解析: 高血压的诊断是指测量安静休息坐位时上臂肱动脉部位血压, 2次以上 $\geq 140/90$ mmHg。本患者与人争吵时测血压, 及骑车10公里到达时立即测量血压都是不准确的, 须安静休息时多次测量血压才可能明确诊断。

215.(A1/A2型题) 糖尿病合并高血压的患者, 血压控制目标值应小于

- A. 130/80mmHg
- B. 150/90mmHg
- C. 140/80mmHg
- D. 130/90mmHg
- E. 140/90mmHg

答案:A

解析: 高血压无合并症降压目标140/90mmHg, 高血压合并心衰降压目标140/90mmHg, 合并糖尿病, 肾病, 降压目标更严格, 降压目标为: $< 130/80$ mmHg, 故本题答案为A。

216.(A1/A2型题) 消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失, 常提示患者其可能的原因是

- A. 晨起
- B. 饮酒过度
- C. 夜晚
- D. 癌变
- E. 过度劳累

答案:D

解析: ABCE均加重疼痛, 如果疼痛失去了上述规律性, 变为不定时发作, 或成为持续性隐痛, 或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变, 则应警惕为癌变的先兆。故本题选D。

217.(A1/A2型题) 患者, 男, 67岁, 肝硬化伴中等量腹水, 向其进行疾病相关知识的健康教育。以下哪项与腹水的产生无关

- A. 脾功能亢进
- B. 血清白蛋白减少
- C. 门静脉压力增高
- D. 醛固酮增多
- E. 肾小球滤过率下降

答案:A

解析: 此题暂无解析

218.(A1/A2型题)男性, 65岁。因腹水服用利尿剂2周。3天来出现少语寡言及随地便溺。5年前诊断为肝硬化。目前行为异常的原因首先考虑为

- A.神经症
- B.脑血管意外
- C.肝性脑病
- D.电解质紊乱
- E.代谢性酸中毒

答案:C

解析:肝性脑病, 又称肝昏迷, 是肝功能衰竭或门体分流引起的中枢神经系统精神症状, 主要临床表现可以从人格改变, 行为失常, 扑翼样震颤到出现意识障碍, 昏迷和死亡。患者在肝脏的原发疾病的基础上, 出现精神症状及人格改变, 符合肝性脑病表现。故选C。

219.(A1/A2型题)患者, 男, 49岁。既往确诊病毒性乙型肝炎。近5年来间断出现上腹胀, 近1周出现呕血.黑便。体检可见肝掌.腹部有蜘蛛痣, 可见曲张静脉。患者最可能的原因是

- A.胃炎
- B.胃癌
- C.应激性溃疡
- D.肝硬化
- E.消化道溃疡

答案:D

解析:此题暂无解析

220.(A1/A2型题)对重症急性胰腺炎的诊断最有意义的检查是

- A.尿淀粉酶
- B.腹部B超
- C.腹部增强CT
- D.血淀粉酶
- E.血清脂肪酶

答案:C

解析:腹部CT根据胰腺组织的影像改变进行分级, 对急性胰腺炎的诊断和鉴别诊断、评估期严重程度, 尤其是对鉴别轻症和重症胰腺炎有重要价值。轻症可见胰腺特异性增大和增厚, 胰周围边缘不规则;重症可见胰腺周围区消失;网膜囊和网膜脂肪变性, 密度增加;胸腹膜腔积液。增强CT是诊断胰腺坏死的最佳方法, 故本题答案为C。

221.(A1/A2型题)急性重症胰腺炎特征性病变是

- A.上腹部可触及包块
- B.脐周及侧腹呈青紫色
- C.黄疸
- D.腹痛向腰背部放散
- E.腹痛持续1周以上

答案:B

解析:此题暂无解析

222.(A1/A2型题)肾盂肾炎最主要的治疗措施是

- A.多饮水或输液
- B.卧床休息
- C.应用糖皮质激素
- D.应用抗生素
- E.解痉止痛

答案:D

解析:在未有药物敏感试验结果时,尿路感染的治疗应选用对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物,肾盂肾炎是肾实质疾病,除尿外,血浓度亦需高,最好能用杀菌药如复方磺胺甲恶唑片.喹诺酮类.氨基糖苷类抗生素.头孢菌素类.阿莫西林等药才能达到上述目的。

223.(A1/A2型题)女性,18岁,因尿少.水肿.头晕.腰痛半年入院,血压140/100mmHg,血红蛋白120g/L,血清蛋白40g/L,尿蛋白(++),白细胞3~4个/HP,红细胞10~15个/HP,血尿素氮8.3mmol/L,血肌酐178 μ mol/L,最可能的诊断是

- A.急性肾盂肾炎
- B.急性肾炎
- C.肾病综合征
- D.慢性肾炎
- E.急进性肾炎

答案:D

解析:此题暂无解析

224.(A1/A2型题)下列各选项中属于慢性肾炎的临床特点是

- A.不会导致尿毒症
- B.无蛋白尿
- C.双侧肾大小不一致
- D.肾功能具有缓慢恶化的趋势
- E.没有高血压

答案:D

解析:慢性肾小球肾炎简称慢性肾炎,系指蛋白尿.血尿.高血压.水肿为基本临床表现,起病方式不同,病情迁延,缓慢进展,终将发展为慢性肾衰竭的一组肾小球疾病。

225.(A1/A2型题)患者,男性,70岁,慢性肾衰竭。清晨测体温37.8 $^{\circ}$ C,提示患者出现了

- A.出血
- B.血栓栓塞
- C.中枢神经病变
- D.内分泌失调
- E.感染

答案:E

解析:慢性肾衰竭病人有感染的危险,监测病人有无体温升高。但是病人的基础代谢率较低,体温 $>37^{\circ}\text{C}$ 时即提示存在感染。E正确。

226.(A1/A2型题)患者,男,46岁,患尿毒症2年。血常规示RBC $2.35\times 10^{12}/\text{L}$,Hb70g/L。导致该患者贫血的最主要原因是

- A.出血
- B.低蛋白
- C.促红细胞生成素缺乏
- D.缺铁
- E.叶酸缺乏

答案:C

解析:导致贫血的主要原因是由于肾脏促红细胞生成素(EPO)缺乏生成减少所致,其次为铁摄入不足、叶酸缺乏、营养不良、红细胞寿命缩短、慢性失血、感染等;故本题选C。

227.(A1/A2型题)女性56岁。外阴痒1个月,白带乳块状,镜检发现真菌菌丝,合理的处理是

- A.阴道内放置咪康唑栓
- B.阴道内放置甲硝唑栓
- C.阴道内放置乙烯雌酚栓
- D.外阴应用氢化可的松软膏
- E.外阴应用0.5%醋酸液清洗

答案:A

解析:据其临床表现考虑真菌性阴道炎。对其治疗可选用阴道内放置咪康唑栓剂或克霉唑栓剂或制霉菌素栓剂。对不能耐受局部用药。未婚者或不愿采用局部用药者,可选用口服药物氟康唑或伊曲康唑。故A正确。甲硝唑栓用于治疗细菌性阴道病或滴虫阴道炎,故B错。己烯雌酚栓或0.5%醋酸液清洗用于治疗萎缩性阴道炎,故C.E错。故选A。

228.(A1/A2型题)患者女,32岁。外阴瘙痒伴烧灼感4天。妇科检查见外阴局部充血。小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色片状薄膜或凝乳状物。最可能的是

- A.细菌性阴道炎
- B.滴虫性阴道炎
- C.外阴阴道念珠菌病
- D.淋病性阴道炎
- E.萎缩性阴道炎

答案:C

解析:细菌性阴道炎的分泌物特点为匀质、稀薄、白色的阴道分泌物,常粘附于阴道壁。滴虫性阴道炎的分泌物特点为稀薄脓性、黄绿色、泡沫状、有臭味。淋病性阴道炎分泌物增多,显脓性白带,阴道口红肿疼痛。萎缩性阴道炎的分泌物稀薄、呈淡黄色,常见于自然绝经及卵巢去势后妇女。外阴阴道念珠菌病表现为小阴唇内侧及阴道黏膜附有白色膜状物,擦除后可见阴道黏膜红肿或糜烂面及浅表溃疡。典型的白带为白色、凝块状和豆渣样,略带臭味。故选C。

229.(A1/A2型题)32岁女性,阴道分泌物增多,外阴瘙痒,性交痛2天。妇科检查:阴道后穹隆大量黄色泡沫样分泌物,宫颈草莓样出血斑点。最佳的治疗方案为

- A.口服甲硝唑
- B.甲硝唑泡腾片阴道填塞
- C.口服氟康唑
- D.制霉菌素栓阴道填塞
- E.微波治疗

答案:A

解析:此题暂无解析

230.(A1/A2型题)女性,56岁。绝经8年,近1个月阴道分泌物增多,偶有血性白带,诊断为萎缩性阴道炎。治疗除局部抗感染治疗外,应加用少量

- A.雌激素
- B.孕激素
- C.雄激素
- D.糖皮质激素
- E.甲状腺素

答案:A

解析:萎缩性阴道炎的治疗原则是抑制细菌生长,补充雌激素,增强阴道抵抗力,所以治疗除局部抗感染治疗外,应加用少量雌激素。故选A。

231.(A1/A2型题)细菌性阴道病最常见的病原体是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.溶血性链球菌
- C.大肠杆菌
- D.厌氧菌
- E.沙眼衣原体

答案:D

解析:正常阴道内以产生过氧化氢的乳酸杆菌占优势,细菌性阴道病时,阴道内产生过氧化氢的乳酸杆菌减少而其他细菌大量繁殖,其中以厌氧菌居多。故选D。

232.(A1/A2型题)萎缩性阴道炎的治疗可在阴道内放置少量

- A.孕激素
- B.雌激素
- C.雄激素
- D.糖皮质激素
- E.促性腺激素

答案:B

解析:萎缩性阴道炎的治疗原则:①抑制细菌生长:用酸性洗液冲洗,再用抗生素局部用药;②增加阴道抵抗力:给予雌激素制剂局部给药或全身用药,故B正确。

233.(A1/A2型题)外阴阴道假丝酵母菌的主要传播途径为

- A.性交传播

- B.内源性传染
- C.垂直传播
- D.接触传播
- E.呼吸道传播

答案:B

解析:选B, 外阴阴道假丝酵母菌作为条件致病菌, 主要为内源性传染。

234.(A1/A2型题)需要夫妇双方同时治疗的炎症是

- A.外阴炎
- B.慢性宫颈炎
- C.念珠菌阴道炎
- D.滴虫性阴道炎
- E.盆腔炎

答案:D

解析:滴虫性阴道炎主要由性行为传播, 性伴侣应同时进行治疗, 治疗期间禁止性交。

235.(A1/A2型题)有关原发性痛经的陈述, 正确的是

- A.患者雌激素水平异常升高可致痛经
- B.子宫自主神经敏感性增加易发痛经
- C.经期子宫内膜PG过度合成可致痛经
- D.子宫内膜组织缺氧可引起痛经
- E.子宫内膜异位可引起痛经

答案:C

解析:此题暂无解析

236.(A1/A2型题)患儿, 8个月, 因面色苍白20天入院, 查体:贫血外观, 肝于右肋下触及2.5cm, 血象Hb80g/L, RBC $3.08 \times 10^{12}/L$, 诊为小细胞低色素性贫血, 给予铁剂治疗, 如有效, 网织红细胞何时可达高峰

- A.2~3天
- B.3~4天
- C.4~5天
- D.5~7天
- E.7~10天

答案:D

解析:网织红细胞在服药2~3日后开始上升, 5~7日达高峰, 2~3周后下降至正常。故选D。三.

237.(A1/A2型题)在下列缺铁性贫血的临床表现中, 属于组织缺铁表现的是

- A.头晕
- B.眼花
- C.心悸
- D.异食癖
- E.气短

答案:D

解析:5项备选答案中只有异食癖属于组织缺铁的表现,其余均属于贫血的表现

238.(A1/A2型题)营养性缺铁性贫血的临床表现,错误的是

- A.年长儿可有头晕.眼前发黑.耳鸣等
- B.注意力不集中,记忆力减退
- C.食欲减退,可出现异食癖
- D.免疫功能低下,易合并感染
- E.年龄愈大,肝.脾大越明显

答案:E

解析:营养性缺铁性贫血的临床表现年长儿可有头晕.眼前发黑.耳鸣.注意力不集中.记忆力减退.食欲减退,可出现异食癖和免疫功能低下,易合并感染。由于髓外造血的影响,年龄越小,病程越久,肝.脾大越明显,故选E。

239.(A1/A2型题)容易造成营养性缺铁性贫血的原因是

- A.足月儿4个月开始添加富含铁剂的食物
- B.早产儿2个月开始添加富含铁剂的食物
- C.长期单纯母乳喂养
- D.过期产
- E.便秘

答案:C

解析:此题暂无解析

240.(A1/A2型题)缺铁性贫血根治的关键是

- A.铁剂治疗
- B.病因治疗
- C.输血治疗
- D.饮食治疗
- E.预防各种感染

答案:B

解析:此题暂无解析

241.(A1/A2型题)患者,女,33岁,近2个月下肢反复出现紫癜,月经量增多。查血象示WBC $6.8 \times 10^9/L$, Hb $110g/L$, PLT $53 \times 10^9/L$ 。应首选的检查项目是

- A.出血时间
- B.凝血酶原时间
- C.骨髓穿刺检查
- D.晨起服用
- E.抗核抗体

答案:C

解析:血小板计数低于正常值,下肢反复出现紫癜,且身体失血量增多,可考虑为特发性血小板减少性紫癜。需进行骨髓象检查进一步确诊。

242.(A1/A2型题)治疗特发性血小板减少性紫癜慢性型的首选方案为

- A.输新鲜血小板
- B.X线脾区照射
- C.使用止血药
- D.使用糖皮质激素
- E.做脾切除

答案:D

解析:此题暂无解析

243.(A1/A2型题)特发性血小板减少性紫癜较少出现

- A.肌肉血肿
- B.鼻出血
- C.月经过多
- D.口腔黏膜出血
- E.皮肤瘀点

答案:A

解析:特发性血小板减少性紫癜出血多表现为皮肤黏膜出血(包括牙龈、鼻出血),也可有内脏出血。月经过多较常见。较少有肌肉出血。故选A。

244.(A1/A2型题)28岁女性。出现心悸,多食,消瘦近半年。经查体及实验检查确诊为Graves病,患者幼年时有哮喘史。下述何种药物应禁忌

- A.普萘洛尔
- B.甲基硫氧嘧啶
- C.卡比马唑
- D.甲状腺素片
- E.甲巯咪唑

答案:A

解析:哮喘禁忌普萘洛尔是因为其为 β 受体阻滞剂, β 受体阻滞剂会增加哮喘患者的气道高反应性。

245.(A1/A2型题)女性,35岁,诊甲亢后即行甲状腺次全切手术,术后病人出现高热,心率160次/分,烦躁不安。大汗淋漓,腹泻,应首先考虑的诊断是

- A.甲亢症状加重
- B.甲亢术后感染
- C.甲亢危象
- D.甲亢危象前期
- E.甲亢术后感染性腹泻

答案:C

解析:此题暂无解析

246.(A1/A2型题)甲状腺功能亢进性心脏病病人最常出现的心律失常是

- A.期前收缩
- B.室性期前收缩
- C.室上性心动过速
- D.心房纤颤

E.心室纤颤

答案:D

解析:甲状腺功能亢进性心血管系统表现:心悸、胸闷、气短,心率增快、心肌收缩力增强,心律失常以心房颤动最常见。

247.(A1/A2型题)治疗甲状腺功能亢进的常用药是硫脲类抗甲状腺药物,其主要作用是

- A.阻滞T4转变为T3
- B.抑制碘的吸收
- C.抑制甲状腺激素的释放
- D.抑制甲状腺激素的合成
- E.抑制促甲状腺激素的合成

答案:D

解析:硫脲类抗甲状腺药物其作用机制为抑制甲状腺过氧化物酶,阻断甲状腺激素的合成。

248.(A1/A2型题)以下情况不符合转诊条件的是

- A.怀疑甲亢但不能确诊者
- B.甲亢性心脏病患者
- C.甲亢合并周期性瘫痪者
- D.甲亢诊断明确,症状轻微者
- E.出现甲亢危象者

答案:D

解析:甲亢患者出现以下情况需转诊:①甲亢性心脏病表现为心房颤动和心力衰竭者。②甲亢疑似病例不能确诊者。③甲亢合并周期性瘫痪,出现呼吸肌瘫痪导致窒息者。④出现甲亢危象者。二.

249.(A1/A2型题)关于癫痫下列说法错误的是

- A.强直发作是一种发作性僵直的强烈的肌收缩
- B.失张力癫痫发作时全身肌张力突然消失致猝倒,同时意识丧失
- C.癫痫按照病因可分为特发性癫痫和症状性癫痫
- D.肌阵挛性发作是一种突发.短暂的闪电样肌肉收缩
- E.失神发作患者意识短暂中断,发作突然,缓慢停止,每日可发作数次至数百次,事后对发作无记忆

答案:E

解析:失神发作患者意识短暂中断,发作和停止突然,每日可发作数次至数百次,事后对发作无记忆。

250.(A1/A2型题)复杂部分性发作的病损在

- A.中央前回
- B.黑质-纹状体
- C.颞叶
- D.枕叶
- E.小脑

答案:C

解析:此题暂无解析

251.(A1/A2型题)对各类癫痫都有一定疗效的药物是

- A.乙琥胺
- B.苯妥英钠
- C.卡马西平
- D.丙戊酸钠
- E.苯巴比妥

答案:D

解析:丙戊酸钠是广谱的抗癫痫药,用于全面性发作和部分性发作。

252.(A1/A2型题)23岁,男性。3个月前起病,说话语无伦次,常自言自语,说自己是神仙,是伟人,对异性有非分之想,攻击亲人。查:意识清晰,兴奋躁动,思维破碎,内容离奇,难以理解,认为门外有人要杀他,有一台电脑在影响他的大脑,使大脑在不停地转。躯体及神经系统检查未见显著体征,该患诊断是

- A.躁狂症
- B.抑郁症
- C.精神分裂症
- D.心因性精神障碍
- E.神经症

答案:C

解析:躁狂状态的主要临床症状是心境高涨,思维奔逸和精神运动性兴奋,不选A。抑郁以情感低落、思维迟缓、以及言语动作减少、迟缓为典型症状,不选B。心因性精神障碍是一组由心理社会因素所造成的精神障碍,患者不符合,不选D。神经症是一组非精神病功能性障碍。其共同特征是:是一组心因性障碍,人格因素、心理社会因素是致病主要因素,但非应激障碍,是一组机能障碍,障碍性质属功能性非器质性;具有精神和躯体两方面症状;具有一定的人格特质基础但非人格障碍;各亚型有其特征性的临床相;神经症是可逆的,外因压力大时加重,反之症状减轻或消失;社会功能相对良好,自制力充分,不选E。故选C。

253.(A1/A2型题)24岁,女性,病程6年,说有人要害她,常自笑,好追求异性,有时打人摔东西,话多内容凌乱。精神检查:意识清晰,兴奋多语,思维松弛,欣快,主动接触异性,有被害妄想及非系统性妄想,活动增多而无目的性,躯体及神经系统检查未见著征,该患者诊断为

- A.精神分裂症
- B.情感障碍(躁狂型)
- C.脑器质性精神障碍
- D.人格障碍
- E.躯体疾病所致精神障碍

答案:A

解析:此题暂无解析

254.(A1/A2型题)不属于思维内容障碍的是

- A.思维松弛
- B.思维被播散
- C.被洞悉感
- D.被害妄想
- E.嫉妒妄想

答案:A

解析:思维松弛属于思维形式的障碍,不属于思维内容的障碍,故选A。

255.(A1/A2型题)女,26岁。近1月来出现失眠,难以入睡,食欲较差,体重减轻2kg,自觉自己无能,没用,孤独,没有人关心自己,对未来也不抱任何希望,偶尔出现生不如死的想法,目前患者出现的突发病状是

- A.三自症状
- B.思维迟缓
- C.睡眠障碍
- D.消极观念
- E.三无症状

答案:E

解析:“三无”症状:无望——

对未来不报任何希望,无助——没有人关心自己,无价值——

偶尔出现生不如死的想法。

256.(A1/A2型题)抑郁症最具特征性的睡眠障碍是

- A.入睡困难
- B.早醒
- C.恶梦频繁
- D.易醒
- E.睡眠-觉醒节律紊乱

答案:B

解析:抑郁发作表现以情感低落、思维迟缓、意志活动减退和躯体症状为主。抑郁症睡眠障碍主要表现为早醒,一般比平时早醒2~3小时,醒后不能再入睡,具诊断意义。二。

257.(A1/A2型题)男,52岁。颈肩痛3个月,并向左上肢放射。左上肢肌力下降,手指动作不灵活。颈椎棘突间有压痛,左手拇指感觉减弱。上肢牵拉试验阳性,压头试验阳性。最可能的颈椎

- A.脊髓型
- B.神经根型
- C.混合型
- D.椎动脉型
- E.交感神经型

答案:B

解析:神经根型颈椎病临床上开始多为颈肩痛,短期内加重,并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节。皮肤可有麻木、过敏等感觉异常。同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活。当头部或上肢姿势不当,或突然牵撞患

肢即可发生剧烈的闪电样锐痛。上肢牵拉试验阳性:术者一手扶患侧颈部,一手握患腕,向相反方向牵拉。此时因臂丛神经被牵张,刺激已受压之神经根而出现放射痛。压头试验阳性:患者端坐,头后仰并偏向患侧,术者用手掌在其头顶加压,出现颈痛并向患手放射。故选B。

258.(A1/A2型题)男,50岁。四肢麻胀,乏力逐渐加重近2年,1个月前不慎滑倒,当即出现四肢活动障碍,查体:神志清楚,头部活动无明显受限,第2肋以下皮肤痛觉减退,四肢不能主动活动肌张力增高,病理征(+).X线片示颈4~胸1椎体后缘骨质增生,椎间隙变窄。诊断为

- A.外伤性颈髓损伤
- B.颈椎脱位
- C.脊髓型颈椎病
- D.颈椎肿瘤
- E.颈椎管内肿瘤

答案:C

解析:脊髓型颈椎病主要是由于颈部病变导致脊髓受压.炎症.水肿等;以40~60岁高发;主要症状为下肢麻木.沉重,行走困难,双脚有踩棉感,易摔跤;上肢麻木.疼痛,双手无力.不灵活,写字.系扣.持筷等精细动作难以完成,持物易落;躯干部出现感觉异常,患者常感觉在胸部.腹部.或双下肢有如皮带样的捆绑感。结合患者表现,考虑为脊髓型颈椎病。故选C。

259.(A1/A2型题)下列哪一类型颈椎病发病率最高

- A.神经根型
- B.脊髓型
- C.椎动脉型
- D.交感神经型
- E.复合型

答案:A

解析:神经根型颈椎病约占颈椎病的50%-60%,故本题选A;脊髓型颈椎病约占颈椎病的10%~15%。

260.(A1/A2型题)手指麻木伴上肢放射痛,压头试验阳性,最可能的颈椎病类型是

- A.椎动脉型颈椎病
- B.脊髓型颈椎病
- C.交感神经型颈椎病
- D.神经根型颈椎病
- E.复合型颈椎病

答案:D

解析:此题暂无解析

261.(A1/A2型题)女,48岁,因左肩痛3个月逐渐加重,不能梳头,左肩关节外展.后伸受限,三角肌萎缩,无手臂麻木感,最可能的原因是

- A.颈椎病
- B.肩部肿瘤

- C.肩周炎
- D.肩关节结核
- E.风湿性关节炎

答案:C

解析:此题暂无解析

262.(A1/A2型题)肩周炎不正确的治疗方法是

- A.理疗
- B.封闭
- C.按摩
- D.服用非甾体抗药物
- E.限制肩关节活动

答案:E

解析:早期给予理疗、针灸、适度的推拿按摩,可改善症状;疼痛持续、夜间难以入睡时,可短期服用非甾体抗炎药,并加以适量口服肌肉松弛剂;痛点局限时,可局部注射醋酸泼尼松龙,能明显缓解疼痛;无论病程长短,症状轻重,均应每日进行肩关节的主动活动,活动时以不引起剧痛为限。故选E。

263.(A1/A2型题)肩周炎是自限性疾病,一般恢复时间需要

- A.2年~3年左右
- B.1年~2年左右
- C.6个月~2年左右
- D.3个月~6个月左右
- E.1个月~3个月左右

答案:C

解析:肩周围关节炎有其自然病程,一般在6个月~2年左右能自愈。但若不配合治疗和功能锻炼,即使自愈也将遗留不同程度的功能障碍。故选C。

264.(A1/A2型题)女,54岁。双腕,双手近段指尖关节、掌指关节肿痛3年,晨僵1小时。查体:双腕、双手2~4掌指关节及3~4近端指间关节肿胀,压痛,ANA(-)。最可能的诊断是

- A.强直性脊柱炎
- B.类风湿关节炎
- C.反应性关节炎
- D.骨关节炎
- E.痛风性关节炎

答案:B

解析:此题暂无解析

265.(A1/A2型题)类风湿关节炎常选用的治疗药物是

- A.泼尼松
- B.糖皮质激素
- C.阿司匹林
- D.紫杉醇

E.环磷酰胺

答案:C

解析:诊断明确的类风湿关节炎病人都应使用缓解病情抗风湿药,常用药物有甲氨蝶呤、青酶胺、环磷酰胺、环孢素等,故本题选E。

266.(A1/A2型题)类风湿关节炎的临床表现中不包括

A.关节疼痛

B.关节畸形

C.关节肿胀

D.蝶形红斑

E.晨僵

答案:D

解析:蝶形红斑是系统性红斑狼疮最具特征性的皮肤改变,其余四项均为类风湿关节炎的临床表现。

267.(A1/A2型题)类风湿关节炎常见的关节表现是

A.对称性近端指间、掌指和腕关节持续性肿痛

B.膝、髋和踝关节非对称,持续肿痛

C.膝关节单侧或双侧肿痛,休息后好转

D.单侧第一跖趾关节剧烈肿痛

E.胸锁关节肿痛

答案:A

解析:类风湿关节炎的关节表现有晨僵、痛与压痛(关节痛往往是最早的症状,最常出现的部位为腕、掌指关节、近端指间关节,多呈对称性、持续性,时轻时重,疼痛的关节伴有压痛),关节肿,关节畸形(多见于较晚期患者),特殊关节,关节功能障碍。故选A。

268.(A1/A2型题)在类风湿关节炎中,最常受累的关节是

A.脊柱关节

B.髋关节

C.膝关节

D.远端指间关节

E.近端指间关节

答案:E

解析:类风湿关节炎可侵犯周围小关节和大关节,但以近端指间关节、掌指关节、腕关节及足关节最常见,其次为肘、肩、踝、膝、颈、颞颌及髋关节。远端指间关节和脊柱关节(颈椎除外)极少受累

269.(A1/A2型题)患儿,4个月,男婴。采用混合喂养,腹泻2个月,大便5~6次/d,稀或糊便,无脓血,食欲表现好。面部湿疹,体重5.8kg。该患儿目前最可能的诊断是

A.迁延性腹泻

B.慢性腹泻

C.感染性腹泻

D.饮食性腹泻

E.生理性腹泻

答案:E

解析:患儿一般情况好,无感染中毒症状,不影响生长发育,支持生理性腹泻,排除感染性腹泻。迁延性腹泻指发病2周至2个月的腹泻,慢性腹泻指发病 $>$ 2个月的腹泻。

270.(A1/A2型题)1岁男孩。1天来腹泻10余次,为黄稀水便。查体:精神稍萎靡,皮肤弹性佳。医生推荐使用WHO规定的传统口服补液盐,其张力为

A.1/2张

B.1/3张

C.2/3张

D.1/4张

E.等张

答案:C

解析:WHO规定的口服补液盐电解质的渗透压为220mmol/L(总渗透压为310mmol/L),故为2/3张。

271.(A1/A2型题)患儿男,3岁。腹泻4天,加重2天,稀水样便每日十余次,尿量减少。体检:眼窝凹陷,皮肤弹性差,脉搏可扪及。查血钠135mmol/L。其腹泻脱水的程度与性质应是

A.轻度低渗性

B.轻度等渗性

C.中度高渗性

D.中度等渗性

E.重度低渗性

答案:D

解析:根据患儿腹泻4天,加重2天,稀水样便每日十余次,尿量减少。体检:眼窝凹陷,皮肤弹性差,脉搏可扪及。查血钠135mmol/L。患儿为中度等渗性脱水。轻度脱水皮肤弹性无改变,重度脱水循环表现为休克。低渗脱水血钠浓度 $<$ 130mmol/L,高渗脱水血钠浓度 $>$ 150mmol/L。所以患儿属于中度等渗性脱水,故选D。

272.(A1/A2型题)男,10岁,诊断为胆道蛔虫症,其病史体检不支持诊断的是

A.恶心.呕吐

B.排虫史

C.疼痛间歇性发作

D.严重时出现急性胆管炎征象

E.发病超过12小时,常有明显黄疸

答案:E

解析:此题暂无解析

273.(A1/A2型题)自直疝三角向外突出的疝称为

A.股疝

B.腹股沟直疝

C.腹股沟斜疝

- D.脐疝
- E.白线疝

答案:B

解析:直疝三角是由外侧腹壁下动脉、内侧腹直肌外侧缘及下侧腹股沟内侧构成的。此三角缺乏完整的腹肌覆盖,且腹横筋膜比较薄,故易发生疝,腹股沟直疝即在此由后向前突出。股疝自股环向下向外突出,斜疝自深(内)环向外突出,经腹股沟管进入阴囊。二。

274.(A1/A2型题)妊娠妇女可以应用的解热镇痛药是

- A.阿司匹林
- B.对乙酰氨基酚
- C.布洛芬
- D.吲哚美辛
- E.塞来昔布

答案:B

解析:妊娠妇女应慎用解热镇痛药。必须用时,宜选用对乙酰氨基酚。

275.(A1/A2型题)成人胸外心脏按压时,胸骨下陷深度正确的是

- A.3~4cm
- B.4~5cm
- C.5~6cm
- D.4~6cm
- E.4~8cm

答案:C

解析:按压速率为100~120次/分,按压幅度为5~6cm。按压与人工呼吸比例为30:2。

276.(A3/A4型题)一位外科医生在对术前病人的谈话中,解释了手术的过程、手术中的危险以及术后可能出现的问题。同时又要求病人不必把手术的危险性看得太严重,多想手术的积极意义,有利于病灶的切除和身体的康复,并教会病人一些放松的技巧。病人得到了鼓励和支持,消除了术前的焦虑。外科医生帮助病人有效应对方法属于

- A.增强防御机制
- B.减轻紧张
- C.耐心的劝导
- D.调整对刺激事件的认知
- E.思想政治工作

答案:D

解析:此题暂无解析

277.(A3/A4型题)一位外科医生在对术前病人的谈话中,解释了手术的过程、手术中的危险以及术后可能出现的问题。同时又要求病人不必把手术的危险性看得太严重,多想手术的积极意义,有利于病灶的切除和身体的康复,并教会病人一些放松的技巧。病人得到了鼓励和支持,消除了术前的焦虑。医生所用方法能有

效地消除病人的心理问题的原因是

- A.增强病人对威胁情境的控制能力
- B.接受心理方面的暗示
- C.提高思想觉悟
- D.得到医生的热情劝告
- E.增加病人配合治疗的责任感

答案:A

解析:此题暂无解析

278.(A3/A4型题)患者男性,40岁。因艾滋病.肺部感染住院治疗。患者对医生提出要求,不要将病情跟家人.单位领导讲,医生尊重患者要求,住院期间病情交待只跟患者交流。医生维护的患者权利是

- A.选择权
- B.决定权
- C.知情权
- D.隐私权
- E.回避权

答案:D

解析:此题暂无解析

279.(A3/A4型题)一小儿,女患者,11岁。患甲状腺癌,并有颈淋巴结转移。医生告诉患儿母亲,女孩需做甲状腺癌根治术。按常规手术后要造成颈部塌陷变形,肩下垂,身体的外观和功能都要受到一定损害。当患儿母亲听到要造成这些后遗症后,断然拒绝治疗,带孩子出院。过了不久,患儿家属考虑到癌症将危及到病人的生命。故再次来到医院,要求给予治疗,并请求医生尽可能不给孩子留下终身伤残的痛苦。医生经过再三考虑,决定打破常规,采用一种新的术式。既收到治疗效果,又使女孩子保留外形美观,功能不受破坏。患者及家属同意做此手术。尽管这种术式的治疗效果当时尚不能肯定,手术进行得很顺利,随访远期疗效也很好。下面说法哪一点是错误的

- A.病人应该在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行
- B.既要为病人考虑眼前疗效,又考虑远期疗效
- C.医生不可以强求病人做不同意做的手术
- D.医生打破常规,采用治疗效果不肯定的术式的做法是不可取的
- E.医生为病人着想.勇担风险是值得赞扬的

答案:D

解析:然医生打破常规,采用治疗效果不肯定的术式但是既能到治疗效果,又使女孩子保留外形美观,功能不受破坏。所以不算错误,做法可取。

280.(A3/A4型题)男,53岁,公司经理,吸烟15年,每天2包,体重75kg,身高164cm。从临床预防心血管疾病的角度讲应该检查

- A.血脂
- B.血常规
- C.心超
- D.心电图

E.冠状动脉造影

答案:A

解析:血脂为心血管疾病的易发因素,因此需要检查血脂。

281.(A3/A4型题)男,53岁,公司经理,吸烟15年,每天2包,体重75kg,身高164cm。患者的BMI(体重指数)是

A.21.4

B.23.5

C.25.8

D.27.9

E.31.5

答案:D

解析:MI指数是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。计算得出该患者的BMI为27.9,故选D。

282.(A3/A4型题)吴某,男,40岁,某公司副总经理,由于头晕、胸闷来就诊。平时脾气暴躁,容易发脾气,做事匆忙,常为完成工作而加班,讲话快,对下属要求严格。从致病性行为模式的角度来说,吴某的行为属于

A.A型行为

B.B型行为

C.C型行为

D.D型行为

E.E型行为

答案:A

解析:此题暂无解析

283.(A3/A4型题)一个健康5岁小儿,体格生长发育正常。体重、身长大概为多少

A.体重18kg,身长107cm

B.体重15kg,身长104cm

C.体重18kg,身长106cm

D.体重22kg,身长106cm

E.体重18kg,身长102cm

答案:A

解析:儿5岁,2岁~青春前期儿童体重:体重(kg)=年龄 \times 2+7(或8)。2~12岁:身高(cm)=年龄 \times 6+77,通过计算可得知应该选择A。

284.(A3/A4型题)男,45岁,胃溃疡病史8年,近3个月疼痛加重,失去节律,用多种药物治疗无效。查体:浅表淋巴结无肿大,腹平软,上腹部压痛,可扪及肿块。应首选下列哪项检查

A.便潜血试验

B.血清胃泌素测定

C.B超

D.胃镜检查

E.钡餐造影

答案:D

解析:此题暂无解析

285.(A3/A4型题)男,45岁,胃溃疡病史8年,近3个月疼痛加重,失去节律,用多种药物治疗无效。查体:浅表淋巴结无肿大,腹平软,上腹部压痛,可扪及肿块。如果上述诊断成立,首选的处理方法是

A.继续药物治疗

B.定期随访

C.手术治疗

D.化疗

E.放疗

答案:C

解析:溃疡的患者中,如近期内症状有变化者应考虑到恶性胃溃疡,应进行胃镜检查及黏膜活检病理检查,诊断明确尽早手术治疗。

286.(A3/A4型题)患者男,40岁。中上腹饥饿性隐痛反复发作10年,伴反酸、嗝气,进食和服用抑酸剂可缓解。如进行腹部检查,最具诊断价值的体征是

A.腹肌紧张

B.腹壁柔韧感

C.肠鸣音亢进

D.肝浊音界消失或缩小

E.莫菲征阳性

答案:D

解析:孔最具诊断价值的体征是肝浊音界消失或缩小。故选D。

287.(A3/A4型题)患者男,40岁。中上腹饥饿性隐痛反复发作10年,伴反酸、嗝气,进食和服用抑酸剂可缓解。为确诊应选择的检查手段是

A.血清淀粉酶测定

B.癌胚抗原测定

C.胃镜检查

D.腹部X线平片

E.中腹部B超

答案:D

解析:孔后可引起急性腹膜炎,可有腹膜刺激征,症状有中上腹剧痛且腹痛持续存在,体征有压痛、反跳痛及肌紧张。X线检查可见膈下游离气体,可确诊。故选D。

288.(A3/A4型题)女性,39岁。反复上腹痛伴反酸10年,疼痛于空腹时加重,饭后缓解,近来疼痛加剧,服抗酸药等不能缓解。近3天来上腹痛伴呕吐,呕吐有酸臭味。上述病例最可能的诊断是

A.胃窦癌伴幽门梗阻

B.胃溃疡

C.十二指肠溃疡伴幽门梗阻

- D.幽门管溃疡
- E.胆汁反流性胃炎

答案:C

解析:题干可知患者中年女性,上腹痛病史10年,且有节律性,考虑为十二指肠溃疡,消化性溃疡并发幽门梗阻时可使胃排空延迟,上腹胀满不适,疼痛于餐后加重;恶心.呕吐隔夜酸性宿食。

289.(A3/A4型题)患者,男性,70岁,慢性迁延性肝炎15余年,近半个月来感全身明显乏力,食欲差,腹胀,腹泻入院。查体:面色晦暗,体形消瘦,皮肤巩膜中度黄染,腹部膨隆,叩诊有移动性浊音。护士根据患者腹部出现了移动性浊音这一特点,考虑患者的腹水量已超过

- A.400ml
- B.700ml
- C.900ml
- D.1000ml
- E.1500ml

答案:D

解析:此题暂无解析

290.(A3/A4型题)患者男,57岁。3个月来腹胀.水肿,1周来加重伴腹痛。20年前曾发现HBsAg(+).查体:可见肝掌及蜘蛛痣。蛙状腹,肝未及,脾肋下4cm,全腹压痛,无明显反跳痛,移动性浊音阳性。化验:血白蛋白24g/L,血球蛋白31g/L,血钾3.8mmol/L,血钠136mmol/L,血氯98mmol/L。该患者最必要的检查是

- A.腹水常规+细菌培养
- B.尿常规及尿钠检测
- C.腹部B超检查
- D.腹部CT检查
- E.胃镜检查

答案:A

解析:患者有腹水,为明确诊断,应抽腹水化验检查,腹水检查一般为漏出液,如并发自发性腹膜炎,则腹水透明度降低,比重介于漏出液和渗出液之间,白细胞数增多,常在 $500 \times 10^6/L$ 以上。并发结核性腹膜炎时,则以淋巴细胞为主。腹水呈血性应高度怀疑恶变,宜做细胞学检查,故选A。其他四个选项不能做出明确诊断。故不选。

291.(A3/A4型题)女,32岁,2天来出现尿频.尿急.尿痛,发冷发热 $39^{\circ}C$,腰痛,化验尿常规脓细胞成堆,红细胞(+),血常规白细胞 $14 \times 10^9/L$,中段尿细菌培养大肠杆菌菌落计数 $14 \times 10^5/ml$ 。此患者可能诊断为

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.慢性尿道炎
- D.慢性肾盂肾炎
- E.慢性膀胱炎

答案:B

解析:患者为育龄妇女,有感染中毒等症状如腰痛、腰酸,尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征,中段尿培养阳性,血红细胞计数升高。

292.(A3/A4型题)男,25岁。发现血尿、蛋白尿2年。查体:BP150/90mmHg,双下肢无水肿。检查:尿蛋白定量0.5~0.8g/d,尿RBC5~10个/HP,血肌酐125 μ mol/L,血胆固醇6.0mmol/L,B超示双肾大小正常。该患者最可能的临床诊断为

- A.高血压肾病
- B.肾病综合征
- C.急性肾小球肾炎
- D.慢性肾小球肾炎
- E.无症状性蛋白尿和血尿

答案:D

解析:性肾小球肾炎属于临床诊断,需符合以下诊断指标:凡尿化验异常(蛋白尿、血尿),伴水肿、高血压肾功能不全至少一种情况者达3个月以上;若为单纯性蛋白尿,尿蛋白大于1g/d者;在除外继发性肾小球肾炎及遗传性肾小球肾炎后,临床上可诊断为慢性肾炎。本患者血尿、蛋白尿2年,血压升高,肾功能轻度损害,无其他疾病史,故诊断为慢性肾小球肾炎。

293.(A3/A4型题)男,68岁,进行性排尿困难,尿线变细,饮酒后症状加重。要确诊病因,首选的影像学检查是

- A.CT
- B.MRI
- C.B超
- D.KU
- E.膀胱造影检查

答案:C

解析:确诊病因,首选的影像学检查是B型超声波检查,可显示增生的前列腺。该检查无创、经济,为检查首选,故选C。

294.(A3/A4型题)女性,28岁,妊娠期体格检查,尿糖(+++),血糖:空腹7.8mmol/L,随机16.7mmol/L。诊断考虑

- A.应激性高血糖
- B.糖尿病
- C.糖耐量减低
- D.反应性高血糖
- E.妊娠期糖尿病

答案:E

解析:此题暂无解析

295.(A3/A4型题)女性,28岁,妊娠期体格检查,尿糖(+++),血糖:空腹7.8mmol/L,随机16.7mmol/L。治疗主要选择

- A.饮食治疗
- B.体育锻炼
- C.口服降糖药

- D.胰岛素
- E.无须治疗

答案:D

解析:此题暂无解析

296.(A3/A4型题)患者,女,55岁。高血压20年,不规则服药。某日晨突发头痛,意识不清,30分钟后送到医院。体检:昏迷,血压210/110mmHg,双眼向右侧凝视,左足外旋位。下列哪项辅助检查对明确诊断最有价值

- A.腰穿检查
- B.脑电图检查
- C.脑超声检查
- D.头颅CT检查
- E.开颅探查

答案:D

解析:确脑出血诊断最有价值的辅助检查是头颅CT检查,出血部位可见高密度影。

297.(A3/A4型题)患者男,24岁。突然意识不清,跌倒,全身强直数秒钟后抽搐,咬破舌2分钟后抽搐停止。醒后活动自如。应进一步做的检查是

- A.头颅X线片
- B.脑电图
- C.脑脊液检查
- D.脑血管造影
- E.经颅超声多普勒(TCD)

答案:B

解析:电图上的癫痫放电是人类癫痫的一个重要特征,也是诊断癫痫的主要佐证。理论上讲,任何一种癫痫发作都能用脑电图记录到发作或发作间期痫样放电。故选B。过关键点睛:断癫痫的主要佐证是脑电图。

298.(A3/A4型题)患儿,15岁,因发热、疲乏4天,尿黄、巩膜黄染2天入院,体温38.5℃,发病前曾在外饮食,有乙肝疫苗接种史。为了确诊最可靠的检查项目是

- A.抗HAV-IgG
- B.抗HBV-IgM
- C.抗HDV
- D.抗HEV
- E.抗HAV-IgM

答案:E

解析:此题暂无解析

299.(A3/A4型题)女性,20岁,服务业人员,未婚,不否认有性交行为。半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑,无痒痛感,查躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹,对称分布,掌跖部黄豆大小铜红色领圈样脱屑。要诊断梅毒还应做哪项检查

- A.TPPA
- B.抗-HIV

C.抗-HEV

D.RPR

E.血沉

答案:A

解析:此题暂无解析

300.(A3/A4型题)女性, 20岁, 服务业人员, 未婚, 不承认有性交行为。半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑, 无痒痛感, 查躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹, 对称分布, 掌跖部黄豆大小铜红色领圈样脱屑。若确诊为梅毒首选治疗药物是

A.四环素

B.红霉素

C.头孢曲松钠

D.青霉素类

E.拜复乐

答案:D

解析:此题暂无解析