

2022年执业/助理医师资格考试

# 笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷二 【151-300题】

金英杰医学教育

151.(A1型题)下列各项中, 不属于竹叶石膏汤组成药物的是

- A.人参粳米
- B.石膏麦冬
- C.知母生地
- D.甘草半夏
- E.竹叶麦冬

答案:C

解析:此题暂无解析

152.(A1型题)由元参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是

- A.犀角地黄汤
- B.凉膈散
- C.普济消毒饮
- D.仙方活命饮
- E.清营汤

答案:E

解析:此题暂无解析

153.(A1型题)治疗紫癜血热伤络证, 应首选

- A.茜根散
- B.归脾汤
- C.泻心汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.犀角地黄汤

答案:E

解析:◎犀角地黄汤主治热入血分证。表现为热伤血络, 斑色紫黑。热扰心神, 身热谵语

154.(A1型题)阴虚火旺, 发热盗汗, 面赤心烦, 口干唇燥, 便结溲黄, 舌红, 脉数者, 治疗应选用

- A.大补阴丸
- B.知柏地黄丸
- C.六味地黄丸
- D.当归六黄汤
- E.牡蛎散

答案:D

解析:■当归六黄汤主治发热, 盗汗, 面赤心烦, 口干唇燥, 大便干结, 小便黄赤, 舌红苔黄, 脉数。大补阴丸的主治阴虚火旺, 潮热盗汗, 咳嗽咯血, 耳鸣遗精。知柏地黄丸的主治阴虚火旺, 潮热盗汗, 口干咽痛, 耳鸣遗精, 小便短赤。六味地黄丸的主治头晕耳鸣, 腰膝酸软, 遗精盗汗。六味地黄丸用于用于头晕耳鸣, 腰膝酸软, 遗精盗汗。牡蛎散的主治自汗, 盗汗。常自汗出, 夜卧更甚, 心悸惊惕, 短气烦倦, 舌淡红, 脉细弱。故本题选D。

155.(A1型题)具有解毒消痈, 化痰散结, 活血祛瘀功用的方剂是

- A.四妙勇安汤
- B.犀黄丸

- C.仙方活命饮
- D.大黄牡丹汤
- E.苇茎汤

答案:B

解析:犀黄丸清热解毒,化痰散结,活血消肿,祛瘀止痛,主治乳岩、横痃、瘰疬、痰核、流注、肺痈、小肠痈等病。故本题选B。

156.(B型题)感受暑湿,身热烦渴,小便不利或大便泄泻者,治宜选用

- A.藿香正气散
- B.香薷饮
- C.参苓白术散
- D.六一散
- E.桂苓甘露散

答案:D

解析:此题暂无解析

157.(B型题)新加香薷饮的功用是

- A.祛暑解表,化湿和中
- B.祛暑解表,清热化湿
- C.清暑解热,化气利湿
- D.清暑化湿,理气和中
- E.祛暑化湿;健脾和中

答案:B

解析:■香薷散祛暑解表,化湿和中,主治夏月伤于寒湿之阴暑证。故选A。新加香薷饮祛暑解表,清热化湿,主治暑湿复感于寒湿证。故选B。

158.(A1型题)清暑益气汤的功用是

- A.清暑除烦,益气和胃
- B.清暑益气,养阴生津
- C.清暑利湿,益气和胃
- D.清暑益气,和胃止呕
- E.益气养阴,清透暑热

答案:B

解析:此题暂无解析

159.(A1型题)治疗暑湿袭表证之高热,应首选:

- A.银翘散
- B.麻杏石甘汤
- C.甘露消毒丹
- D.新加香薷饮
- E.清骨散

答案:D

解析:■A辛凉解表、清热解毒,主治温病初起,温邪初犯肺卫证。B辛凉宣泄,清肺平喘,主治表邪未解,肺热壅盛证。C利湿化浊,清热解毒,主治湿温时疫之湿热并重证。D祛暑解表,清热化湿,主治暑湿夹湿,复感于寒证。E清虚热,退骨蒸,主治骨蒸潮热之证。故本题选D。二、

160.(B型题)理中丸主证病机涉及的主要脏腑是

- A.肝脾
- B.肝胃
- C.脾胃
- D.肝肾
- E.脾肾

答案:C

解析:此题暂无解析

161.(A1型题)四逆汤与四逆散两方组成中均含有的药物是

- A.柴胡
- B.枳实
- C.干姜
- D.芍药
- E.甘草

答案:E

解析:此题暂无解析

162.(A1型题)吴茱萸汤和理中丸两方组成中均含有的药物是

- A.吴茱萸
- B.人参
- C.干姜
- D.大枣
- E.白术

答案:B

解析:此题暂无解析

163.(A1型题)四逆汤和理中丸两方组成中均含有的药物是

- A.附子
- B.人参
- C.桂枝
- D.干姜
- E.白术

答案:D

解析:此题暂无解析

164.(A1型题)不适宜用吴茱萸汤治疗的病证是

- A.胃中虚冷,症见食谷欲呕者
- B.肝寒上逆,症见头痛、干呕、吐涎沫者
- C.肾阳不足,寒气内甚,症见吐利、手足逆冷者
- D.肝寒犯胃,症见脘腹冷痛、呕吐酸水者
- E.脾胃阳虚,阴寒上乘,症见胸满而痛,甚至胸痛彻背者

答案:E

解析:此题暂无解析

165.(A1型题)温经汤的君药是

- A.当归、川芎

- B.当归、肉桂
- C.当归、吴茱萸
- D.吴茱萸、桂枝
- E.当归、桂枝

答案:D

解析:◎其中吴茱萸、桂枝温经散寒,通利血脉,共为君药。当归、川芎活血祛瘀,养血调经;牡丹皮活血散瘀,清血分虚热,共为臣药。阿胶养血止血,滋阴润燥;白芍养血敛阴,柔肝止痛;麦冬养阴清热;人参、甘草益气健脾,以资生化之源;半夏、生姜通降胃气;生姜温胃气以助生化,以上均为佐药。甘草尚能调和诸药,兼为使药。

166.(A1型题)下列各项,不属理中丸主治范围的是

- A.阳虚失血
- B.脾胃虚寒之腹痛
- C.中焦虚寒之小儿慢惊风
- D.肝胃虚寒之胃脘痛
- E.脾胃虚寒之胸痹

答案:D

解析:■理中丸主治:①脾胃虚寒证。脘腹绵绵作痛,喜温喜按,呕吐,大便稀溏,脘痞食少,畏寒肢冷,口不渴,舌淡苔白润,脉沉细或沉迟无力。②阳虚失血证。便血、吐血、衄血或崩漏等,血色暗淡,质清稀。③脾胃虚寒所致的胸痹;或病后多涎唾;或小儿慢惊等。故本题选D。

167.(A1型题)组成中无白芍的方剂是:

- A.逍遥散
- B.蒿芩清胆汤
- C.大柴胡汤
- D.痛泻要方
- E.四逆散

答案:B

解析:此题暂无解析

168.(A1型题)患者见往来寒热,腹痛便秘,舌红苔黄,脉弦数。治宜选方

- A.银翘散
- B.麻杏甘石汤
- C.防风通圣散
- D.大柴胡汤
- E.桑菊饮

答案:D

解析:此题暂无解析

169.(A1型题)大柴胡汤的功效是:

- A.透邪解郁,疏肝理脾
- B.和解少阳,内泻热结
- C.疏肝补脾,胜湿止泻
- D.疏风解表,清热通便
- E.和解少阳

答案:B

解析:此题暂无解析

170.(A1型题)下列除哪项外, 均是防风通圣散主治病证的临床表现

- A.憎寒壮热
- B.头目眩晕
- C.目赤睛痛
- D.大便秘结
- E.郁微烦

答案:E

解析:◎防风通圣散主治的症状有憎寒壮热, 目赤睛痛, 头目眩晕, 大便秘结等症状, 但是没有郁而烦之证。

171.(B型题)玉屏风散和补中益气汤均可用治

- A.脾肺气虚, 自汗易感者
- B.脾胃气虚, 食少脘胀者
- C.气血不足, 心悸怔忡者
- D.脾阳不足, 吐衄便血者
- E.肝肾不足, 腰膝酸软者

答案:A

解析:此题暂无解析

172.(B型题)肾气丸和地黄饮子两方组成药物中均含有

- A.炮附子山茱萸
- B.炮附子肉桂
- C.枸杞子菟丝子
- D.山茱萸牛膝
- E.鹿角胶龟板胶

答案:A

解析:此题暂无解析

173.(B型题)属于大补阴丸主治特征的是

- A.牙痛齿摇
- B.骨蒸盗汗
- C.烦渴欲饮
- D.腰膝酸软
- E.食少便溏

答案:B

解析:此题暂无解析

174.(B型题)一贯煎和六味地黄丸两方的治病机理均涉及

- A.滋水涵木
- B.扶土御木
- C.培土生金
- D.清金制木
- E.补火生土

答案:A

解析:此题暂无解析

175.(B型题)肉豆蔻在四神丸中的作用是

- A.温经散寒
- B.温肾暖脾
- C.温肾纳气
- D.温脾暖胃
- E.温肾暖肝

解析:此题暂无解析

答案:D

176.(B型题)功能敛肺止咳的方剂是

- A.止嗽散
- B.九仙散
- C.固经丸
- D.一贯煎
- E.右归丸

解析:此题暂无解析

答案:B

177.(A1型题)身常汗出,夜卧尤甚,久而不止,心悸惊惕,短气烦倦者,治疗应选用

- A.牡蛎散
- B.归脾汤
- C.补中益气汤
- D.四物汤
- E.黄土汤

解析:此题暂无解析

答案:A

178.(A1型题)牡蛎散中功专收敛止汗的药物是

- A.煅牡蛎
- B.麻木黄根
- C.生黄芪
- D.小麦
- E.白术

解析:此题暂无解析

答案:B

179.(A1型题)九仙散的组成药物中含有

- A.乌药生枳壳
- B.知母密蒙花
- C.人参桑白皮
- D.山药五倍子
- E.诃子炙黄芪

解析:此题暂无解析

答案:C

180.(A1型题)属于固湿剂适应范围的病证是

- A.血热崩漏

- B.肺虚久咳
- C.火动遗精
- D.伤食泄泻
- E.热病多汗

解析:此题暂无解析

答案:B

181.(A1型题)四神丸的组成药物中含有

- A.草豆蔻
- B.白豆蔻
- C.肉豆蔻
- D.砂仁
- E.厚朴

解析:◎四神丸组成药物有肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。

答案:C

182.(B型题)肝血不足，虚热内扰而心悸失眠者，治宜选用

- A.归脾汤
- B.酸枣仁汤
- C.天王补心丹
- D.朱砂安神丸
- E.甘麦大枣汤

解析:此题暂无解析

答案:B

183.(B型题)肝血不足而虚烦不眠者，治宜选用

- A.酸枣仁汤
- B.天王补心丹
- C.归脾汤
- D.磁朱丸
- E.甘麦大枣汤

解析:此题暂无解析

答案:A

184.(B型题)心肾两虚，水火不济而尿频健忘者，治宜选用

- A.六味地黄丸
- B.天王补心丹
- C.桑螵蛸散
- D.金锁固精丸
- E.大补阴丸

解析:此题暂无解析

答案:C

185.(B型题)天王补心丹的功用是

- A.补肾宁心，益智安神
- B.养血安神，清热除烦
- C.滋阴清热，养血安神
- D.镇心安神，泻火养阴

E.养心安神, 和中缓急

答案:C

解析:此题暂无解析

186.(A1型题)酸枣仁汤的组成药物中含有

A.知母

B.茯神

C.远志

D.柏子仁

E.龙眼肉

答案:A

解析:此题暂无解析

187.(A1型题)天王补心丹中配伍茯苓意义

A.健脾

B.宁心

C.渗湿

D.利水

E.消痰

答案:B

解析:此题暂无解析

188.(A1型题)朱砂安神丸组成中含有的药物是

A.栀子

B.黄连

C.石膏

D.竹叶

E.知母

答案:B

解析:①朱砂安神丸组成中含有的药物有朱砂、黄连、甘草、当归、生地黄。

189.(A1型题)甘麦大枣汤除养心安神, 和中缓急外, 还具有的功用是

A.补心血

B.补脾气

C.益肝血

D.滋肾水

E.益脾阴

答案:B

解析:②甘麦大枣汤的功用有养心安心, 和里缓急和补脾气的功用, 所以甘麦大枣汤除养心安神, 和中缓急外, 还具有的功用是补脾气。

190.(B型题)紫雪长于

A.清热解毒

B.息风止痉

C.化浊开窍

D.行气止痛

E.通便散结

答案:B

解析:此题暂无解析

191.(A1型题)下列哪项不属于安宫牛黄丸的辨证要点

- A.高热烦躁
- B.神昏谵语
- C.斑疹吐衄
- D.舌红或降
- E.脉数

答案:C

解析:此题暂无解析

192.(B型题)柴胡疏肝散的功用是

- A.疏肝行气，活血止痛
- B.降气平喘，祛痰止咳
- C.降气快膈，化痰消食
- D.清热化痰，理气止咳
- E.宣肺降气，清热化痰

答案:A

解析:此题暂无解析

193.(B型题)暖肝煎的组成药物中含有

- A.木通
- B.当归
- C.厚朴
- D.木香
- E.栀子

答案:B

解析:此题暂无解析

194.(B型题)天台乌药散的功用是

- A.疏肝泄热，活血止痛
- B.行气疏肝，散寒止痛
- C.温补肝肾，行气止痛
- D.行气止痛，软坚散结
- E.行气除满，温中燥湿

答案:B

解析:此题暂无解析

195.(B型题)主治胸痹的方剂是

- A.十枣汤
- B.大陷胸汤
- C.苇茎汤
- D.泻白散
- E.枳实薤白桂枝汤

答案:E

解析:此题暂无解析

196.(A1型题)下列各项中, 不属于苏子降气汤组成药物的是

- A.生姜苏叶
- B.前胡甘草
- C.杏仁白前
- D.半夏厚朴
- E.当归肉桂

答案:C

解析:此题暂无解析

197.(A1型题)半夏厚朴汤配伍苏叶的意义不包括

- A.行气
- B.理肺
- C.舒肝
- D.散郁
- E.散寒

答案:E

解析:此题暂无解析

198.(A1型题)下列何药不是天台乌药散的组成药物

- A.木香
- B.青皮
- C.槟榔
- D.香附
- E.巴豆

答案:D

解析:此题暂无解析

199.(A1型题)越鞠丸中以行气为主的药物是

- A.木香
- B.沉香
- C.香附
- D.枳壳
- E.厚朴

答案:C

解析:●越鞠丸由苍术、香附、川芎、神曲、栀子组成, 有行气解郁的功用, 治疗气郁所致的胸膈痞闷, 脘胀满, 喧腐吞酸, 恶性呕吐, 饮食不消等病证。本方重于行气解郁, 气机流畅, 则痰、火、湿、食诸郁自解。香附行气解郁为君, 以治气郁, 川芎治血郁, 栀子治火郁, 苍术治疗湿郁, 神曲治食郁, 均为辅助药物。本方重于行气解郁, 用香附以行气解郁, 以治气郁, 为主要药物。

200.(A1型题)旋覆花、代赭石在旋复代赭汤中的配伍意义是

- A.温胃化痰止呕
- B.平冲降逆止呕
- C.祛痰降逆和胃
- D.镇冲逆除噫气
- E.化痰消食和胃

答案:D

解析:◎旋覆花善于下气,化痰,重用下气化痰为君药;代赭石质重降逆,助君降逆化痰,半夏祛痰和胃,生姜温胃化痰,散寒止呕,共为臣药;人参、大枣、炙甘草健脾养胃,温中益气,为佐药;甘草调和诸药为使。

201.(A1型题)属于天台乌药散组成药物的是

- A.川楝子
- B.陈皮
- C.草豆蔻
- D.肉桂
- E.厚朴

答案:A

解析:◎天台乌药散组成药物有天台乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆、甘草。天台乌药散组成药物的是川楝子。

202.(A1型题)实脾散的功用是

- A.健脾和胃,消食止泻
- B.益气健脾,渗湿止泻
- C.健脾和胃,消痞除满
- D.温阳健脾,行气利水
- E.燥湿运脾,行气和胃

答案:D

解析:◎实脾散温阳健脾,行气利水。主治脾肾阳虚,水气内停之阴水

203.(A1型题)二妙散的功用是

- A.清热利水
- B.清热燥湿
- C.清热养阴
- D.利湿消肿
- E.解毒化湿.

答案:B

解析:■二妙散清热燥湿止痒。故本题选B。

204.(A1型题)胸胁支满,目眩心悸,短气而咳,舌苔白滑,脉弦滑者,治宜选用

- A.十枣汤
- B.五苓散
- C.真武汤
- D.五皮散
- E.苓桂术甘汤

答案:E

解析:■A攻逐水饮,主治悬饮、实水。B利水渗湿,温阳化气,主治伤寒太阳膀胱蓄水证、水湿内停之水肿、痰饮内停证。C温阳利水,主治脾肾阳虚,水饮内停证。D利水消肿,行气祛湿,主治水停气滞之皮水证。E温化痰饮,健脾利湿,主治中阳不足之痰饮,症见:形体消瘦,胸脘胀满,纳呆呕吐,胃中振水音或肠鸣漉漉,便溏或背部寒冷,头昏目眩,心悸气短。舌苔白润,脉弦滑等。故本题选E。二、

205.(B型题)活动期湿热痹阻证的中医治法是

- A.清热利湿,祛风通络

- B.养阴清热，祛风通络
- C.祛风散寒，清热化湿
- D.益肝肾，补气血，祛风湿，通经络
- E.活血化瘀，祛痰通络

答案:A

解析:此题暂无解析

206.(B型题)诊断类风湿关节炎最有价值的检查是

- A.血沉增快
- B.类风湿因子阳性
- C.补体C3增高
- D.白细胞计数减少
- E.血常规正常

解析:此题暂无解析

答案:B

207.(B型题)瘀热痹阻证，治疗应首选的方剂是

- A.玉女煎合增液汤
- B.济生肾气丸
- C.八珍汤
- D.犀角地黄汤
- E.茵陈蒿汤合柴胡疏肝散

答案:D

解析:此题暂无解析

208.(B型题)治疗类风湿性关节炎肾虚寒凝证，应首选

- A.蠲痹汤
- B.三痹汤
- C.独活寄生汤
- D.六味地黄丸
- E.虎潜丸

解析:此题暂无解析

答案:C

209.(B型题)治疗系统性红斑狼疮阴虚内热证，应首选

- A.清瘟败毒饮
- B.犀角地黄汤
- C.玉女煎合增液汤
- D.茵陈蒿汤合柴胡疏肝散
- E.葶苈大枣泻肺汤合泻白散

答案:C

解析:■治疗系统性红斑狼疮气营热盛证，应首选清瘟败毒饮。治疗系统性红斑狼疮阴虚内热证，应首选玉女煎合增液汤。故选A，选C。B用于郁热痹阻证。D用于郁热伤肝证，E用于热郁积饮证。

210.(A1型题)系统性红斑狼疮属中医学中的

- A.风寒湿痹
- B.风湿热痹
- C.肚痹
- D.鹤膝风
- E.蝶疮流注

答案:E

解析:●根据系统性红斑狼疮典型的临床表现特点:面部蝶形红斑,皮疹,口腔黏膜水泡、溃疡,游走性、多发性关节红肿热痛等,与中医的"蝶疮流注"表现相似。

211.(A1型题)对诊断尪痹最有意义的实验室检查是

- A.血沉
- B.类风湿因子
- C.补体C3
- D.抗核抗体
- E.肾功能

答案:B

解析:●血沉无特异性。类风湿因子见于约70%尪痹患者血清中。抗核抗体及补体C3降低有助于系统性红斑狼疮的诊断。肾功能异常无特异性,只能说明有肾脏损害。

212.(B型题)安眠药中毒的机制是

- A.缺氧
- B.麻醉和抑制作用
- C.局部作用
- D.干扰细胞膜或细胞器生理功能
- E.抑制酶活力

答案:B

解析:●有机磷农药能抑制许多酶,但对人的毒性主要表现在抑制胆碱酯酶。安眠药对中枢神经系统的抑制随剂量的增加,由镇静、催眠到麻痹,以至延髓中枢麻痹。

213.(B型题)重度急性有机磷杀虫药中毒时胆碱酯酶活性是

- A.100%
- B.90%~70%
- C.70%~50%
- D.50%~30%
- E.30%以下

答案:E

解析:此题暂无解析

214.(B型题)糖尿病酮症酸中毒时,有诊断意义的是

- A.呼吸抑制
- B.呼出气有蒜味
- C.呼出气有烂苹果味
- D.呼出气有苦杏仁味
- E.呼出气有氨味

答案:C

解析:此题暂无解析

215.(A1型题)尽快纠正急性一氧化碳中毒组织缺氧应首选的治疗措施是

- A.采用高浓度氧气面罩
- B.注射呼吸兴奋剂
- C.撤离中毒现场
- D.人工呼吸
- E.高压氧舱

解析:此题暂无解析

答案:E

216.(A1型题)轻度有机磷杀虫药中毒时,瞳孔的变化是

- A.缩小
- B.扩大
- C.两侧大小不等
- D.形状不规则
- E.呈乳白色

解析:此题暂无解析

答案:A

217.(A1型题)诊断有机磷杀虫药中毒时,全血胆碱酯酶活性应是

- A.<100%
- B. $\leq 90\%$
- C. $\leq 80\%$
- D. $\leq 75\%$
- E. $\leq 70\%$

解析:此题暂无解析

答案:E

218.(A1型题)有机磷杀虫药中毒的主要机制是

- A.促使乙酰胆碱水解
- B.抑制胆碱酯酶活性
- C.兴奋交感神经系统
- D.抑制心血管运动中枢
- E.抑制呼吸中枢

答案:B

解析:此题暂无解析

219.(A1型题)服毒后最好几小时内洗胃

- A.1
- B.3
- C.6
- D.12
- E.24

答案:C

解析:●一般在服毒后6小时内洗胃有效,因服毒物在6小时内胃中尚有残留,洗胃可以清除未被吸收的毒物。

220.(A1型题)属于胆碱酯酶复活剂的药物是

- A.阿托品
- B.地塞米松
- C.双复磷
- D.西地兰
- E.尼可刹米

解析:此题暂无解析

答案:C

221.(A1型题)下列各项, 不是阿托品化指标的是

- A.抽搐消失
- B.颜面潮红
- C.瞳孔较前增大
- D.心率增快
- E.口干、皮肤干燥

答案:A

解析:◎阿托品化指征为瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、心率增快(90~100次/分)和肺湿啰音消失。此时, 应减少阿托品剂量或停用。如出现瞳孔明显扩大、神志模糊、烦躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等为阿托品中毒, 立即停用阿托品。

222.(B型题)患者突然昏倒, 不知人事, 呼吸气粗, 口噤握拳, 舌苔薄白, 脉伏。其证候是

- A.气厥实证
- B.气厥虚证
- C.血厥实证
- D.血厥虚证
- E.痰厥

解析:此题暂无解析

答案:A

223.(B型题)提出以虚实论治厥证的医著是

- A.《医门法律》
- B.《第三节伤寒论》
- C.《医林改错》
- D.《医学入门》
- E.《景岳全书》

解析:此题暂无解析

答案:E

224.(B型题)突然昏仆, 不省人事, 但发作时间短暂, 且发作时常伴有号叫、抽插、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等, 常反复发作, 每次症状均相类似, 苏醒缓解后可如常人。此为

- A.痫病

- B.眩晕
- C.厥证
- D.昏迷
- E.中风

解析:此题暂无解析

答案:A

225.(B型题)不寐, 心烦胸闷, 泛恶, 喘气, 头重目眩, 口苦, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数, 治疗宜选

- A.朱砂安神丸
- B.龙胆泻肝汤
- C.黄连温胆汤
- D.半夏秫米汤
- E.归脾汤

解析:此题暂无解析

答案:C

226.(B型题)胸闷泛恶, 彻夜不寐, 大便秘结者, 当用

- A.礞石滚痰丸
- B.半夏秫米汤
- C.琥珀多寐丸
- D.保和丸
- E.天王补心丹

解析:此题暂无解析

答案:A

227.(B型题)痰厥治法宜首选

- A.行气豁痰
- B.补气回阳醒神
- C.平肝潜阳, 理气通瘀
- D.开窍顺气解郁
- E.开窍化痰

解析:此题暂无解析

答案:A

228.(A1型题)治疗气厥虚证, 应首选

- A.安宫牛黄丸
- B.补中益气汤
- C.四味回阳饮
- D.四君子汤
- E.通瘀煎

解析:●气厥虚证应补气、回阳、醒神, 故用四味回阳饮益气回阳。

答案:C

229.(A1型题)不寐之痰热扰心证, 其治疗首选方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.黄连温胆汤
- C.归脾汤
- D.六味地黄丸合交泰丸

E.安神定志丸合酸枣仁汤

答案:B

解析:此题暂无解析

230.(A1型题)失眠患者心烦、心悸、梦遗失精者，加用肉桂的目的是

A.温补肾阳

B.健脾和胃

C.温经散寒

D.温通心阳

E.引火归原

答案:E

解析:此题暂无解析

231.(A1型题)发病前有明显的情绪紧张、恐惧、疼痛或站立过久等诱发因素，发作时眩晕昏仆，面色苍白，呼吸微弱，汗出肢冷，舌淡，脉沉细微。治宜选

A.开窍顺气解郁

B.开窍化痰解郁

C.补气养血活血

D.开窍活血顺气

E.补气回阳醒神

答案:E

解析:此题暂无解析

232.(A2型题)患者，女，53岁。腹中可及积块，软而不坚，固着不移，胀痛并见，舌苔薄，脉弦。其证候是

A.肝气郁滞

B.瘀血内结

C.气滞血阻

D.气滞痰阻

E.气虚血瘀

答案:C

解析:●积块-积证；胀痛并见，脉弦-气滞，软而不坚，固着不移-瘀血，故诊断为气滞血阻证，治法：理气消积，活血散瘀。

233.(A2型题)病人腹部胀大3个月余，胁下胀痛不适，纳食欠佳，食后腹胀，小便短少，下肢微肿，面色晦暗，周身皮肤发黄，腹胀大，胁下可触及包块，双下肢按之微肿，苔白腻，脉弦细，应诊断为

A.水肿

B.胁痛

C.黄疸

D.积聚

E.鼓胀

答案:E

解析:此题暂无解析

234.(A2型题)某男，46岁，脘腹坚实，青筋显露，胁下癰结痛如针刺，面色晦暗黧黑，面颈胸臂出现血痣，口干不欲饮水，大便色黑，舌质紫黯，有紫斑，脉细涩。

证属

- A. 胁痛之瘀血停着证
- B. 鼓胀之瘀结水留证
- C. 积聚之瘀血内结证
- D. 鼓胀之水热蕴结证
- E. 鼓胀之正虚瘀结证

答案:B

解析:此题暂无解析

235.(A2型题)男, 36岁。平素性情急躁, 有胃溃疡病史。昨天因大怒, 诱发呕血, 吐血色红, 伴有口苦咽干, 胸胁疼痛, 舌质红绛, 脉象弦数。方剂宜选用

- A. 泻心汤合十灰散
- B. 龙胆泻肝汤合十灰散
- C. 化肝煎合十灰散
- D. 犀角地黄汤
- E. 玉女煎

答案:B

解析:此题暂无解析

236.(A2型题)女, 病由抑郁而起, 症见腹部结块, 或左或右, 走窜不定, 按之略痛, 脘肋胀闷不舒, 喳气频频, 便艰纳呆, 苔薄, 脉弦, 证属

- A. 聚证-肝气郁结
- B. 聚证-食滞痰阻
- C. 积证-气结血瘀
- D. 积证-气郁血阻
- E. 积证-瘀血内结

答案:A

解析:此题暂无解析

237.(A2型题)女, 腹中积块, 按之觉硬, 痛处不移, 面暗消瘦, 体倦乏力, 纳食减少, 时有寒热, 经闭不行, 舌质青紫, 脉涩。辨证属于

- A. 肝郁气滞型
- B. 食滞痰阻型
- C. 气郁血阻型
- D. 瘀血内结型
- E. 正虚瘀结型

答案:D

解析:此题暂无解析

238.(B型题)瘀结水留型鼓胀的主症是

- A. 腹大胀满, 脉络怒张
- B. 腹大胀满, 如囊裹水
- C. 腹大胀满, 早宽暮急
- D. 腹大胀满, 脐腹撑急
- E. 脐腹坚满, 痛如针刺

答案:E

解析:此题暂无解析

239.(B型题)正虚瘀结之积证的代表方首选

- A.八珍汤合化积丸
- B.逍遥散、木香顺气散
- C.六君子汤合化积丸
- D.柴胡疏肝散合失笑散
- E.膈下逐瘀汤、鳖甲煎丸合六君子汤

答案:A

解析:此题暂无解析

240.(B型题)肾精不足型“眩晕”的特点为

- A.眩晕头重如蒙
- B.眩晕动则加剧
- C.眩晕耳鸣，头痛且胀
- D.眩晕且精神委靡
- E.眩晕头痛

答案:D

解析:此题暂无解析

241.(B型题)将鼓胀称为“膨膝”、“蜘蛛蛊”的医著是

- A.《丹溪心法》
- B.《证治要诀》
- C.《医宗必读》
- D.《诸病源候论》
- E.《景岳全书》

答案:B

解析:此题暂无解析

242.(B型题)治疗胁痛瘀血停着证，应首选

- A.龙胆泻肝汤
- B.柴胡疏肝散
- C.旋复花汤
- D.贯煎
- E.茵陈蒿汤

答案:C

解析:此题暂无解析

243.(B型题)瘀血阻络证胁痛代表方是

- A.柴胡疏肝散
- B.龙胆泻肝汤
- C.血府逐瘀汤

D.六味地黄丸

E.一贯煎

解析:此题暂无解析

答案:C

244.(B型题)胁痛肝郁气滞证治疗首选方剂是

A.葛根芩连汤

B.柴胡疏肝散

C.四神丸

D.一贯煎

E.藿香正气散加减

答案:B

解析:此题暂无解析

245.(B型题)湿热砂石阻滞胆道所致胁痛方选

A.血府逐瘀汤合鳖甲丸

B.一贯煎合金铃子散

C.复元活血汤合硝石矾石散

D.乌梅丸合大柴胡汤

E.龙胆泻肝汤合硝石矾石散

答案:E

解析:此题暂无解析

246.(A1型题)鼓胀病名最早见于

A.《第二节金匮要略》

B.《诸病源候论》

C.《第一节内经》

D.《医宗必读》

E.《丹溪心法》

答案:C

解析:此题暂无解析

247.(A1型题)服用十枣汤或舟车丸治疗鼓胀,药后会出现除下列哪项外的副作用

A.泛恶

B.呕吐

C.泻下

D.腹痛

E.头晕

答案:C

解析:此题暂无解析

248.(A1型题)积聚的病位主要在

- A.肺肾
- B.肝肾
- C.肝脾
- D.肝胆
- E.脾肾

解析:此题暂无解析

答案:C

249.(A1型题)首先提出积聚的病名的医著是

- A.《杂病广要》
- B.《第二节金匮要略》
- C.《第一节内经》
- D.《难经》
- E.《诸病源候论》

答案:C

解析:此题暂无解析

250.(A1型题)下列除哪项外,均为眩晕的治法

- A.平肝潜阳,清火熄风
- B.补养气血,健运脾胃
- C.活血化瘀,养心安神
- D.燥湿祛痰,健脾和胃
- E.补肾滋阴或补肾助阳

答案:C

解析:此题暂无解析

251.(A1型题)积证气滞血阻型治疗应予

- A.失笑散
- B.逍遥散
- C.柴胡疏肝散合失笑散
- D.五积散
- E.化积丸

解析:此题暂无解析

答案:C

252.(A2型题)男,21岁,长期偏食,晨起头面肿甚一年,动则下肢肿胀,能食而疲乏无力,纳可,便溏,小便多,舌淡胖大有齿痕苔薄腻,脉软弱。治以何方加减

- A.真武汤
- B.参苓白术散
- C.实脾饮
- D.己椒苈黄丸

E.五皮饮合葶苈大枣泻肺汤

答案:B

解析:此题暂无解析

253.(A2型题)慢性肾功能不全患者表现为全身水肿,有胸腔积液、腹水。治疗应首选的方剂是

A.黄连温胆汤

B.五皮饮或五苓散

C.六君子汤

D.济生肾气丸

E.二妙丸

答案:B

解析:①全身水肿,有胸腔积液、腹水阳水为水湿浸渍证,代表方剂为五皮饮合胃苓散。

254.(B型题)水肿湿热壅盛证,治疗应首选的方剂是

A.越婢加术汤

B.麻黄连翘赤小豆汤

C.实脾饮

D.五皮饮合胃苓汤

E.疏凿饮子

答案:E

解析:此题暂无解析

255.(B型题)属于水肿脾败不治的是

A.面肿苍黑

B.掌肿无纹理

C.阴肿不起

D.腰肿无纹理

E.脐满反肿

答案:E

解析:此题暂无解析

256.(A1型题)治疗水肿风水泛滥证,应首选的方剂是

A.越婢加术汤

B.麻黄连翘赤小豆汤

C.麻黄汤

D.五皮饮

E.胃苓汤

答案:A

解析:此题暂无解析

257.(A1型题)治疗水肿水湿浸渍型的主方是

A.实脾饮

B.真武汤

C.五皮散合胃苓汤

D.越婢加术汤

E.疏凿饮子

答案:C

解析:此题暂无解析

258.(A1型题)水肿病肾阳久衰, 阳损及阴, 应补肾阴兼利水湿, 方用

- A.右归丸加生地、泽泻
- B.左归丸加泽泻、茯苓、冬葵子
- C.济生肾气丸
- D.六味地黄丸
- E.己椒苈黄丸

答案:B

解析:此题暂无解析

259.(A2型题)患者发热, 热势或低或高, 常在劳累后发作, 乏力气短, 自汗, 食少便溏, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。治疗应首选

- A.清骨散
- B.归脾汤
- C.金匮肾气丸
- D.补中益气汤
- E.中和汤

答案:D

解析:●患者发热, 热势或低或高-发热; 乏力气短, 自汗, 便溏-气虚, 治以益气健脾, 甘温除热为法, 补中益气汤主之。

260.(A2型题)患者, 女, 43岁。每于劳累后即出现低热, 头晕乏力, 自汗, 食少便溏, 舌淡苔白、脉弱, 治疗应首选

- A.血府逐瘀汤
- B.补中益气汤
- C.小柴胡汤
- D.清骨散
- E.归脾汤

答案:B

解析:此题暂无解析

261.(A2型题)患者痰多胸闷, 心烦口苦, 舌苔黄腻, 脉滑数。治疗应首选

- A.黄连温胆汤
- B.导痰汤
- C.六磨汤
- D.胃苓汤
- E.二陈汤

答案:A

解析:●痰多胸闷, 苔腻, 脉滑-痰证, 心烦口苦, 舌苔黄, 脉数-热象。除A之外, 余方均无清热作用, 故选之。

262.(A2型题)患者发热, 多为低热, 热势常随情绪波动而起伏, 精神抑郁, 胁肋胀满, 烦躁易怒, 口干而苦, 纳食减少, 舌红, 苔黄, 脉弦数。其中医证型是

- A.痰湿郁热证
- B.血瘀发热证
- C.气郁发热证

D.阴虚发热证

E.阳虚发热证

解析:此题暂无解析

答案:C

263.(A2型题)患者低热，午后热甚，心内烦热，胸闷脘痞，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便稀薄，舌苔白腻，脉濡数。其中医治法是

A.燥湿化痰，清热和中

B.疏肝理气，解郁泻热

C.温补阳气，引火归原

D.益气健脾，甘温除热

E.滋阴清热，发汗解表

答案:A

解析:此题暂无解析

264.(A2型题)患者咳逆阵作，痰中带血，时时汗出，胸胁胀痛，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔薄黄，脉弦数。其诊断是

A.肺痛阴虚火旺证

B.咳血肝火犯肺证

C.喘证肺气郁痹证

D.肺痈成痈期

E.咳嗽痰热郁肺证

答案:B

解析:●咳逆阵作，痰中带血-

咳血，胸胁胀痛，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔薄黄，脉弦数-

木火刑金，肺络受损之征，故诊断为B。

265.(A2型题)患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，喜向右侧偏卧，右侧肋间胀满，舌苔白，脉沉弦。其治法是

A.攻下逐饮

B.和解宣利

C.理气和络

D.泻肺祛饮

E.发表化饮

答案:D

解析:●咳逆气喘，息促不能平卧，喜向右侧偏卧，右侧肋间胀满-饮邪，胸胁疼痛-部位为胸胁，诊断为悬饮饮停胸胁，当泻肺祛饮，方予椒目瓜蒌汤合十枣汤或控涎丹加减。

266.(A2型题)男，36岁。平素性格内向，近日情志不遂，精神抑郁，情绪不宁，善太息，胸胁胀痛，痛无定处，脘闷嗳气，腹胀纳呆，大便时软时干，苔薄腻，脉弦。

辨证属何证

A.肝气郁结

B.气郁化火

C.气滞痰郁

D.心脾两虚

E.忧郁伤神

解析:此题暂无解析

答案:A

267.(A2型题)男, 69岁, 平素体弱多病。现症见腰酸背痛, 小便失禁, 畏寒肢冷, 下利清谷, 舌质淡胖, 苔白, 脉沉迟。此时辨证属于

A.肾阳虚

B.脾阳虚

C.肾阴虚

D.脾气虚

E.肝血虚

解析:此题暂无解析

答案:A

268.(A2型题)患者头痛, 眩晕, 耳鸣, 目干畏光, 视物不明, 急躁易怒, 舌红少津, 脉弦细数。治疗应首选的方剂是

A.补肝汤

B.丹栀逍遥散

C.天王补心丹

D.知柏地黄丸

E.左归丸

解析:此题暂无解析

答案:A

269.(A2型题)患者低热, 头晕眼花; 心悸不宁, 面白少华, 唇甲淡白, 舌质淡, 脉细。其治法是

A.益气养血

B.益气健脾

C.滋阴清热

D.活血化瘀

E.疏肝清热

答案:A

解析:◎根据题干所述, 可以明确诊断为内伤发热, 证型为营血亏虚证。营血亏虚, 阴不配阳, 故可出现上述症状。治疗宜选用益气养血之法。益气健脾适用于气虚发热证。滋阴清热适用于阴虚发热证。活血化瘀适用于淤血发热证。疏肝清热适用于气郁发热证。

270.(B型题)虚劳心阴虚证, 治疗应首选的方剂是

A.四物汤

B.沙参麦冬汤

C.天王补心丹

D.益胃汤

E.养心汤

解析:此题暂无解析

答案:C

271.(B型题)对瘀血发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是

A.钱乙

- B.朱丹溪
- C.李东垣
- D.张景岳
- E.王清任

解析:此题暂无解析

答案:E

272.(B型题)气郁化火型治法宜

- A.疏肝理气解郁
- B.清肝泻火, 解郁和胃
- C.养心安神
- D.健脾养心, 益气补血
- E.滋阴清热, 镇心安神

答案:B

解析:此题暂无解析

273.(B型题)在虚证的治疗中, 重视肝肾, 善用滋阴降火的医家是

- A.张仲景
- B.李东垣
- C.朱丹溪
- D.张景岳
- E.李中梓

答案:C

解析:此题暂无解析

274.(B型题)治疗悬饮邪犯胸肺证宜选用

- A.柴枳半夏汤
- B.香附旋覆花汤
- C.椒目瓜蒌汤合十枣汤
- D.沙参麦冬汤合泻白散
- E.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤

答案:A

解析:此题暂无解析

275.(B型题)治疗虚劳肾阴虚证, 应首选

- A.附子理中丸
- B.济生肾气丸
- C.都气丸
- D.左归丸
- E.右归丸

答案:D

解析:●虚劳脾阳虚证治当温中健脾, 方用附子理中汤;虚劳肾阳虚证治当温补肾阳, 方予右归丸。

276.(A1型题)治痿慎用

- A.清热药
- B.滋阴药

- C.风药
- D.健脾药
- E.活血药

解析:此题暂无解析

答案:C

277.(A1型题)下列不是外感腰痛的致病病邪的是

- A.风
- B.寒
- C.湿
- D.热
- E.燥

解析:此题暂无解析

答案:E

278.(A1型题)除下列哪项外,均为形成痿证的病理

- A.肺热伤津
- B.湿热浸淫
- C.脾胃虚寒
- D.肝肾亏虚
- E.肝火犯肺

解析:此题暂无解析

答案:E

279.(A1型题)肢体困重,萎软无力,下肢痿弱为甚,手足麻木,扪之微热,喜凉恶热,胸脘痞闷,治疗该证的代表方为

- A.三仁汤
- B.茵陈蒿汤
- C.加味二妙散
- D.胃苓汤
- E.藿香正气散

解析:此题暂无解析

答案:C

280.(A1型题)腰痛发病的关键是

- A.寒湿
- B.湿热
- C.肾虚
- D.气滞
- E.血瘀

解析:此题暂无解析

答案:C

281.(A1型题)痿证见手足痿弱,形体瘦削,肌肤甲错者为瘀血久留,可用

- A.补阳还五汤
- B.圣愈汤送服大黄廑虫丸
- C.身痛逐瘀汤
- D.桃红四物汤
- E.六味地黄丸

答案:B

解析:此题暂无解析

282.(A1型题)肢体筋脉弛缓,软弱无力,日久因不能随意运动而肌肉萎缩的病证是

- A.痉证
- B.痹证
- C.痿证
- D.厥证
- E.痫证

答案:C

解析:此题暂无解析

283.(A1型题)外感所致腰痛,总离不开下列哪种邪气为患?

- A.寒邪
- B.湿邪
- C.热邪
- D.风邪
- E.火邪

答案:B

解析:此题暂无解析

284.(A1型题)夹脊入腰中的经脉是

- A.足少阴经
- B.足太阳经
- C.足厥阴经
- D.手太阳经
- E.手少阳经

答案:B

解析:此题暂无解析

285.(B型题)口腔黏膜消毒,应首选

- A.甲醛
- B.石炭酸
- C.0.1%新洁尔灭
- D.0.5%亚硝酸钠
- E.2.5%碘酊

答案:C

解析:此题暂无解析

286.(A1型题)采用化学消毒剂消毒时,甲醛主要适用的是

- A.刀片
- B.剪刀
- C.纱布
- D.被服
- E.导尿管

答案:E

解析:●甲醛气体熏蒸法主要适用于不能浸泡且不耐高热的器械和物品的消毒;如丝线、纤维内窥镜、精密仪器、手术视野照明灯、电线等。刀片、剪刀为锐利器械

适用于药物浸泡消毒如戊二醛消毒；纱布、被服耐高温高压，适用于高压蒸气消毒。故选E。

287.(A1型题)手术时对患者手术区皮肤消毒，以下正确的是

- A.常用消毒剂是25%碘酊和70%乙醇
- B.消毒范围应包括手术切口周围10cm的区域
- C.对婴儿、口腔、肛门、外生殖器、面部皮肤等处可以使用碘酊消毒
- D.消毒步骤应该自上而下，自外周向切口中心
- E.对感染伤口或肛门等处手术，应自手术区外周逐渐涂向感染伤口或会阴肛门处消毒

答案:E

解析:此题暂无解析

288.(A1型题)婴儿面部的皮肤消毒，应采取

- A.2.5%碘酊擦涂2次
- B.0.75%碘酊擦涂2次
- C.0.1%新洁尔灭擦涂2次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂1次
- E.70%酒精擦涂1次

答案:C

解析:●对婴儿、面部皮肤、口腔、肛门、外生殖器等部位不能使用碘酊消毒者，可选用刺激性小的0.1%洗必泰、0.1%硫柳汞、0.75%聚烯吡酮碘、0.1%新洁尔灭等擦涂2~3次，以免刺激皮肤或黏膜。故选C。

289.(A1型题)关于煮沸灭菌，下列哪项说法不当

- A.持续煮沸20分钟可杀灭一般细菌
- B.要杀灭带芽胞的细菌需持续煮沸1小时
- C.一般压力锅的最高温度可达124°C
- D.水中加入碳酸氢钠是因为碱性化学作用有助于杀灭细菌
- E.在2%碳酸氢钠溶液中煮沸灭菌有防止金属器械生锈的作用

答案:D

解析:①提高灭菌效果可加入可加入抑菌剂，如三氯叔丁醇、甲酚、氯甲酚等。

290.(B型题)对于颈部强直、颈椎骨折、脱臼等颈部活动受限者应选用

- A.经鼻盲探插管法
- B.经鼻腔明视插管法
- C.经口盲探气管内插管法
- D.清醒气管内插管法
- E.双腔支气管导管(DLT)插管术

答案:C

解析:此题暂无解析

291.(B型题)苯巴比妥属于

- A.镇静安定药
- B.催眠药

- C. 麻醉性镇痛药
- D. 抗胆碱类药
- E. 稳定血流动力学药

答案:B

解析:此题暂无解析

292.(B型题)吸人麻醉, 应首选

- A. 普鲁卡因
- B. 乙醚
- C. 利多卡因
- D. 硫喷妥钠
- E. 布比卡因

解析:此题暂无解析

答案:B

293.(A1型题)拔管后病人应采取的体位是

- A. 平卧位
- B. 侧卧位
- C. 俯卧位
- D. 头高位
- E. 头转向一侧

解析:此题暂无解析

答案:E

294.(A1型题)下列不属于硬膜外麻醉禁忌证的是

- A. 糖尿病
- B. 严重休克
- C. 血液凝固障碍性疾病
- D. 低血压或严重高血压
- E. 脊柱畸形或脊柱类风湿性关节炎

答案:A

解析:此题暂无解析

295.(A1型题)局麻药内加肾上腺素的主要目的是

- A. 预防过敏反应
- B. 延缓药物吸收, 延长作用时间
- C. 使局部血管收缩, 减少出血
- D. 预防术中血压下降
- E. 预防术中脉搏减慢

答案:B

解析:此题暂无解析

296.(A1型题)下列各项, 不属局部麻醉的是

- A. 局部浸润麻醉
- B. 静脉麻醉
- C. 表面麻醉

- D.区域阻滞麻醉
- E.神经阻滞麻醉

答案:B

解析:●麻醉方法包括针刺镇痛与辅助麻醉、局部麻醉、椎管内麻醉、全身麻醉及复合麻醉。局部麻醉是指应用局部麻醉药作用于机体的某一部位使感觉神经传导功能暂时被阻滞，从而达到麻醉镇痛的效果。它包括：表面麻醉、局部浸润麻醉、区域阻滞麻醉、神经阻滞麻醉。故选B。

297.(A1型题)下列除哪项外，其它均属于腰麻(蛛网膜下腔阻滞)术后的并发症

- A.尿潴留
- B.呼吸抑制
- C.颅神经麻痹
- D.马尾丛综合征
- E.化脓性脑脊髓膜炎

答案:E

解析:■蛛网膜下腔阻滞时，局麻要选择性透过软膜直接作用于脊神经根，部分直接作用于脊髓表面。对生理的影响主要表现在循环、呼吸、自主神经系统三方面，其影响程度与麻醉阻滞范围关系密切。常见的术后并发症为头痛、尿潴留、神经系统损害、背痛等。故本题选E。二、

298.(B型题)肠内营养糖代谢紊乱可发生

- A.吸入性肺炎
- B.鳞状脱屑、脱发
- C.全身感染
- D.高渗性非酮性昏迷
- E.胆囊结石、胆汁淤积

答案:D

解析:此题暂无解析

299.(B型题)肠外营养本身可发生

- A.误吸
- B.腹胀、腹泻
- C.微量元素缺乏
- D.高渗性非酮性昏迷
- E.胆囊结石、胆汁淤积

答案:E

解析:此题暂无解析

300.(B型题)高钾血症的常见病因是

- A.急性肠梗阻
- B.感染性休克
- C.肺炎高热
- D.慢性十二指肠瘘
- E.挤压综合征

答案:E

解析:●低渗性脱水常见病因为:1胃肠道消化液长期丧失;2大面积创伤渗液;3大量应用排钠性利尿剂时,未注意补充适量钠盐;4急性肾衰竭多尿期、失盐性肾炎、肾小管酸中毒、Addison病等导致肾脏排钠增多,又补充了水分。故选D。2.代谢性酸中毒常见病因:1碱性物质丢失过多,如腹泻、肠瘘等;2酸性物质过多,如休克、乙醇中毒、抽搐、心搏骤停、剧烈运动时引起组织缺氧、糖酵解增加等;3肾功能不全。故选B。3.高钾血症常见病因:1进入体内的钾太多,如口服或静脉输钾;2肾排钾功能减退,如急性、慢性肾衰竭;3细胞内钾释出或外移,如溶血、大面积烧伤、急性酸中毒、组织损伤(如挤压综合征)等。故选E。