

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷三 【301-450题】

金英杰医学教育

301.(A1型题)下列高钾血症的治疗原则中,哪项是错误的

- A.立即停止钾盐摄入
- B.积极防治心律失常
- C.降低血钾浓度
- D.恢复肾脏功能
- E.补充血容量

答案:E

解析:此题暂无解析

302.(A1型题)呼吸性酸中毒应最先解决的问题是

- A.肺部感染,使用大量抗生素
- B.进行人工呼吸
- C.应用呼吸中枢兴奋剂
- D.解除呼吸道梗阻,改善肺换气功能
- E.给予碱性液体

答案:D

解析:此题暂无解析

303.(A1型题)血清钾浓度大于mmol/L称高钾血症

- A.3.5
- B.4
- C.4.5
- D.5
- E.5.5

答案:E

解析:此题暂无解析

304.(A2型题)患者,男,30岁。输血后4~5min.即出现寒战,高热,头痛,腰背剧痛,心前区压迫感,全身有散在性荨麻疹,血压为11/8kPa(80/60mmHg),血浆呈粉红色。应首先考虑的是

- A.发热反应
- B.过敏反应
- C.溶血反应
- D.细菌污染反应
- E.橡酸盐中毒

答案:C

解析:■输血后发热反应主要表现为畏寒、寒战和高热,体温可上升至39—40°C,同时伴有头痛、出汗、恶心、呕吐及皮肤潮红。多发于输血开始后15min—2h内,症状持续30min至2h后逐渐缓解。过敏反应主要表现为皮肤局限性或全身性瘙痒或荨麻疹。溶血反应典型的表现为输血后,立即出现沿输血静脉的红肿及疼痛,伴寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、头痛、胸闷,心率加快甚至血压下降、休克,随之出现血红蛋白尿和溶血性黄疸,继而出现少尿、无尿及急性肾衰竭。细菌污染反应轻者仅有发热反应,重者可出现内毒素性休克和DIC。表现为烦躁、寒战、高热呼吸困难、恶心、呕吐、发绀和腹痛。也可以出现血红蛋白尿、急性肾衰竭、肺水肿,甚至死亡。故本题选C。三、

305.(B型题)针对输血的细菌污染反应,应采取

- A.停止输血,积极抗休克,维持循环功能,保护肾功能和防治弥散性血管内凝血
- B.保证血源质量,防止血源污染,严格无菌操作
- C.主要措施为抗体克、抗感染
- D.立即停止输血,半坐位,吸氧和利尿
- E.立即减慢输血速度,严重者停止输血

答案:C

解析:此题暂无解析

306.(B型题)在短时间内输入所需血量者,适用于

- A.大出血
- B.中度缺水
- C.纠正贫血和低蛋白血症
- D.严重感染
- E.凝血异常

答案:A

解析:●输血的速度应根据患者的具体情况决定,大量出血、失血性休克抢救或动脉输血时速度要快。一般情况一次输血不应超过4小时,为避免室温下引起细菌繁殖每次以200~400ml为宜;急性大出血时应加压、快速输入所需血量以纠正血压。

307.(A1型题)下列哪项不属于输血适应证

- A.凝血机制异常和出血性疾病
- B.重症感染
- C.黄疸
- D.器官移植
- E.低蛋白血症

答案:C

解析:此题暂无解析

308.(B型题)患者阑尾切除术后5天,体温一直在38.5°C~39.2°C,并出现腹泻10次/日,伴里急后重,应考虑的诊断是

- A.切口裂开
- B.手术后出血
- C.盆腔脓肿
- D.尿路感染
- E.切口感染

答案:C

解析:此题暂无解析

309.(B型题)肝脾破裂出血应选择

- A.紧急手术
- B.急诊手术
- C.限期手术
- D.择期手术
- E.分期手术

答案:A

解析:此题暂无解析

310.(A1型题)术后常见循环系统并发症不包括

- A.高血压
- B.心搏骤停
- C.严重心律失常
- D.心绞痛
- E.低血压

答案:E

解析:此题暂无解析

311.(A1型题)鼻胃管的作用不包括

- A.减轻由于手术、麻醉、术后胃肠运动抑制所引起的胃肠胀气
- B.促使术后胃肠蠕动的恢复
- C.早期发现吻合口出血、急性胃黏膜病变等
- D.辅助呼吸
- E.补充丢失的胃肠液

答案:D

解析:此题暂无解析

312.(A1型题)术后一般监测不包括

- A.心电监测
- B.肾功能监测
- C.血容量监测
- D.呼吸功能监测
- E.体温监测

答案:C

解析:此题暂无解析

313.(A1型题)下列关于术后腹胀的处理不正确的是

- A.持续胃肠减压,放置肛管
- B.高渗液低压灌肠
- C.大多需要手术治疗
- D.新斯的明做足三里封闭
- E.胃管注入大承气汤

答案:C

解析:①腹胀是胃肠道功能受抑制、肠腔内积气过多所致。胃肠道功能恢复后可自行缓解。术后数日仍有腹胀不排气、无肠鸣音或减弱,可能是肠麻痹所致;如腹胀伴有阵发性绞痛、肠鸣音亢进,或闻及气过水声,多是肠粘连或其他原因所致的机械性肠梗阻。处理:持续性胃肠减压、肛管排气、高渗盐水灌肠等。有时需手术治疗。如为非胃肠道手术者,可以给新斯的明肌内注射。二、

314.(B型题)持续痛,影响休息的疼痛属于

- A.0度(无痛)
- B.I度(轻度疼痛)
- C.II度(中度疼痛)

D.III度(重度疼痛)

E.IV度(严重疼痛)

答案:C

解析:此题暂无解析

315.(A1型题)下列属于神经破坏性药物的是

A.阿米替林

B.哌替啶

C.芬必得

D.酚甘油

E.地西泮

答案:D

解析:此题暂无解析

316.(A1型题)若疼痛剧烈,伴有植物神经功能紊乱,严重干扰睡眠,被动体位,必须依靠止痛治疗,按主诉分级法,属于

A.0级:无痛

B.1级:轻度疼痛

C.2级:中度疼痛

D.3级:重度疼痛

E.4级:严重疼痛

答案:D

解析:此题暂无解析

317.(A1型题)重症胰腺炎的手术治疗原则中不包括

A.胰腺穿刺

B.规则性胰腺切除术

C.坏死组织清除术

D.胰周引流术

E.三腔造口

答案:A

解析:②重症胰腺炎的手术治疗原则:规则性胰腺切除术、坏死组织清除术、胰周引流术、三腔造口。

318.(A1型题)下列各项,适用采取“补法”的是

A.蜂窝织炎中期,热毒炽盛

B.初期肿疡

C.溃疡后期,疮口难敛

D.蜂窝织炎已成脓

E.溃疡早期

答案:C

解析:■中医外科内治原则包括消法、托法和补法。消法适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病及各种皮肤疾病。托法适用于外疡中期及成脓期。补法适用于溃疡后期,此期毒势已去,精神衰疲,血气虚弱,创口难敛。C为溃疡后期,可用补法。故本题选C。

319.(B型题)属于血管损伤的是

- A.腹腔内缺血
- B.戳孔疝
- C.腹壁坏死性筋膜炎
- D.肝外胆管损伤
- E.肠系膜血管损伤

答案:E

解析:此题暂无解析

320.(B型题)属于CO₂气腹相关的并发症是

- A.腹腔内缺血
- B.戳孔疝
- C.腹壁坏死性筋膜炎
- D.肝外胆管损伤
- E.肠系膜血管损伤

答案:A

解析:此题暂无解析

321.(A1型题)下列哪项目前不属于腹腔镜手术适应证

- A.胆囊切除术
- B.肝叶切除术
- C.淋巴结清扫术
- D.结肠切除术
- E.疝修补术

答案:B

解析:此题暂无解析

322.(A1型题)目前仍在探索的腹腔镜手术不包括

- A.胃切除术
- B.Whipple手术
- C.门静脉转流术
- D.门静脉断流术
- E.解剖性肝切除术

答案:A

解析:此题暂无解析

323.(A1型题)下列哪项为腹腔镜术后CO₂气腹相关并发症

- A.肠粘连
- B.胆漏
- C.内出血
- D.下肢静脉淤血和血栓形成
- E.腹壁血肿

答案:D

324.(A1型题)下列各项, 不属腹腔镜检查禁忌证的是

- A.盆腹腔粘连严重者

- B.腹腔内出血较多
- C.高血压、冠心病
- D.急性盆腔炎
- E.严重呼吸系统疾病

答案:D

解析:①急性盆腔炎一般表现为下腹痛、寒战、高热、头痛、纳差、阴道分泌物多、经量增多、经期延长;以抗生素治疗为主,一般不给予腹腔镜手术治疗。

325.(A2型题)患者,男,50岁,发现乙肝8年,黑便半个月,胃镜检查发现食道、胃底静脉曲张。其门脉高压阻塞部位在

- A.窦后
- B.窦内
- C.窦前
- D.肝前
- E.肝后

解析:此题暂无解析

答案:B

326.(A2型题)患者,男,46岁,慢性乙肝史8年,肝硬化,门脉高压,发生大量呕血,考虑食道胃底静脉曲张破裂出血。首选止血措施为

- A.三腔二囊管压迫
- B.胃内注射或口服去甲肾上腺素
- C.胃管注入冰水
- D.使用生长抑素
- E.内镜治疗

解析:此题暂无解析

答案:D

327.(A2型题)患者,男,56岁,患肝病反复发作20余年,近日出现乏力、嗜睡、厌食、脾肿大、脾功能亢进、腹水,应首先考虑的诊断是

- A.急性肝炎
- B.肝硬化
- C.黑热病
- D.门脉高压症
- E.肝性脑病

解析:此题暂无解析

答案:D

328.(A1型题)门静脉高压的手术治疗方法不包括

- A.分流术
- B.断流术
- C.转流术
- D.脾切除术
- E.肝叶切除术

解析:此题暂无解析

答案:E

329.(A1型题)门脉高压时的主要病理改变不包括

- A.门-体静脉开放,交通支扩张
- B.腹水
- C.脾肿大、脾功能亢进
- D.肝脏肿大
- E.肝性脑病

解析:此题暂无解析

答案:D

330.(A1型题)下列除哪项外均为门脉高压症的临床表现

- A.外周静脉压升高
- B.腹壁静脉扩张
- C.腹水
- D.食管静脉曲张
- E.脾肿大

解析:此题暂无解析

答案:A

331.(A1型题)门静脉与腔静脉之间的交通支不包括

- A.前腹壁交通支
- B.直肠上端交通支
- C.腹膜后交通支
- D.直肠下端肛管交通支
- E.胃底、食管下段交通支

答案:B

解析:此题暂无解析

332.(A1型题)门静脉压力正常值为

- A.0.27~1.36kPa
- B.0.36~1.27kPa
- C.1.27~2.36kPa
- D.1.36~2.27kPa
- E.2.27~3.36kPa

答案:C

解析:此题暂无解析

333.(A2型题)患者,男,27岁。患右腹股沟斜疝2个月,今早剧烈运动后,肿块不能回纳,伴腹痛,呕吐,腹胀。应首先考虑的是

- A.难复性疝
- B.滑动性疝
- C.嵌顿性疝
- D.可复性疝
- E.肠管壁疝

答案:C

解析:●可复性疝腹股沟区有肿块,偶有胀痛,可回纳入腹腔内;难复性疝胀痛稍重,肿块不能回纳或不能完全回纳入腹腔内;滑动性斜疝也属难复性疝,疝块除了不能完全回纳外,尚有消化不良和便秘等症状,多发生于右侧;嵌顿性疝常发生在强力劳动或排便等腹内压骤增时,包块变硬无弹性,触痛明显,不能回纳;肠

管壁疝嵌顿的内容物为部分肠管，系膜侧肠壁及其系膜并未进入疝囊，肠腔并未完全梗阻。患者肿物不能回纳，且伴有消化不良症状，故选C。

334.(A2型题)患者，男性，78岁，双侧腹股沟部出现圆形肿物，不降入阴囊，平卧时可消失，应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.难复性疝
- E.嵌顿疝

答案:A

解析:此题暂无解析

335.(A2型题)患者，男，30岁。右侧腹股沟可复性肿物1个月，压住内环不能复出。

应首先考虑的诊断是

- A.睾丸鞘膜积液
- B.股疝
- C.腹股沟直疝
- D.腹股沟斜疝
- E.隐睾

答案:D

解析:●睾丸鞘膜积液包块仅限于阴囊内，从不能回纳或消失，透光试验多阳性；腹股沟斜疝多见于儿童和青中年男性，包块由腹股沟管突出，由外上向内下前斜行进入阴囊，疝块回纳后压住内环口，不再突出；腹股沟直疝多见于年老体弱男性，包块位于腹股沟内侧和耻骨结节的外上方，不进入阴囊，易回纳，回纳后指压内环不能阻止其出现；股疝中年及以上妇女易发，疝囊经股管向卵圆窝突出；隐睾肿块较小，挤压时可出现特有的胀痛感觉，患侧阴囊内睾丸缺如。故选D。

336.(A2型题)患者，男，3岁，啼哭时可见腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行凸现一圆形囊性包块，平卧时可自行回纳。应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.脐疝
- E.切口疝

答案:B

解析:此题暂无解析

337.(A2型题)患者，男性，60岁，腹股沟部出现可复性肿物1个月，可降入阴囊，应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.难复性疝
- E.嵌顿疝

答案:B

解析:此题暂无解析

338.(A2型题)男性, 72岁。右侧腹股沟可复性, 肿块3个月, 肿块肿硬而冷, 肿块牵引睾丸疼痛, 喜暖恶寒, 舌苔白腻, 脉弦紧。其治法是

- A.疏肝理气, 舒筋止痛
- B.温化寒湿, 疏肝理气
- C.补中益气, 升提举陷
- D.清热燥湿, 调和气血
- E.益气健脾, 除湿升阳

答案:B

解析:◎此患者以喜暖、肿块冷硬等寒湿证为主, 且伴有睾丸牵引痛等肝经气滞的症状, 故治以温化寒湿, 疏肝理气。

339.(A2型题)男性, 20岁, 阴囊结块, 肿硬而冷, 牵引睾丸疼痛, 喜暖畏寒; 苔白腻, 脉弦紧。治疗应首选

- A.天台乌药散
- B.右归丸
- C.补中益气汤
- D.香连化滞丸
- E.附子理中汤

答案:A

解析:此题暂无解析

340.(A2型题)患者;男, 72岁。右侧腹股沟可复性, 肿块三个月, 肿块肿硬而冷, 肿块牵引睾丸疼痛, 喜暖恶寒;舌苔白腻, 脉弦紧。其治法是

- A.疏肝理气, 舒筋止痛
- B.温化寒湿, 疏肝理气
- C.补中益气, 升提举陷
- D.清热燥湿, 调和气血
- E.益气健脾, 除湿升阳

答案:B

解析:■患者肿块为可复性, 肿块冷, 牵引睾丸出现疼痛, 喜暖恶寒, 舌苔白腻, 脉弦紧。可诊断为寒湿气滞为患, 治疗应遵循温阳化湿兼理气的治法。故本题应选B。三、

341.(B型题)腹股沟斜疝时, 精索在疝囊

- A.左方
- B.右方
- C.前方
- D.后方
- E.内部

答案:D

解析:此题暂无解析

342.(B型题)腹股沟直疝时, 精索在疝囊

- A.左方
- B.右方

C.前方

D.后方

E.内部

解析:此题暂无解析

答案:C

343.(B型题)腹股沟管的上壁是

- A.皮肤,皮下组织
- B.腹膜与腹横筋膜,内侧的1/3尚有联合腱
- C.腹内斜肌和腹横肌下缘
- D.腹股沟韧带和腔隙韧带
- E.腹外斜肌腱膜

答案:C

解析:此题暂无解析

344.(B型题)腹股沟管的下壁是

- A.皮肤,皮下组织
- B.腹膜与腹横筋膜,内侧的1/3尚有联合腱
- C.腹内斜肌和腹横肌下缘
- D.腹股沟韧带和腔隙韧带
- E.腹外斜肌腱膜

答案:D

解析:①A、E项是腹股沟管的前壁,B项是腹股沟管的后壁,C项是腹股沟管的上壁,D项是腹股沟管的下壁。

345.(A1型题)下列哪项不是腹外疝的临床类型

- A.易复性疝
- B.难复性疝
- C.溃疡性疝
- D.嵌顿性疝
- E.绞窄性疝

答案:C

解析:②腹股沟疝的分型:腹外疝有易复性、难复性、嵌顿性、绞窄性等类型。

346.(A1型题)典型的腹外疝不包括

- A.疝环
- B.疝囊
- C.疝内容物
- D.疝外被盖
- E.疝外壁

答案:E

解析:此题暂无解析

347.(A1型题)疝囊壁部分由腹内脏器构成的腹外疝属

- A.易复性疝
- B.难复性疝
- C.滑动性疝

D.嵌顿性疝

E.绞窄性疝

解析:此题暂无解析

答案:C

348.(A1型题)疝内容物经回纳后,压住腹股沟管内环,肿块不出现的是

A.股疝

B.腹股沟直疝

C.腹股沟斜疝

D.脐疝

E.切口疝

答案:C

解析:◎A项易发生在中年妇女,极易出现嵌顿和绞窄。B项疝块回纳后压住内环,疝块仍突出,C项疝块回纳后压住内环,疝块不突出。D项多见于婴幼儿,包块多能自行回纳,很少发生嵌顿和绞窄。若发生在成人则易发生嵌顿。E项可见切口处有包块,包块回纳后可清楚扪及疝环边缘。

349.(A2型题)患者,女,33岁。孕2个月,家务劳动后感心悸,气短,胸闷。心率119次/分,呼吸22次/分,心尖区有三级收缩期杂音,肺底部有湿啰音,下肢水肿(+)。

应首选的治疗措施是

A.饮食中限制食盐的摄入

B.加强整个孕期监护

C.心衰控制后行人工流产

D.立即入院终止妊娠

E.心衰控制后,继续妊娠

答案:C

解析:此题暂无解析

350.(A2型题)女性,33岁。孕2个月,家务劳动后感心悸,气短,胸闷。心率119次/分,呼吸22次/分,心尖区有三级收缩期杂音,肺底部有湿啰音,下肢水肿(+)。

应首选的治疗措施是

A.饮食中限制食盐的摄入

B.加强整个孕期监护

C.心力衰竭控制后行人工流产

D.立即入院终止妊娠

E.心力衰竭控制后,继续妊娠

答案:C

解析:◎根据症状可以选择心力衰竭控制后行人工流产。其余选择不合题意。

351.(A2型题)经产妇,28岁。妊娠17周余,现出现全身皮肤瘙痒,巩膜及尿液黄染2周,初孕时有同样病史,产后黄疸自行消退,本次入院化验SGPT147U,胆红素68.4mmol/L,应首先考虑的诊断是

A.急性病毒性肝炎

B.药物性肝损害

C.妊娠肝内胆汁淤积症

D.妊娠期脂肪肝

E.妊娠期高血压疾病性肝损害

答案:C

解析:此题暂无解析

352.(B型题)易引起静脉栓塞的疾病是

- A.妊娠合并急性病毒性肝炎
- B.妊娠合并糖尿病
- C.尿路感染
- D.妊娠合并心脏病
- E.妊娠合并甲亢

答案:D

解析:此题暂无解析

353.(B型题)易引起巨大儿的疾病是

- A.妊娠合并急性病毒性肝炎
- B.妊娠合并糖尿病
- C.尿路感染
- D.妊娠合并心脏病
- E.妊娠合并甲亢

答案:B

解析:此题暂无解析

354.(A1型题)妊娠合并心脏病的孕妇最危险的时期是

- A.妊娠35~36周
- B.妊娠32~34周
- C.妊娠24~27周
- D.妊娠28~31周
- E.产褥期7天后

答案:B

解析:此题暂无解析

355.(A1型题)妊娠合并心脏病的孕妇死亡的主要原因是

- A.心脏病病程长
- B.未经产前检查
- C.孕妇年龄大
- D.心衰与感染
- E.孕周过大

答案:D

解析:此题暂无解析

356.(A1型题)治疗妊娠期高血压脾虚证,应首选

- A.天仙藤散
- B.白术散
- C.真武汤
- D.肾气丸
- E.四苓散

答案:B

解析:①妊娠期高血压脾虚证治以健脾利水,方用白术散。

357.(A1型题)下列各项,不属妊娠合并心脏病主要症状的是

- A.心悸
- B.腹痛
- C.水肿
- D.气短
- E.乏力

答案:B

解析:①心悸、水肿、气短、乏力均可以是心脏功能下降引起的并发症,惟独B选项不是,而是一个与消化道关系更为密切的症状。

358.(A1型题)与妊娠期高血压疾病发生关系最密切的是

- A.心、脾、肾功能失调
- B.肺、脾、肾功能失调
- C.肝、脾、肾功能失调
- D.肝、脾、肺功能失调
- E.心、肝、肾功能失调

答案:C

解析:■妊娠期高血压疾病肝、脾、肾功能失调最为密切。故本题选C。

359.(A1型题)治疗妊娠期高血压疾病,首选的解痉药是

- A.安定
- B.654—2
- C.硫酸镁
- D.阿托品
- E.冬眠合剂

答案:C

解析:■妊娠期高血压疾病,首选的解痉药是硫酸镁,可作为抗惊厥药.常用于妊娠高血压.降低血压。故本题选C。

360.(A1型题)下列各项,不属妊娠合并心脏病主要症状的是

- A.心悸
- B.腹痛
- C.浮肿
- D.气短
- E.乏力

答案:B

解析:■妊娠合并心脏病:①妊娠期出现心悸、气促,心动过速,有时夜间难以平卧;②体力活动受到限制;③听诊心前区可闻及舒张期杂音, III级以上的收缩期杂音,或严重的心律失常,如心房颤动或扑动,房室传导阻滞,室上性心动过速。④X线胸部摄片显示心界扩大。⑤心电图示心肌劳损、心律失常。故本题选B。

361.(A1型题)下列妊娠期急性肾盂肾炎的治疗,错误的是

- A.首选氨苄西林、头孢菌素类药物
- B.无症状性菌尿2周为1疗程
- C.有症状性肾盂肾炎4周为1疗程

D.症状重者两药联合静滴效果佳

E.选用喹诺酮类药物

答案:E

解析:■喹诺酮类药物是孕妇禁忌药物。故本题选E。二、

362.(A2型题)初产妇, 23岁。32周妊娠, 阴道流水1小时入院, 检查:无宫缩, 胎心率130次/分, 胎头先露, 未入盆, 阴道液pH值呈碱性, 考虑胎膜早破。错误的处理措施是

A.卧床, 抬高床尾

B.注意胎心率变化

C.OCT试验

D.注意观察体温, 测血常规

E.注意保持会阴部清洁

答案:C

解析:此题暂无解析

363.(A2型题)初孕妇, 29岁。足月妊娠, 上午8时始开始阵发宫缩, 10时胎膜破裂, 下午16时肛门检查:宫口已开全, 胎头先露, 胎位LOA, 胎头颅骨最低点在坐骨棘水平以下3cm, 胎心率100次/分, 羊水呈草绿色, 黏稠。首先应考虑的诊断是

A.滞产

B.宫缩乏力

C.胎儿窘迫

D.胎膜早破

E.可疑头盆不称

答案:C

解析:此题暂无解析

364.(B型题)初产妇, 28岁。41周妊娠, 产程进展过程中因潜伏期行人工破膜术, 宫口扩张2cm, 胎头位于坐骨棘水平上2cm, 羊水III度混浊, 量5ml, 胎心率150次/分。应首选的处理措施是

A.观察

B.吸氧

C.立即剖宫产

D.注射哌替啶

E.静滴催产素

答案:C

解析:此题暂无解析

365.(A1型题)下列关于胎动次数的叙述, 属胎儿窘迫的是

A.胎动<10次/12小时

B.胎动<15次/12小时

C.胎动<20次/12小时

D.胎动<25次/12小时

E.胎动<30次/12小时

答案:A

解析:此题暂无解析

366.(A1型题)下列各项, 不属胎儿窘迫临床表现的是

- A.胎心率100次/分
- B.胎动减弱, 次数减少
- C.头位临产后羊水有胎粪污染
- D.臀位临产后羊水有胎粪污染
- E.胎儿头皮血pH值7.15

答案:D

解析:此题暂无解析

367.(A1型题)下列各项, 属导致慢性胎儿窘迫原因是

- A.脐带受压
- B.胎盘早剥
- C.孕妇休克
- D.胎盘功能不全
- E.宫缩过强或持续时间过长

答案:D

解析:此题暂无解析

368.(A1型题)下列各项, 不属剖宫产的适应证的是

- A.胎儿窘迫
- B.珍贵儿
- C.宫缩乏力
- D.产妇要求
- E.前置胎盘

答案:D

解析:◎剖宫产的适应证为胎儿窘迫、异常分娩、宫缩乏力和前置胎盘等。而产妇要求不属于上述范畴。

369.(A1型题)下列各项, 不属胎儿窘迫临床表现的是

- A.胎心率100次/分
- B.胎动减弱, 次数减少
- C.头位临产后羊水有胎粪污染
- D.臀位临产后羊水有胎粪污染
- E.胎儿头皮血pH7.15

答案:D

解析:◎胎儿窘迫临床表现为胎动频繁继而胎动减少或消失;胎心异常。胎心>160次/分, 尤其>180次/分, 为胎儿缺氧后胎心率初期表现。胎心率<120次/分, 尤其<100次/分, 为胎儿危险征象。电子胎心及子宫收缩监护仪检查——缩宫素激惹试验(OCT)时反复出现变异减速或连续3次以上的胎心晚期减速, 胎动后无胎心率改变。羊水胎粪污染;胎儿头皮血血气分析——血pH<7.20(正常值7.25~7.35)。

370.(A1型题)下列关于胎动次数的叙述, 属胎儿窘迫的是

- A.胎动<10次／12小时
- B.胎动<15次／12小时
- C.胎动<20次／12小时
- D.胎动<25次／12小时
- E.胎动<30次／12小时

答案:A

解析:◎一般胎动<10次／12小时, 可考虑为胎儿窘迫。二、

371.(A2型题)女性, 25岁, 已婚。以往月经正常, 50天前行人工流产吸宫术, 出血少, 现月经未潮, 3天来感觉小腹胀痛, 肛门坠胀, 妇科检查: 子宫后位, 稍大而软, 有明显压痛, 双附件无异常, 尿妊娠试验(一)。应首先考虑的是

- A.闭经
- B.早孕
- C.妊娠腹痛
- D.宫颈宫腔粘连
- E.子宫内膜炎

答案:D

解析:◎宫颈宫腔粘连是在人工流产过程中, 由于吸宫或刮宫过度, 损伤了子宫颈管和子宫内膜, 随后引起宫颈粘连阻塞或宫腔粘连缩小, 症状有: 人工流产后出现月经过少或闭经伴周期性下腹痛。宫颈举痛, 宫体可稍饱满且有压痛等。此患者症状与之相符

372.(A2型题)患者, 女, 40岁, 已婚。3天来带下量多, 呈灰黄色泡沫状, 伴外阴及阴道口瘙痒, 尿频、尿痛。应首先考虑的是

- A.霉菌性阴道炎
- B.滴虫性阴道炎
- C.老年性阴道炎
- D.非特异性阴道炎
- E.急性外阴炎

答案:B

解析:■白带增多及外阴瘙痒滴虫阴道炎的主要症状是稀薄的泡沫状白带增多及外阴瘙痒, 若有其他细菌混合感染则排出物呈脓性, 可有臭味, 瘙痒部位主要为阴道口及外阴, 间或有灼热、疼痛、性交痛等。若尿道口有感染, 可有尿频、尿痛, 有时可见血尿。检查时可见阴道粘膜充血, 严重者有散在的出血斑点, 后穹窿有多量白带, 呈灰黄色、黄白色稀薄液体或为黄绿色脓性分泌物, 常呈泡沫状。故本题选B。

373.(A2型题)患者, 女, 45岁, 已婚。接触性阴道流血2个月; 宫颈重度糜烂伴颗粒样增生, 宫颈脱落细胞检查巴氏III级。为了明确诊断, 提高活检的准确性, 应作的检查是

- A.宫颈活组织检查
- B.阴道镜与宫颈检查
- C.外阴活组织检查
- D.阴道活组织检查
- E.子宫内膜活组织检查

答案:A

解析:■防癌涂片用巴氏染色,结果分5级I级正常,II级炎症引起,III级可疑,IV级可疑阳性,V级阳性。III、IV、V级涂片者应重复刮片检查并行宫颈活组织检查,II级涂片需先按炎症处理后重复涂片进一步检查。本患者达到标准,故本题选A。

三、

374.(B型题)生殖器结核常见的症状是

- A.高热,白带增多,子宫及附件区压痛,WBC升高
- B.停经,下腹痛,阴道出血
- C.腹痛由脐周开始,后转移至右下腹麦氏点
- D.不孕,消瘦,输卵管碘油造影呈串珠状
- E.卵巢囊肿病史,运动后突发一侧下腹痛,B超检查囊肿消失,盆腔有少量积液

答案:D

解析:◎急性盆腔炎常见的症状是高热、寒战、阴道分泌物增多,常呈脓性,下腹痛,压痛及反跳痛明显,血白细胞总数及中性粒细胞增高。生殖器结核常见的症状是不孕,消瘦,输卵管碘油造影呈串珠状。而腹痛由脐周开始,后转移至右下腹麦氏点为急性阑尾炎的症状。E项为卵巢囊肿破裂的症状。

375.(B型题)短效避孕药的主要作用机制是

- A.抑制排卵,不利于精子穿透
- B.阻止精子进入宫腔
- C.杀灭精子
- D.不利孕卵着床
- E.杀灭卵子

解析:此题暂无解析

答案:A

376.(A1型题)下列各项,不属避孕方法的是

- A.输卵管结扎术
- B.人工流产
- C.安全期避孕
- D.宫内节育器的放置
- E.药物避孕

解析:此题暂无解析

答案:B

377.(A1型题)下列各项,最早提倡节育、晚婚的古籍是

- A.《广嗣纪要》
- B.《诸病源候论》
- C.《褚氏遗书》
- D.《逐月养胎法》
- E.《十产论》

答案:C

解析:此题暂无解析

378.(A1型题)除去下列哪一项其他均为中度脱水的临床表现

- A.烦躁不安或精神萎靡
- B.眼窝及前囟明显凹陷
- C.皮肤弹性差
- D.四肢厥冷
- E.尿量明显减少

答案:D

解析:此题暂无解析

379.(A1型题)小儿喜伏卧者，其病因多是

- A.乳食内积
- B.盘肠吊痛
- C.痰饮内伏
- D.久病体虚
- E.胸胁疼痛

解析:此题暂无解析

答案:A

380.(A1型题)卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的疾病是

- A.心理性疾病
- B.急性传染病
- C.营养性疾病
- D.结缔组织病
- E.肠寄生虫病

解析:此题暂无解析

答案:B

381.(A1型题)小儿前囟闭合的正常时间是

- A.4~6个月
- B.8~10个月
- C.12~18个月
- D.18~20个月
- E.20~22个月

答案:C

解析:◎囟门分为前囟、后囟，前囟的测量以对边中点连线为难，出生时为1.5~2cm。后随颅骨发育而增大，6个月后逐渐骨化而变小，在1~1.5岁时闭合，后囟出生时部分已闭合，或出生后2~4个月闭合。

382.(A1型题)下列关于母乳喂养优点的叙述，错误的是

- A.含饱和脂肪酸多，利于消化吸收
- B.钙磷比例适宜，较少发生低钙血症
- C.含优质蛋白质，必需氨基酸多
- D.有提高婴儿免疫力的作用
- E.哺乳可促进子宫收缩，利于母亲早日康复

答案:A

解析:①母乳含不饱和脂肪酸较多,以乳清蛋白为主,又含有较多解脂酶,有利于消化吸收。必需氨基酸含量较多,免疫球蛋白种类、含量多,可提高婴儿免疫力。人乳中钙含量虽低,但钙磷比例较适宜。哺乳可刺激子宫收缩,利于母亲早日康复。还可减少乳母乳腺癌、卵巢癌的发生率。

383.(A1型题)小儿开始更换恒牙的年龄范围是

- A.2~3岁
- B.4~5岁
- C.6~7岁
- D.8~9岁
- E.10岁

答案:C

解析:②2岁以内乳牙的数目为月龄减4~6。6~7岁乳牙开始脱落换恒牙,17~30岁恒牙出齐,共28~32个。小儿6岁左右开始萌出第一颗恒牙,自7~8岁,乳牙按萌出先后脱落,代之以恒牙。

384.(A1型题)婴儿啼哭,可视为常态的是

- A.哭而无泪,哭而绵长
- B.哭而有泪,哭声洪亮
- C.哭声绵长,作吮乳状
- D.突然大哭,声高气急
- E.哭声嘶哑,呼吸不利

答案:B

解析:此题暂无解析

385.(A1型题)中医学称小儿为“纯阳之体”,其含义是

- A.纯阳无阴
- B.发育迅速
- C.阳常有余
- D.肝常有余
- E.阴虚阳亢

答案:B

解析:■“纯阳”指小儿先天禀受的元阴元阳未曾耗散,因而成为后天生长发育的动力,使儿童显示出蓬勃的生机,迅速地发育成长。“纯阳”,是我国古代医家关于小儿生理特点的学说之一。不能将“纯阳”理解成正常小儿为有阳无阴或阳亢阴亏之体。故本题选B。

386.(A1型题)下列关于母乳喂养优点的叙述,错误的是

- A.含饱和脂肪酸多,利于消化吸收
- B.钙磷比例适宜,较少发生低钙血症
- C.含优质蛋白质,必需氨基酸多
- D.有促进婴儿免疫力的作用
- E.哺乳可促进子宫收缩,利于母亲早日康复

答案:A

解析:■关于母乳中脂肪酸的正确表述是:含不饱和脂肪酸的脂肪较多,供给丰富的必须脂肪酸,脂肪颗粒小,又含较多解脂酶,有利于消化吸收。故本题选A。

387.(A1型题)母乳喂养,增加半固体和固体辅食最适宜的时间是

- A.2~3个月
- B.3~4个月
- C.4~5个月
- D.5—6个月
- E.半岁后

答案:C

解析:■小儿自4~5个起,月乳牙萌出,咀嚼能力增强,已可以适应半固体和固体食物,故可以添加一些辅助食品,以补充小儿营养,又为断奶作准备。故本题选C。
二、

388.(A1型题)肺炎喘嗽痰热闭肺证的首选方剂是

- A.沙参麦冬汤
- B.麻杏石甘汤
- C.五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- D.定喘汤
- E.银翘散合麻杏石甘汤

答案:C

解析:此题暂无解析

389.(A1型题)治疗小儿暑邪感冒,应首选

- A.荆防败毒散
- B.新加香薷饮
- C.银翘散
- D.三拗汤
- E.桑菊饮

答案:B

解析:◎暑邪感冒方药新加香薷饮加减。三拗汤、荆防败毒散主要针对风寒型,银翘散、桑菊饮主要针对风热型。

390.(A1型题)小儿感冒容易出现兼证,多见

- A.挟火、挟痰、挟湿
- B.挟火、挟痰、挟滞
- C.挟风、挟痰、挟滞
- D.挟惊、挟痰、挟滞
- E.挟湿、挟惊、挟滞

答案:D

解析:◎小儿感冒容易出现兼证为夹痰、夹滞、夹惊。

391.(A1型题)肺炎喘嗽区别于支气管炎的重要体征是

- A.双肺固定的细湿啰音
- B.双肺呼吸音减弱
- C.双肺呼吸音增粗
- D.双肺哮鸣音

E.双肺管状呼吸音

答案:A

解析:◎支气管肺炎的临床特点:肺部体征早期不明显或呼吸音粗糙,以后可听到较固定的中、细湿啰音,啼哭或深吸气末更为明显。

392.(A1型题)6个月以内婴儿无热性支气管肺炎应考虑

- A.葡萄球菌肺炎
- B.合胞病毒肺炎
- C.革兰阴性杆菌肺炎
- D.肺炎支原体肺炎
- E.衣原体肺炎

答案:E

解析:■除选项E,其余的选项的病原体感染所致的肺炎均有伴有发热,再有研究认为6个月以内婴儿无热性支气管肺炎应考虑衣原体肺炎。故本题选E。

393.(A1型题)诊断病毒性心肌炎的主要指标,错误的一项是

- A.急慢性心功能不全或心脑综合征
- B.有心脏扩大、奔马律或心包炎表现之一
- C.多汗、肌痛、胸闷
- D.发病1个月内血清CK-MB增高
- E.心脏核素扫描发现心室扩大

答案:C

解析:◎病毒性心肌炎主要指标:①急、慢性心功能不全,或心脑综合征。②有奔马律或心包摩擦音。③心脏扩大。④心电图示严重心律失常。或明显的ST-T改变,或运动试验阳性,发病1个月内血清CK-MB增高。

394.(A1型题)风湿性心肌炎的临床表现下列哪项是错误的

- A.出现早搏和心动过速
- B.心率增快
- C.心前区第一心音减弱
- D.严重时可出现奔马律
- E.心尖区可听到隆隆样收缩期杂音

答案:E

解析:■选项E.心尖区可听到隆隆样收缩期杂音是器质性杂音多见于二尖瓣关闭不全,风湿性心肌炎是心尖区可闻及轻度收缩期杂音;其余选项是风湿性心肌炎的临床表现。故本题选E。二、

395.(A2型题)患儿,2岁。体重11kg。盛夏就诊,腹泻2天,量多次频,泻下急迫,大便呈黄色蛋花样,有少许黏液,精神稍差,皮肤弹性尚可,哭时有泪,尿黄量少。舌质红,苔黄腻,指纹紫。大便常规:WBC4~6/HP, RBC1~2/HP。应首先考虑的诊断是

- A.大肠杆菌肠炎,轻度脱水
- B.大肠杆菌肠炎,中度脱水
- C.轮状病毒性肠炎,轻度脱水
- D.轮状病毒性肠炎,中度脱水

E.急性细菌性痢疾，轻度脱水

答案:A

解析:此题暂无解析

396.(A2型题)女性，3个月。口腔、舌面满布白屑，面赤唇红，烦躁不宁，吮乳啼哭，大便干结，小便短黄。治疗应首选制霉菌素加

A.清热泻脾散

B.泻黄散

C.六味地黄丸

D.导赤散

E.清胃散

答案:A

解析:①根据题干描述症状辨为心脾积热证，主方清热泻脾散。

397.(A2型题)患儿，5个月。急性腹泻，频繁呕吐2天，检查头颅，可能发现的体征是

A.囟门逾期不闭

B.囟门凹陷

C.囟门高凸

D.囟门宽大，头缝开解

E.囟门早闭

答案:B

解析:■患儿，5个月囟门正常是未闭合的，急性腹泻，频繁呕吐2天，可有不同程度的脱水，因此检查头颅，可能发现的体征是囟门凹陷，故本题选B。

398.(A2型题)急性肾炎患儿，肢体水肿，咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。治疗应首选

A.呋塞米加己椒苈黄丸

B.呋塞米加龙胆泻肝汤

C.毛花苷C加己椒苈黄丸

D.毛花苷C加龙胆泻肝汤

E.二氯嗪加己椒苈黄丸

答案:A

解析:①根据题干辨为水气上凌心肺证，证候特点:肢体水肿，经久不退，尿量减少，咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。治法:润肺逐水，温阳扶正。方药:己椒苈黄丸。本病以循环充血为主，故应积极降低循环负荷，首选利尿药。出现心功能不全表现时可选用强心药如毛花苷C。

399.(A2型题)患儿，4岁。反复浮肿5个月，面色萎黄，神疲乏力，肢体浮肿，晚间腹胀，纳少便溏。查体:全身浮肿呈凹陷性，舌淡苔白滑，脉沉缓。实验室检查:尿蛋白明显增高，血浆蛋白降低，血清胆固醇 5.97mmol/L 。诊断为肾病综合征，其证型是

A.风水相搏

B.湿热内侵

C.脾虚湿困

D.肝肾阴虚

E.脾肾阳虚

答案:C

解析:■患儿:无表证, A错;无热证, B、D错;无尿少, 水肿不是以腰以下为主E错。面色萎黄, 神疲乏力, 纳少便溏典型的脾阳虚, 肢体浮肿呈凹陷性, 舌淡苔白滑, 脉沉缓是湿邪困脾, 故本题选C。

400.(A1型题)儿童多发性抽动症脾虚肝旺证治疗应首选的方剂是

A.醒脾散

B.炙甘草汤

C.六味地黄丸

D.人参归脾汤

E.黄连温胆汤

答案:A

解析:此题暂无解析

401.(A1型题)以下诸项不属儿童多动症的临床特征的是

A.冲动任性

B.女性多于男性

C.智力正常或基本正常

D.注意力不集中

E.动作过多

答案:B

解析:◎儿童多动症患者男性多于女性, 冲动任性、注意力不集中、动作过多, 但智力正常或基本正常。

402.(A1型题)多发性抽动症的基本病理改变是

A.瘀血阻窍

B.痰瘀互阻

C.肝风内动

D.肝风痰火胶结成疾

E.痰蒙清窍

答案:D

解析:◎本病多因五志过极, 风痰内蕴, 导致肝风内动, 肝风痰火互结所致。二、

403.(A2型题)患儿, 女, 5岁。面色不华, 已逾3个月, 指甲苍白, 纳食不佳, 四肢乏力, 大便溏泻, 舌淡苔薄白, 脉细无力。血常规示小细胞低色素性贫血。治疗应首选

A.八珍汤

B.大补元煎

C.参苓白术散

D.保和丸

E.补中益气汤

答案:C

解析:■纳食不佳, 四肢乏力, 大便溏泻, 舌淡苔薄白, 脉细无力是脾胃虚弱证, 治疗应健脾和胃益气, 因同时血常规示小细胞低色素性贫血故再佐以养血, 参苓白术散:党参、茯苓、白术、扁豆、山药健脾益气, 黄芪、当归益气养血, 陈皮、砂仁行气和中使补而不滞, 鸡内金、谷芽健脾消食助运。故本题选C。补中益气汤用于脾虚气陷和气虚发热证, 补气升提有余而补血不足。

404.(B型题)患儿周围血常规检查:MCH:28pg/L,HGB:60g/L,PLT:80×10⁹/L,WBC:3.2×10⁹/L.其诊断是

- A.营养性缺铁性贫血
- B.血小板减少性紫癜
- C.营养性巨幼红细胞性贫血
- D.再生障碍性贫血
- E.混合性贫血

答案:D

解析:此题暂无解析

405.(A1型题)女性第二性征在何年龄发育应考虑有性早熟问题

- A.8岁以前
- B.9岁
- C.11岁
- D.13岁
- E.15岁

答案:A

解析:●女性第二性征指内外生殖器外的女性特有的外部特征,如乳房、阴毛和腋毛等。各项第二性征指标发育的年龄、顺序和幅度有明显的个体差异。乳房的发育在第二性征中出现最早,多在10-

11岁时,但也可早至8岁或晚至13岁开始。一般认为,女童在8岁之前出现乳房增大、阴毛、腋毛生长等第二性征的一种或一种以上者,或月经初潮开始于10岁以前者,均属于性早熟,所以答案A为正确答案。

406.(A1型题)下列选项,除了哪一项外均为性早熟的病因

- A.肿瘤引起的
- B.外源性性激素引起的
- C.体质性真性性早熟,尚无特殊疗法,可用大剂量孕激素抑制促性激素的分泌
- D.不完全性性早熟
- E.食物引起的

答案:C

解析:此题暂无解析

407.(B型题)哮喘未发之时,常怯寒自汗,容易感冒,发作前每有鼻塞流涕,其治法是

- A.补肾纳气
- B.补肺固卫
- C.健脾化痰
- D.温肺化痰,止咳平喘
- E.回阳固脱,温肺平喘

答案:B

解析:此题暂无解析

408.(B型题)哮喘发作,喘息喉鸣,痰多白沫,形寒无汗,四肢不温,面色晦滞带青,其治法是

- A.补肾纳气

- B. 补肺固卫
- C. 健脾化痰
- D. 温肺化痰，止咳平喘
- E. 回阳固脱，温肺平喘

答案:D

解析:此题暂无解析

409.(A2型题)患儿，1岁。患维生素D缺乏性佝偻病，夜啼不宁，多汗，惊惕不安，行走不稳，出牙延迟。舌淡，苔薄白，指纹淡。治疗应首选

- A. 四君子汤
- B. 补肾地黄丸
- C. 六味地黄丸
- D. 益脾镇惊散
- E. 资生健脾丸

答案:D

解析:■脾虚气弱，故多汗，肝失阴血濡养，肝木偏旺，则夜啼不宁，肝主筋，肝气不足，则行走无力。体虚发育迟缓，渐次由脾及肾，故囟门迟闭，齿生亦晚，苔薄白，指纹淡均为脾虚肝旺之象。治疗应健脾平肝，应首选益脾镇惊散，故正确答案是选项D。

410.(A2型题)某小儿，2个月。足月顺产，母乳喂养，为预防佝偻病服用维生素D，每日补充的合理剂量是

- A. 200U
- B. 400U
- C. 2000U
- D. 5000U
- E. 10000U

答案:B

解析:◎婴幼儿期应用维生素D预防佝偻病。每天予维生素D400~800U。

411.(A2型题)患儿，2岁，发热3天，口腔、手足、四肢、臀部可见疱疹，疹色紫暗，疱液混浊，口臭流涎，小便黄，大便秘结，舌质红绛，苔黄厚腻，指纹紫。治疗首选

- A. 甘露消毒丹
- B. 清瘟败毒饮
- C. 凉营清气汤
- D. 清胃解毒汤
- E. 透疹凉解汤

答案:B

解析:此题暂无解析

412.(A2型题)手足口病病儿，其疱疹紫暗稠密，痛痒剧烈伴高热不退，烦躁口渴，溲赤便秘，舌红绛，苔黄厚腻，脉滑数。治疗除清热解毒外，还应

- A. 宣肺化湿
- B. 清胃化湿
- C. 泻脾化湿

D.凉营化湿

E.活血化湿

解析:此题暂无解析

答案:D

413.(A1型题)蛔虫病的发生,与下列哪项关系最为密切

A.饮食不洁

B.饮食不节

C.过食生冷

D.过食肥甘

E.素体脾虚

答案:A

解析:◎蛔虫病的发生最为密切的是饮食不洁。

414.(A1型题)蛲虫病的预防措施不包括

A.在集体儿童机构,开展普查普治

B.进行卫生宣教工作

C.每年预防性口服灭虫药物

D.培养良好的卫生习惯。

E.集体儿童机构勤用湿扫法打扫室内

答案:C

解析:■在集体儿童机构,开展普查普治,进行卫生宣教工作,培养良好的卫生习惯,集体儿童机构勤用湿扫法打扫室内,家庭中所有患者应同时治疗。故本题选C。

二、

415.(A1型题)下列各项,不属心脏呼吸骤停临床表现的是

A.突然昏迷

B.忽然失语

C.心音消失或心跳过缓

D.大动脉搏动消失

E.瞳孔扩大

解析:此题暂无解析

答案:B

416.(A1型题)下列关于休克的叙述中,错误的是

A.失血性休克的治疗是扩容

B.感染性休克时可大剂量使用氢化考的松

C.失血性休克时,止血是不可忽视的主要手段

D.感染性休克时,应首先使用升压药

E.感染性休克时应恢复有效循环血量

答案:D

解析:此题暂无解析

417.(A2型题)患儿,4岁。高热持续3天,神昏谵语,突然颈项强直,两目上视,口吐白沫,手足抽动,四肢厥冷。其宜选方剂是

A.羚角钩藤汤

B.清营汤

C.清瘟败毒饮

D.犀角地黄汤

E.镇惊丸

解析:此题暂无解析

答案:A

418.(A2型题)患儿,5岁。腹痛绵绵2天,时作时止,痛时喜按,面白少华,神疲乏力,手足不温,食后腹胀,大便偏稀。唇舌较淡,脉沉。治疗应首选的方剂是

A.少腹逐瘀汤

B.小建中汤

C.大承气汤

D.香砂平胃散

E.养脏散

解析:此题暂无解析

答案:B

419.(B型题)督脉的主治是

A.肝、脾、肾病

B.目病、咽喉病、热病

C.后头、肩胛病,神志病

D.中风、昏迷、热病、头面病

E.前头、口齿、咽喉病,胃肠病

答案:D

解析:此题暂无解析

420.(B型题)手三阳经主治相同的是

A.胸部病

B.咽喉病、热病

C.眼病、神志病、热病

D.前阴病、妇科病

E.神志病、脏腑病、妇科病

答案:B

解析:此题暂无解析

421.(B型题)足三阳经主治相同的是

A.胸部病

B.咽喉病、热病

C.眼病、神志病、热病

D.前阴病、妇科病

E.神志病、脏腑病、妇科病

答案:C

解析:◎手三阳经相同主治咽喉病、热病。足三阳经相同主治眼病、神志病、热病。

◦

422.(A1型题)八会穴中的脉会是

A.太渊

- B.血海
- C.膈俞
- D.章门
- E.中脘

解析:此题暂无解析

答案:A

423.(A1型题)根据子母补泻取穴法, 心经实证应选用

- A.少冲
- B.中冲
- C.太渊
- D.太白
- E.太冲

解析:此题暂无解析

答案:D

424.(A1型题)根据子母补泻取穴法, 心包经虚证应选用

- A.少冲
- B.中冲
- C.太渊
- D.太白
- E.太冲

解析:此题暂无解析

答案:B

425.(A1型题)足太阳膀胱经的合穴是

- A.阳陵泉
- B.委中
- C.委阳
- D.合阳
- E.小海

解析:此题暂无解析

答案:B

426.(A1型题)五行属水, 又为合穴的是

- A.太溪
- B.侠溪
- C.少府
- D.中府
- E.阴陵泉

解析:此题暂无解析

答案:E

427.(A1型题)耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的骨度分寸是

- A.13寸
- B.14寸
- C.16寸
- D.18寸
- E.19寸

答案:D

解析:此题暂无解析

428.(A1型题)肩胛骨内缘(近脊柱侧)至后正中线的骨度分寸是

- A.3寸
- B.4寸
- C.5寸
- D.6寸
- E.8寸

答案:A

解析:此题暂无解析

429.(A1型题)根据骨度分寸法, 脐中至耻骨联合上缘是

- A.5寸
- B.7寸
- C.8寸
- D.9寸
- E.12寸

答案:A

解析:◎骨度分寸法, 脐中至耻骨联合上缘是5寸。

430.(A1型题)眉间至后发际正中第7颈椎棘突下的骨度分寸是

- A.12寸
- B.13寸
- C.14寸
- D.16寸
- E.18寸

答案:E

解析:◎眉间至后发际正中第7颈椎棘突下的骨度分寸是18寸。

431.(A1型题)在腕前区, 桡骨茎突与舟状骨之间, 拇长展肌腱尺侧凹陷中的穴位

- 是
- A.大陵
 - B.太渊
 - C.合谷
 - D.鱼际
 - E.后溪

答案:B

解析:此题暂无解析

432.(A1型题)在手外侧, 第1掌骨桡侧中点赤白肉际处的穴位是

- A.大陵
- B.太渊
- C.合谷
- D.鱼际
- E.后溪

答案:D

解析:此题暂无解析

433.(A1型题)治疗咽痛、掌中热首选的是

- A.鱼际
- B.太渊
- C.列缺
- D.尺泽
- E.少商

解析:此题暂无解析

答案:A

434.(A1型题)治疗齿痛、项强首选的是

- A.鱼际
- B.太渊
- C.列缺
- D.尺泽
- E.少商

解析:此题暂无解析

答案:C

435.(A1型题)肺的募穴所属的经脉是

- A.肺经
- B.任脉
- C.胃经
- D.脾经
- E.肾经

解析:此题暂无解析

答案:A

436.(A1型题)手太阴肺经的终止穴是

- A.少商
- B.少泽
- C.少冲
- D.商阳
- E.至阴

解析:此题暂无解析

答案:A

437.(A1型题)不属于尺泽穴主治病证的是

- A.咯血、咽痛
- B.咳嗽、气喘
- C.急性吐泻
- D.中暑、小儿惊风
- E.齿痛、口眼歪斜

答案:E

解析:此题暂无解析

438.(A1型题)手太阴肺经的起始穴是

- A.少商
- B.中府
- C.商阳

D.迎香

E.肺俞

解析:此题暂无解析

答案:B

439.(A1型题)在肘横纹中, 肱二头肌腱桡侧凹陷处的腧穴是

A.神门

B.少海

C.曲泽

D.尺泽

E.曲池

答案:D

解析:◎尺泽穴位于肘横纹中, 肱二头肌腱桡侧凹陷处。曲泽穴在肘微屈, 肘横纹中, 肱二头肌腱尺侧缘。神门在腕横纹尺侧端, 尺侧腕屈肌腱桡侧缘。少海穴在屈肘时, 肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线中点。曲池在当屈肘成直角肘横纹外侧端与肱骨外上髁连线中点。二、

440.(A1型题)曲池穴主治的病证是

A.咳喘, 口□

B.咳嗽, 无脉症

C.瘾疹, 湿疹

D.无汗, 多汗

E.惊悸, 忡忡

解析:此题暂无解析

答案:C

441.(A1型题)太渊穴主治的病证是

A.咳喘, 口□

B.咳嗽, 无脉症

C.瘾疹, 湿疹

D.无汗, 多汗

E.惊悸, 忡忡

解析:此题暂无解析

答案:B

442.(A1型题)位于肘区, 屈肘成直角, 在尺泽与肱骨外上髁连线中点凹陷处的腧穴是

A.商阳

B.曲池

C.合谷

D.尺泽

E.手三里

解析:此题暂无解析

答案:B

443.(A1型题)位于手指, 食指末节桡侧, 指甲根角侧上方0.1寸处的腧穴是

A.商阳

B.曲池

C.合谷

D.尺泽

E.手三里

解析:此题暂无解析

答案:A

444.(A1型题)手阳明大肠经的原穴是

A.商阳

B.合谷

C.阳池

D.偏历

E.阳溪

解析:此题暂无解析

答案:B

445.(A1型题)手阳明大肠经的经穴是

A.商阳

B.合谷

C.阳池

D.偏历

E.阳溪

解析:此题暂无解析

答案:E

446.(A1型题)循行"入下齿中"的经脉是

A.小肠经

B.大肠经

C.胃经

D.脾经

E.肝经

解析:此题暂无解析

答案:B

447.(A1型题)下列腧穴中,可以治疗胆道蛔虫症的是

A.商阳

B.合谷

C.曲池

D.手三里

E.迎香

解析:此题暂无解析

答案:E

448.(A1型题)应注意避开血管针刺的是

A.列缺

B.合谷

C.血海

D.太渊

E.鱼际

解析:此题暂无解析

答案:D

449.(A1型题)手太阴肺经与手阳明大肠经的循行交接部位是

- A.拇指
- B.食指
- C.中指
- D.无名指
- E.小指

解析:此题暂无解析

答案:B

450.(A1型题)下列腧穴中,治疗高血压首选

- A.曲泽
- B.尺泽
- C.曲池
- D.中渚
- E.列缺

解析:此题暂无解析

答案:C