

2022年执业/助理医师资格考试

# 笔试高频精选冲刺题

中医执业医师精选600题

套卷一【1-150题】

金英杰医学教育

1.(B型题)83用于止血,宜炒炭用的药物是

- A.紫苏
- B.荆芥
- C.香薷
- D.麻黄
- E.生姜

答案:B

解析:荆芥发表、透疹、消疮宜生用;止血宜炒用。麻黄发汗解表宜生用,止咳平喘多炙用。

2.(B型题)86具有利尿功效的药物是

- A.白头翁
- B.大青叶
- C.穿心莲
- D.射干
- E.鱼腥草

答案:E

解析:白头翁清热解毒,凉血止痢。大青叶清热解毒,凉血消斑。穿心莲清热解毒,凉血,消肿,燥湿。射干清热解毒,祛痰,利咽。鱼腥草清热解毒,排脓消痈,利尿通淋。

3.(B型题)88可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案:C

解析:鱼腥草清热解毒,排脓消痈,利尿通淋。主肺痈吐脓,痰热喘咳,喉蛾,热痢,痈肿疮毒,热淋。白头翁适用于温病初起及热毒泻痢。

4.(B型题)90醋制可增强止痛作用的药物是

- A.白茅根
- B.蒲黄
- C.白及
- D.郁金
- E.延胡索

答案:E

解析:白茅根凉血止血,清热利尿。用于血热出血证、水肿、热淋、黄疸、胃热呕吐、肺热咳喘等,生用可治疗产后子宫收缩不良出血。故89题选A。延胡索醋制可增强止痛作用。故90题选E。

5.(B型题)93治疗寒饮呕吐,宜选用

- A.白芥子
- B.杏仁
- C.半夏
- D.桔梗
- E.竹茹

答案:C

解析:A温肺化痰,利气,散结消肿。B止咳平喘,润肠通便。C燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结;外用消肿止痛。其主治证候有:①湿痰,寒痰证;②呕吐;③心下痞,结胸,梅核气;④瘰疬,痰核,痈疽肿毒及毒蛇咬伤。D宣肺,祛痰,利咽,排脓。E清热化痰,除烦止呕。

6.(B型题)96白芥子具有的功效是

- A.燥湿化痰
- B.温肺化痰
- C.降气化痰
- D.宣肺化痰
- E.清热化痰

答案:B

解析:旋覆花降气行水化痰,降逆止呕,适用于痰饮蓄结,胸膈痞满,噎气,呕吐等证,故95题选C。白芥子温肺化痰,利气,散结消肿,故96题选B。

7.(B型题)98具有益肾固精,养心安神功效的药物是

- A.山茱萸
- B.桑螵蛸
- C.莲子
- D.诃子
- E.金樱子

答案:C

解析:A补益肝肾,收敛固涩。B固精缩尿,补肾助阳。C固精止带,补脾止泻,益肾养心。D涩肠止泻,敛肺止咳,利咽开音。E固精缩尿止带,涩肠止泻。

8.(A1型题)1按照君臣佐使含义分析,麻黄汤中的炙甘草是

- A.臣药
- B.佐药
- C.使药
- D.臣佐药(注:即臣药兼有佐药之用)
- E.佐使药(注:即佐药兼有使药之用)

答案:E

解析:炙甘草既能调和麻、杏之宣降,又能缓和麻、桂相合之峻烈,使汗出不致过猛而耗伤正气,是使药而兼佐药之用。故本题选E。

9.(A1型题)4桂枝汤的组成中不含有的药物是

- A.麻黄
- B.芍药

- C.生姜
- D.大枣
- E.甘草

答案:A

解析:桂枝汤的组成有桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。故本题选A。

10.(A1型题)6银翘散的功效是

- A.辛凉宣泄,清肺平喘
- B.疏风清热,宣肺止咳
- C.辛凉透表,清热解毒
- D.疏风解毒,清肺泻热
- E.疏散风热,清肝明目

答案:C

解析:B属于桑菊饮的功效,A属于麻杏甘石汤的功效,辛凉透表,清热解毒,C属于银翘散的功效。故本题选C。

11.(A1型题)8银翘散和桑菊饮的组成中均含有的药物是

- A.银花、薄荷、桔梗、芦根
- B.连翘、薄荷、杏仁、芦根
- C.连翘、薄荷、桔梗、杏仁
- D.银花、薄荷、桔梗、生甘草
- E.连翘、薄荷、桔梗、生甘草

答案:E

解析:银翘散和桑菊饮均为治疗温病初起的辛凉解表方剂。组成中都有连翘、薄荷、桔梗、生甘草、芦根五味,但银翘散有银花配伍荆芥穗、豆豉、牛蒡子、竹叶,解表清热之力较强;桑菊饮有桑叶配伍杏仁,宣肺止咳之力较大。故本题选E。

12.(A1型题)10桑菊饮组成中不含有的药物是

- A.薄荷
- B.连翘
- C.杏仁
- D.桔梗
- E.双花

答案:E

解析:桑菊饮的组成是桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草、芦根。故本题选E。

13.(A1型题)12下列除哪项外,均是大承气汤主治证的临床表现

- A.腹痛便秘
- B.小便频数
- C.潮热谵语
- D.手足汗出
- E.下利清水

答案:B

解析：①阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。②热结旁流证。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。③里热实证之热厥、痉病或发狂等。故本题选B。

14.(A1型题)15半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A.人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B.人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C.半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
- D.柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
- E.半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣

答案：E

解析：半夏泻心汤：半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、炙甘草。小柴胡汤：柴胡、黄芩、人参、炙甘草、半夏、生姜、大枣。故本题选E。

15.(A1型题)17小青龙汤和竹叶石膏汤的组成中均含有的药物是

- A.芍药
- B.五味子
- C.半夏
- D.生石膏
- E.竹叶

答案：C

解析：小青龙汤：麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。竹叶石膏汤：竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米。故本题选C。

16.(A1型题)20清胃散除清胃外，还具有的功效是

- A.滋阴
- B.活血
- C.解毒
- D.止呕
- E.凉血

答案：E

解析：清胃散的功效是清胃凉血。故本题选E。

17.(A1型题)22肝胆湿热下注，阴肿阴痒，小便淋浊，带下黄臭者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案：B

解析：参见21题。故本题选B。

18.(A1型题)24理中丸的组成药物中含有

- A.附子
- B.白术
- C.生姜
- D.大枣
- E.饴糖

答案:B

解析:理中丸的组成有人参、干姜、甘草、白术。故本题选B。

19.(A1型题)27脾虚夹湿便溏泄泻者可以选用的方剂是

- A.参苓白术散
- B.归脾汤
- C.生脉散
- D.炙甘草汤
- E.玉屏风散

答案:A

解析:A益气健脾,渗湿止泻,适用于脾虚湿盛之证。B益气补血,健脾养心。C益气生津,敛阴止汗。D益气滋阴,通阳复脉。E益气固表止汗。故本题选A。

20.(A1型题)28一贯煎的功效是

- A.补气养阴
- B.补肾益阴
- C.滋阴降火
- D.补气生津
- E.滋阴疏肝

答案:E

解析:一贯煎滋阴疏肝,适用于肝肾阴虚,肝气郁滞证。故本题选E。

21.(A1型题)31越鞠丸的组成药物中含有

- A.苍术、黄柏
- B.苍术、厚朴
- C.苍术、白术
- D.苍术、羌活
- E.苍术、川芎

答案:E

解析:越鞠丸的药物组成有香附、川芎、苍术、梔子、神曲。故本题选E。

22.(A1型题)33朱砂安神丸中,配伍生地、当归的意义是

- A.凉血活血
- B.滋阴活血
- C.凉血补血
- D.补血活血
- E.滋阴补血

答案:E

解析:朱砂安神丸主治心火亢盛,阴血不足证。方中生地黄甘苦大寒,滋阴清热;当归甘辛苦温,补养心血,配伍生地以补其不足之阴血,共为佐药。故本题选E。

23.(A1型题)35四神丸的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案:E

解析:四神丸的组成有肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。故本题选E。

24.(A1型题)38生化汤主治证的病机是

- A.下焦蓄血
- B.血虚受寒
- C.气虚血滞
- D.冲任虚损
- E.血瘀气滞

答案:B

解析:生化汤的病机为血虚寒凝,瘀血阻滞证。主治产后恶露不行,小腹冷痛。故本题选B。

25.(A1型题)40温经汤的组成药物中含有

- A.丹皮、熟地黄
- B.川芎、丹参
- C.当归、芍药
- D.吴茱萸、干姜
- E.半夏、陈皮

答案:C

解析:温经汤的组成有吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。故本题选C。

26.(A1型题)42治疗跌打损伤,瘀血留于胁下,痛不可忍的常用方剂是

- A.桃核承气汤
- B.血府逐瘀汤
- C.生化汤
- D.补阳还五汤
- E.复元活血汤

答案:E

解析:复元活血汤主治跌打损伤,瘀血阻滞证。胁肋瘀肿,痛不可忍。本方证因跌打损伤,瘀血滞留胁肋,气机阻滞所致。胁肋为肝经循行之处,跌打损伤,瘀血停留,气机阻滞,故胁肋瘀肿疼痛,甚至痛不可忍。治当活血祛瘀,兼以疏肝行气通络。故本题选E。

27.(A1型题)44小蓟饮子与八正散相同的功效是

- A.利尿通淋
- B.燥湿解毒
- C.凉血止血
- D.泻火养阴
- E.利湿化浊

答案:A

解析:小蓟饮子凉血止血,利尿通淋。八正散清热泻火,利尿通淋。故本题选A。

28.(A1型题)47咳血方的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案:B

解析:咳血方的组成有青黛、瓜蒌仁、海粉、炒山梔子、诃子。故本题选B。

29.(A1型题)49下列除哪项外,均是地黄饮子所治暗痲证的临床表现

- A.舌强不能言
- B.足废不能用
- C.高热不能退
- D.口干不欲饮
- E.脉沉细而弱

答案:C

解析:地黄饮子主治下元虚衰、痰浊上泛之暗痲证。临床表现为舌强不能言,足废不能用,口干不欲饮,足冷面赤,脉沉细弱。故本题选C。

30.(A1型题)51治疗虚劳肺痿,应首先考虑的方剂是

- A.清燥救肺汤
- B.炙甘草汤
- C.麦门冬汤
- D.百合固金汤
- E.养阴清肺汤

答案:B

解析:炙甘草汤具有滋养阴血,益气温阳,复脉止悸功效,能治疗虚劳肺痿,症见咳嗽,涎唾多,形瘦短气,虚烦不眠,自汗盗汗等。A主治温燥伤肺证。C主治由肺胃阴虚,痰涎不化所致的肺痿。D主治肺肾阴虚,虚火上炎证。E主治白喉。故本题选B。

31.(A1型题)54藿香正气散的组成药物中,不含有的是

- A.陈皮
- B.枳壳
- C.厚朴



D.大腹皮

E.炙甘草

答案:B

解析:藿香正气散主治外感风寒,内伤湿滞证。A燥湿和胃。C、D可行气化湿,畅中除满。E调和诸药。方中无枳壳,有桔梗宣肺理膈,既有益于解表,又有助于化湿。故本题选为B。

32.(A1型题)56止嗽散的功效有

A.疏表宣肺

B.泻肺清热

C.宣肺平喘

D.疏风清热

E.理气化饮

答案:A

解析:止嗽散的功效是宣利肺气,疏风止咳。故本题选A。

33.(A1型题)58乌梅丸适用于

A.久咳

B.久痢

C.久疟

D.久瘀

E.久痹

答案:B

解析:乌梅丸适用于久泻久痢,多呈脾胃虚寒,肠滑失禁,气血不足而湿热积滞未去之寒热虚实错杂证候,本方集酸收涩肠、温阳补虚、清热燥湿诸法于一方,切中病机,故每可奏效。故本题选B。

34.(A2型题)59患者外感风寒,头痛发热,汗出恶风,鼻鸣干呕,口不渴,脉浮缓。

治疗应选用

A.麻黄汤

B.桂枝汤

C.银翘散

D.桑菊饮

E.麻杏甘石汤

答案:B

解析:上述症状为外感风寒、营卫不和所致。外感风邪,风性开泄,卫气因之失其固护之性,“阳强而不能密”,不能固护营阴,致令营阴不能内守而外泄,故恶风发热,汗出头痛,脉浮缓等;邪气郁滞,肺胃失和,则鼻鸣干呕;风寒在表,应辛温发散以解表,但本方证属表虚,腠理不固,故当解肌发表,调和营卫,即祛邪调正兼顾为治。故本题选B。

35.(A2型题)61肠痈初起患者,右少腹疼痛拒按,右足屈而不伸,伸则痛甚,时时

发热,身汗恶寒,舌苔黄腻。治疗应首选

A.仙方活命饮

- B. 大黄牡丹汤
- C. 普济消毒饮
- D. 阳和汤
- E. 黄连解毒汤

答案: B

解析: 上述症状多由肠中湿热郁蒸, 气血凝聚所致。湿热与气血互结成痈, 不通则痛, 故右少腹疼痛拒按。喜屈右足而不伸, 伸则痛剧, 是为缩脚肠痈; 时时发热, 身汗恶寒, 是肠痈已成; 舌苔黄腻为湿热内蕴之征。本证属于肠痈初起, 湿热瘀滞证, 治宜泻热破瘀, 散结消肿。故本题选B。

36.(A2型题)63患者眩晕, 目胀耳鸣, 脑部热痛, 心中烦热, 面色如醉, 脉弦长有力。治疗应选用

- A. 川芎茶调散
- B. 天麻钩藤饮
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 镇肝熄风汤
- E. 羚角钩藤汤

答案: D

解析: 肝为风木之脏, 体阴而用阳, 肝肾阴虚, 肝阳偏亢, 阳亢化风, 风阳上扰, 故见头目眩晕, 目胀耳鸣, 脑部热痛, 面红如醉; 肾水不能上济心火, 心肝火盛, 则心中烦热。治法应以镇肝熄风, 滋阴潜阳。故本题选D。

37.(A2型题)65患者, 男, 58岁。近日胸膈痞闷, 脘腹胀痛, 噯腐吞酸, 恶心呕吐, 饮食不消。治疗应首选

- A. 藿香正气散
- B. 平胃散
- C. 半夏厚朴汤
- D. 半夏泻心汤
- E. 越鞠丸

答案: B

解析: 脾为太阴湿土, 居中州而主运化, 其性喜燥恶湿, 湿邪滞于中焦, 则脾运不健, 且气机受阻, 故见胸膈痞闷, 脘腹胀痛; 胃失和降, 上逆而为呕吐恶心、噯气吞酸; 湿为阴邪, 其性重着黏腻, 故为肢体沉重、怠惰嗜卧。湿邪中阻, 下注肠道, 则为泄泻。治当燥湿运脾为主, 兼以行气和胃, 使气行则湿化。故本题选B。

38.(B型题)67患者外感风寒湿邪, 恶寒发热, 肌表无汗, 头痛项强, 肢体酸楚疼痛, 口苦而渴, 治疗应选用

- A. 防风通圣散
- B. 九味羌活汤
- C. 藿香正气散
- D. 川芎茶调散
- E. 败毒散

答案: B

解析:风寒湿邪侵犯肌表,郁遏卫阳,闭塞腠理,阻滞经络,气血运行不畅,故恶寒发热,肌表无汗,头痛项强,肢体酸楚疼痛;里有蕴热,故口苦微渴;苔白或微黄,脉浮是表证兼里热之佐证。治当发散风寒湿邪为主,兼清里热为辅。故67题选B。风寒湿邪袭于肌表,卫阳被遏,正邪交争,故见憎寒壮热,无汗;客于肢体、骨节、经络,气血运行不畅,故头项强痛,肢体酸痛;风寒犯肺,肺气郁而不宣,津液聚而不布,故咳嗽有痰,鼻塞声重,胸膈痞闷;舌苔白腻,脉浮按之无力,正是虚人外感风寒兼湿之佐证。治疗应该散寒祛湿,益气解表。故68题选E。

39.(B型题)69蒿芩清胆汤的功效是

- A.和解少阳,内泻热结
- B.和胃降逆,开结除痞
- C.寒热平调,消痞散结
- D.清胆利湿,和胃化痰
- E.理气化痰,清胆和胃

答案:D

解析:蒿芩清胆汤治少阳胆热偏重,兼有湿热痰浊中阻之证。全方具有清胆热、化痰湿、畅气机、和胃气的功效。故69选D。大柴胡汤是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成,具有和解和泻下双重功效。故70题选A。

40.(B型题)72肝胆湿热下注,阴肿阴痒,小便淋浊,带下黄臭者,治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案:B

解析:A镇肝熄风,滋阴潜阳。B泻肝胆实火,清下焦湿热,用于肝胆实火上扰之证。C清热泻火,利水通淋,用于湿热淋证。D清胆利湿,和胃化痰。E利湿化浊,清热解毒。

41.(B型题)74治疗热邪内陷心包,神昏谵语者,应首选

- A.羚角钩藤汤
- B.紫雪
- C.镇肝熄风汤
- D.苏合香丸
- E.生脉散

答案:B

解析:A凉肝熄风,增液舒筋。B清热开窍,熄风止痉,用于温热病,热闭心包及热盛动风之证。C镇肝熄风,滋阴潜阳。D芳香开窍,行气止痛。E益气生津,敛阴止汗。适用于温热、暑热、耗气伤阴证以及久咳伤肺、气阴两虚证。

42.(B型题)76四物汤的功效是

- A.补血调血
- B.健脾养心

- C.敛阴止汗
- D.益气健脾
- E.温补肾阳

答案:A

解析:四君子汤益气健脾,适用于脾胃气虚证。四物汤补血和血,调经化瘀,适用于营血虚滞证。

43.(B型题)78咳血方的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案:B

解析:四神丸的组成有:肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。咳血方的组成有:青黛、瓜蒌仁、海粉、山栀子、诃子。故77题选E,故78题选B。

44.(B型题)80患者头痛发热,烦渴欲饮,水入即吐,小便不利,舌苔白,脉浮。治疗应选用

- A.猪苓汤
- B.五苓散
- C.防己黄芪汤
- D.实脾散
- E.真武汤

答案:B

解析:A利水,养阴,清热,适用于水热互结证。B利水渗湿,温阳化气。主治膀胱气化不利之蓄水证。C益气祛风,健脾利水。D温阳健脾,行气利水。E温阳利水。

45.(A1型题)1下列关于十二经脉循行走向的描述,正确的是

- A.手三阳从头走手
- B.手三阳从手走头
- C.手三阳从手走胸
- D.足三阳从足走头
- E.足三阴从胸走足

答案:B

解析:手三阴经络分布于上肢的内侧以及胸部,气血运行按“从胸走手”方向,下接手三阳经;手三阳经络分布在上肢的外侧以及头部,气血运行按“从手走头”方向,下接足三阳经;足三阳经络分布在头、身及下肢的外侧,气血运行按“从头走足”方向,下接足三阴经;足三阴经络分布在下肢的内侧以及胸腹部,气血运行按“从足走腹”方向,下接手三阴,循环往复。故本题选B。

46.(A1型题)4下列腧穴中,属化痰要穴的是

- A.丰隆
- B.足三里

- C.阴陵泉
- D.内关
- E.百会

答案:A

解析:丰隆和胃气,化痰湿,为化痰要穴;足三里调理脾胃,扶正培元,为保健要穴;阴陵泉运中焦、化湿滞,利水道,主治小便不利,水肿,腹寒胀气等;内关宁心安神,和胃宽胸,降逆止呕,主治失眠健忘,胸闷,胸痛,恶心呕吐等;百会平肝熄风,安神醒脑,开窍明目,升提阳气,主治眩晕,失眠健忘,中风,脱肛等。故本题选A。

47.(A1型题)5下列穴组可治疗心、胸、胃疾病的配穴是

- A.公孙、内关
- B.后溪、申脉
- C.足临泣、外关
- D.列缺、照海
- E.膻中、中脘

答案:A

解析:通于冲脉的公孙和通于阴维脉的内关,通于心、胸、胃,对于气机不利,气逆上冲的心、胃、胸膈的疾患,具有理气降逆,通肠和胃,宣通上下的功效,呕吐、呃逆、胃痛、反胃、噤口痢、干霍乱等,凡适用于上法者,均可取此二穴施治;通于督脉的后溪和通于阳跷脉的申脉,通于目内眦、颈、项、耳、肩、小肠、膀胱,两穴相配,主治头项、耳、目、肩、腰背疾患;通于阳维脉的外关穴和通于带脉的足临泣,通于目锐眦、耳后、颈项、肩,二穴配伍,主治耳、目、颈项及肩部病;通于任脉的列缺和通于阴跷脉的照海,通于肺系、咽喉和胸膈,二穴配伍,主治咳嗽、胸满、咽喉不利等病证;膻中利气,宽胸,催乳,主治哮喘、胸痹、产后乳汁不足等;中脘主治胃部疾患。故本题选A。

48.(A1型题)8退热,首选的穴位是

- A.天枢
- B.大椎
- C.足三里
- D.太溪
- E.丰隆

答案:B

解析:大椎解表清热,为退热的要穴;天枢理气消滞,治疗腹胀;足三里调理脾胃,治疗胃脘疾病,也是保健要穴;太溪益肾,用来补肾;丰隆化痰湿,主要用来治疗痰证。故本题选B。

49.(A1型题)10下列哪项属于表里经配穴

- A.咳嗽取尺泽、鱼际
- B.感冒取列缺、合谷
- C.膝痛取阳陵泉、阴陵泉
- D.胃痛取中脘、内庭
- E.痛经取地机、隐白

答案:B

解析:列缺为手太阴肺经穴,合谷为手阳明大肠经穴。肺与大肠相表里。故本题选B。

50.(A1型题)12疼痛在腰脊中部,主要与哪条经脉相关

- A.足太阳膀胱经
- B.足少阴肾经
- C.足少阳胆经
- D.带脉
- E.督脉

答案:E

解析:腰痛在腰脊正中部,为督脉病证;疼痛部位在腰脊两侧,为足太阳经证。故本题选E。

51.(A2型题)13患者,男,40岁。突发胃痛,呕吐,腹胀,腹泻。治疗应首选

- A.足三里
- B.关元
- C.命门
- D.大椎
- E.肾俞

答案:A

解析:关元益肾气,利下焦,回阳救逆,主治真阳不足,下焦虚寒,休克早期等;命门利腰脊,温肾阳,理血,清热,主治腰脊痛,带下,消渴等;大椎升阳益气,退热补虚,主治外感发热,虚汗,盗汗等;肾俞益肾气,利腰脊,聪耳目,主治虚劳腰痛,小便不利,耳鸣等;足三里调理脾胃,降逆利气,扶正培元,主治脾胃疾病。患者胃痛,呕吐,腹胀,腹泻,表现为脾胃疾患,故治疗应首选足三里。故本题选A。

52.(A2型题)16某男,63岁。头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细。除风池、百会外,应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

答案:D

解析:患者主诉头晕目眩,甚则昏眩欲仆,故可诊断为眩晕。耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细为肾精亏损之象。故治法以益气养血定眩。取穴时除风池、百会、肝俞、肾俞、足三里外,应配以太溪、悬钟、三阴交。故本题选D。

53.(B型题)19属特殊作用中双相调节作用的是

- A.中脘治疗呕吐
- B.承泣治疗眼病
- C.内关既治疗心动过速又可治疗心动过缓
- D.合谷治疗牙痛

E.阿是穴治疗局部疼痛

答案:C

解析:腧穴的远治作用, 主要指分布在十四正经四肢部的穴位通过经脉的联系, 对头面躯干和内脏疾病起治疗影响。如合谷如位于手部, 它不仅能够治疗手部病证, 还可以治疗本经手阳明大肠经循行路过的颈部和头面部的病证。A、B、E都是近治作用, C是腧穴的双向调节作用。故18题选D。有些腧穴有特殊的双向调节作用, 对机体的不同状态有着双向的良性调节作用, 如内关既治疗心动过速又可治疗心动过缓, 针刺天枢既可止泻又可通便。故19题选C。

54.(B型题)21特定穴中, 多用于治疗表里两经病证的是

- A.原穴
- B.郄穴
- C.络穴
- D.井穴
- E.募穴

答案:C

解析:特定穴中, 原穴可调整脏腑经络的功能, 既可补虚, 又可泻实; 阴经郄穴有止血作用, 阳经郄穴偏于止痛; 络穴一络通二经, 即络穴不仅治本经病, 也能治其相表里经的病证; 井穴具有交通阴阳气血的作用, 多用于急救, 有开窍醒神, 消炎镇痛之效; 募穴可治本脏腑病及阳经经络病症。

55.(A1型题)1慢性支气管炎风热犯肺证的治法是

- A.清热解毒, 泻肺除痰
- B.清热解毒, 宣肺化痰
- C.清肺化痰, 肃肺止咳
- D.辛凉解表, 清肺化痰
- E.疏风清热, 润肺止咳

答案:E

解析:风热犯肺证的治法是疏风清热, 宣肺止咳。A多用于治疗水饮停肺证。B多用于邪毒壅肺证。C多用于痰热郁肺证。D多用于风热犯表证。故本题选E。

56.(A1型题)3治疗慢性支气管炎痰湿蕴肺证, 宜选用

- A.五苓散
- B.二陈汤
- C.三拗汤
- D.真武汤
- E.香砂六君子汤

答案:B

解析:慢性支气管炎痰浊阻肺证治以化痰燥湿, 方用二陈汤合三子养亲汤。A用于治疗蓄水证。C用于治疗风寒袭肺证。D用于治疗阳虚水泛证。E用于治疗脾胃虚寒证。故本题选B。

57.(A1型题)5哮喘发生的病机主要是

- A.肺气虚弱

- B.外邪侵袭于肺, 肺气不利
- C.饮食生冷, 损伤肺气
- D.痰气相搏, 气道被阻
- E.肾不纳气

答案:D

解析:哮喘病的病理基础是宿痰伏肺, 因外邪、饮食、情志、劳倦等诱因引动而触发, 以致痰壅气道, 肺气宣降功能失常。故本题选D。

58.(A1型题)7肺炎球菌肺炎发病1~2天后, 其痰液特点

- A.白色黏液痰
- B.黏液泡沫痰
- C.黏液脓性痰
- D.铁锈色痰
- E.大量脓痰

答案:D

解析:肺炎球菌肺炎初期痰色为白色黏液痰或带血丝痰, 经1~2天后可咳出铁锈色痰, 最后进入消散期, 痰量多稀薄色黄。B多见于肺水肿或肺淤血。C多见于支气管炎或支气管哮喘。E多见于肺脓肿或支气管扩张。故本题选D。

59.(A1型题)9肺炎热陷心包证, 其主要临床表现除发热夜甚外, 还有

- A.神昏谵语
- B.口燥咽干
- C.五心烦热
- D.大便秘结
- E.脉洪而数

答案:A

解析:肺炎热陷心包证主要表现为发热夜甚, 身灼热, 神昏谵语或昏聩不语, 口燥咽干, 大便秘结, 小便短赤, 舌绛, 无苔或少苔干黄, 脉洪而数。C多是阴虚火旺证。故本题选A。

60.(A1型题)11肺炎球菌肺炎风热犯肺证的治法是

- A.疏风清热, 宣肺止咳
- B.清热化痰, 宽胸止咳
- C.清热解毒, 化痰开窍
- D.益气养阴, 回阳固脱
- E.益气养阴, 润肺化痰

答案:A

解析:肺炎球菌肺炎的风热犯肺证治以疏风清热、宣肺止咳, 方用桑菊饮。B是痰热壅肺的治法。C是热闭心神的治法。D是气阴欲脱的治法。E是气阴亏虚的治法。故本题选A。

61.(A1型题)13治疗肺结核肺阴亏损证, 应首选的方剂是

- A.月华丸
- B.百合固金汤合秦艽鳖甲散



- C.保真汤
- D.补天大造丸
- E.千金苇茎汤

答案:A

解析:治疗肺结核肺阴亏损证,宜滋阴润肺,方用月华丸。B用于治疗阴虚火旺证。C治疗气阴耗伤证。D用于阴阳两虚证。E用于肺痈。故本题选A。

62.(A1型题)15治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证,应首选的方剂是

- A.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- B.血府逐瘀汤
- C.导痰汤
- D.沙参麦冬汤
- E.十枣汤

答案:D

解析:治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证,治以益气养阴,方用沙参麦冬汤。A用于阴虚毒热证。B多用于瘀血证。C用于痰湿毒蕴。E多用于伏饮积痰证。故本题选D。

63.(A1型题)17慢性心功能不全的基本病因是

- A.严重心律失常
- B.感染
- C.心肌收缩、舒张功能受损
- D.钠盐摄入过多
- E.过度体力劳动

答案:C

解析:此题暂无解析

64.(A1型题)19心力衰竭之心肾阳虚、痰饮上逆证的治法是

- A.补益心肺,活血通瘀
- B.温补心肾,通阳利水
- C.温补心肾,泻肺逐饮
- D.补益心肺,化痰逐饮
- E.温补心脾,祛痰活血

答案:B

解析:心力衰竭时心肾阳虚、痰饮上逆证的治法是温补心肾、通阳利水。A是心肺气虚血瘀证的治法。C是心肾阳虚,水饮伏肺的治法。D是心肺气虚,痰饮内停证的治法。E是心脾阳虚,痰瘀互结证的治法。故本题选B。

65.(A1型题)21患者,男,55岁。患慢性冠状动脉供血不足5年。其心电图诊断之一为“I度房室传导阻滞(房室传导延缓)”。其心电图表现应为

- A.P波增宽
- B.P-R间期延长
- C.QRS波群时限延长
- D.ST段延长

E.Q-T间期延长

答案:B

解析:Ⅰ度房室传导阻滞心电图表现为①P-R间期 $>0.20$ 秒;②每个P波后均有QRS波群。A是左房肥大的表现。C多提示心室肥大、心室内传导阻滞及预激综合征等。D、E多提示心肌缺血、心室肥大、心肌损害、心室内阻滞等。故本题选B。

66.(A1型题)23急性心梗并发心力衰竭,24小时内禁用的是

A.利尿剂

B.ACEI

C.洋地黄

D.硝酸甘油

E.硝普钠

答案:C

解析:洋地黄可能引起室性心率失常宜慎用。由于最早期出现的心力衰竭主要是心肌间质充血、水肿引起顺应性下降所致,而左心室舒张末期容量尚不增大,故在急性心梗并发心力衰竭,24小时内禁用洋地黄。故本题选C。

67.(A1型题)24原发性高血压是指

A.慢性肾炎引起的高血压

B.肾动脉狭窄引起的高血压

C.嗜铬细胞瘤引起的高血压

D.原发性醛固酮增多症引起的高血压

E.未明原因的高血压

答案:E

解析:原发性高血压是指原因不明的高血压,而A、B、C、D均是继发性高血压,即血压升高是某些疾病的一种临床表现,本身有明确而独立的病因。故本题选E。

68.(A1型题)26眩晕肝阳上亢证的治法是

A.滋阴平肝

B.补肾填精

C.平肝潜阳

D.化痰祛湿

E.滋阴补阳

答案:C

解析:眩晕肝阳上亢证应治以平肝潜阳。A多用于肝肾阴虚、肝阳上亢证。B多用于肾精不足证。D多用于痰湿阻滞证。E多用于阴阳两虚证。故本题选C。

69.(A1型题)28治疗高血压病痰湿内盛证,应首选的方剂是

A.半夏白术天麻汤

B.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤

C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤

D.天麻钩藤饮

E.济生肾气丸

答案:A

解析:治疗高血压病痰湿内盛证,宜燥湿化痰,方用半夏白术天麻汤。B用于痰浊闭阻之胸痹。C多用于寒凝心脉证。D治疗肝阳上亢证。E多用于肾虚水肿证。故本题选A。

70.(A1型题)29下列各项,除哪项外,均是引起冠心病的原因

- A.情志失调
- B.饮食不当
- C.寒邪内侵
- D.水湿内停
- E.脏气虚衰

答案:D

解析:冠心病相当于中医中的“胸痹”,通常认为其致病因素有年老体虚、饮食不当、情志失调、寒邪内侵致心肝脾肾功能失调,心脉痹阻而产生此病。故本题选D。

71.(A1型题)31治疗心绞痛寒痰痹阻证,应首选

- A.大七气汤
- B.生脉散合温胆汤
- C.桃红四物汤
- D.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- E.保元汤

答案:D

解析:心绞痛寒痰痹阻证治以温阳泄浊、豁痰开结,方用瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤。A多用于积聚。B多用于痰热互结伤阴证。C用于血虚血瘀证。E多用于气虚证。故本题选D。

72.(A1型题)35风湿性心脏病瓣膜病心气亏虚型,其治法是

- A.益气养阴
- B.滋阴补阳
- C.滋阴安神
- D.补益心气
- E.滋补肾阴

答案:D

解析:风湿性心脏病心气亏虚证宜治以补益心气。A是气阴两虚证的治法。B是阴阳两虚证的治法。C是虚火扰神的治法。E是肾阴虚证的治法。故本题选D。

73.(A1型题)36治疗心肌梗死心阳欲脱证,应首选的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.参附龙牡汤
- E.当归四逆汤合苏合香丸

答案:D

解析:治疗心肌梗死心阳欲脱证宜益气温阳,回阳救逆,方用参附龙牡汤。A用于治疗风痰上扰证。B用于治疗痰浊闭阻证。C用于寒凝心脉证。E用于血虚寒厥证。故本题选D。

74.(A1型题)38治疗慢性浅表性胃炎胃阴不足证应首选

- A.良附丸
- B.保和丸
- C.化肝煎
- D.失笑散
- E.益胃汤

答案:E

解析:慢性浅表性胃炎胃阴不足证,治以滋养胃阴,方用益胃汤。A多用于寒邪客胃证。B多用于饮食停滞证。C多用于肝胃郁热证。D多用于瘀血停滞证。故本题选E。

75.(A1型题)40消化性溃疡肝胃郁热型的治法是

- A.疏肝理气,和胃止痛
- B.疏肝泻热,和胃止痛
- C.健脾益气,温中和胃
- D.活血化瘀,和胃止痛
- E.养阴益胃,和阳生津

答案:B

解析:消化性溃疡肝胃郁热证治以疏肝泻热、和胃止痛。A为肝胃不和证的治法。C多为脾胃虚寒证的治法。D多是瘀血停滞证的治法。E多为胃阴亏虚证的治法。故本题选B。

76.(A1型题)42治疗消化性溃疡脾胃虚寒证,应首选

- A.理中丸合黄芪建中汤
- B.一贯煎
- C.化肝煎
- D.失笑散合丹参饮
- E.柴胡疏肝散

答案:A

解析:消化性溃疡脾胃虚寒证治以温中健脾、和胃止痛,方用理中丸和黄芪建中汤。B多用于胃阴亏虚证。C多用于肝胃郁热证。D多用于瘀血阻滞证。E多用于肝气犯胃证。故本题选A。

77.(A1型题)44消化性溃疡胃阴不足证的治法是

- A.疏肝理气,健脾和胃
- B.温中散寒,健脾和胃
- C.健脾养阴,益胃止痛
- D.清胃泻热,疏肝理气
- E.活血化瘀,通络和胃

答案:C

解析:消化性溃疡胃阴不足证治宜健脾养阴,益胃止痛,方用一贯煎。A治疗肝胃不和证。B治疗脾胃虚寒证。D治疗肝胃郁热证。E治疗瘀阻胃络证。故本题选C。

78.(A1型题)46胃癌肝胃不和证的治法是

- A.疏肝和胃
- B.理气化痰
- C.健脾和胃
- D.补气养血
- E.消食散结

答案:A

解析:胃癌肝胃不和证治以疏肝理气、和胃止痛。B治疗气滞痰阻证。C治疗脾胃虚弱证。D多治疗气血不足证。E治疗饮食停滞证。故本题选A。

79.(A1型题)48溃疡型胃癌的胃肠X线,主要表现是

- A.胃壁出现双重阴影
- B.胃壁僵硬
- C.胃腔明显减少
- D.龛影
- E.黏膜皱襞平坦

答案:D

解析:X线检查对胃癌的诊断具有较大的价值。胃癌可表现为龛影。溃疡型胃癌主要发生在肿块上,故其龛影位于胃轮廓之内,龛影直径常大于2.5CM,边缘不整齐,可示半月征。龛影因癌性浸润而使边缘不齐,并为一圆形较透明带所环绕,称为环堤征,临近黏膜僵直,蠕动消失。故溃疡型胃癌的胃肠X线具有特征性。故本题选D。

80.(A1型题)51确诊早期肝硬化最有价值的检查是

- A.B型超声波
- B.食道钡餐造影
- C.CT
- D.血清蛋白电泳
- E.肝穿刺活体组织学检查

答案:E

解析:A可提示肝硬化,但不能作为确诊依据,约1/3的肝硬化患者超声无异常发现,但可以作为早期筛查方法。B是诊断门静脉高压的最可靠指标。C在诊断肝硬化方面意义不大。D对肝硬化的诊断特异性不高。E仍是到目前为止诊断肝纤维化的最可靠方法。故本题选E。

81.(A1型题)53肝硬化气滞湿阻证的治法是

- A.温补脾肾,通阳利水
- B.滋养肝肾,育阴利水
- C.活血化瘀,利水消肿
- D.运脾利湿,行气化水
- E.疏肝理气,行湿散满

答案:E

解析:肝硬化气滞湿阻证常治以疏肝理气、行湿散满。余项参见52题。故本题选E。

82.(A1型题)54治疗鼓胀肝肾阴虚型应首选

- A.柴胡疏肝散
- B.胃苓汤
- C.一贯煎合猪苓汤
- D.附子理中汤
- E.济生肾气丸

答案:C

解析:鼓胀肝肾阴虚证应治以滋养肝肾,育阴利水,方用一贯煎合猪苓汤。A用于治疗气滞湿阻证。B用于治疗脾虚湿盛证。D用于治疗脾肾阳虚证。E治疗肾虚水肿证。故本题选C。

83.(A1型题)56对于发现早期亚临床型肝癌最有价值的是

- A.典型症状
- B.AFP(甲胎蛋白)结合B超检查
- C.典型体征
- D.肝炎病史
- E.明显消瘦

答案:B

解析:原发性肝癌起病隐匿,早期缺乏典型症状。临床症状明显者,病情多已进入中晚期。AFP及B超现已广泛运用于原发性肝癌的普查、诊断、判断治疗效果及预测复发,是目前肝癌筛查的首选检查方法。故本题选B。

84.(A1型题)59下列各项,对诊断急性肾小球肾炎最有意义的是

- A.血尿
- B.蛋白尿
- C.水肿、高血压
- D.血沉增快
- E.血清补体C<sub>3</sub>下降,在肾炎症状出现后8周内恢复正常

答案:E

解析:在链球菌感染后1~3周发生血尿、蛋白尿、水肿和高血压,甚至少尿及氮质血症等急性肾炎综合征表现,伴血清C<sub>3</sub>下降,病情于发病后8周内逐渐减轻到完全恢复正常者,即可诊断为急性肾炎。其中血清C<sub>3</sub>的变化,对诊断本病的意义很大。故本题选E。

85.(A1型题)66中医学认为泌尿系统感染的发病多由于

- A.气火郁于下焦
- B.肾虚下元不固
- C.湿热蕴结下焦
- D.湿热耗伤正气
- E.脾肾亏虚

答案:C

解析:参见65题。故本题选C。

86.(A1型题)69治疗急性肾盂肾炎下焦湿热型,应首选

- A.知柏地黄汤
- B.猪苓汤
- C.程氏萆薢分清饮
- D.八正散
- E.真武汤

答案:D

解析:急性肾盂肾炎下焦湿热型应治以清热利湿通淋,方用八正散。A用于肝肾阴虚火旺证。B用于水热互结证。C用于膏淋实证。E用于阳虚水泛证。故本题选D。

87.(A1型题)72丹栀逍遥散合石韦散治疗尿路感染的中医治法是

- A.疏肝理气,清热通淋
- B.清热利湿通淋
- C.健脾补肾
- D.滋阴益肾,清热通淋
- E.清心泻火,利湿通淋

答案:A

解析:丹栀逍遥散合石韦散可疏肝理气,清热通淋。B用八正散。C用无比山药丸。D用知柏地黄丸合猪苓汤。E用八正散。故本题选A。

88.(A1型题)76下列哪项不是再生障碍性贫血的中医证型

- A.热入营血
- B.气血两虚
- C.阳虚水停
- D.脾肾阳虚
- E.肝肾阴虚

答案:C

解析:再生障碍性贫血即是中医学中的“髓劳”,一般分为热入营血、脾虚血亏证、脾肾阳虚证、肝肾阴虚证、肾阴阳两虚证、血虚挟瘀证。故本题选C。

89.(A1型题)79治疗急性白血病热毒炽盛证,应首选

- A.玉女煎合丹参饮
- B.黄连解毒汤合清营汤
- C.知柏地黄汤合二至丸
- D.温胆汤合桃红四物汤
- E.五阴煎

答案:B

解析:急性白血病热毒炽盛证宜治以清热解毒、凉血止血,方用黄连解毒汤合清营汤。A多用于阴虚血瘀证。C多用于肝肾阴虚证。D多用于痰热瘀阻证。E多用于真阴亏损、脾虚失血证。故本题选B。

90.(A1型题)84中医学认为,甲状腺功能亢进症的病因不是

- A.外感六淫
- B.饮食不节
- C.禀赋不足
- D.劳倦体虚
- E.情志内伤

答案:A

解析:中医学认为,甲状腺功能亢进的病因主要是情志内伤、饮食及水土失宜,但也与体质因素等有密切关系。故本题选A。

91.(A1型题)88下列关于消渴病机的叙述,错误的是

- A.阴虚为本,燥热为标
- B.气阴两伤或阴阳俱虚
- C.多兼血瘀
- D.变证百出
- E.阴虚湿热

答案:E

解析:中医认为本病基本病机为本虚标实,阴虚为本,燥热为标,迁延日久,阴损及阳,则气阴两伤,阴阳俱虚,阴虚燥热,常见变证百出,此外消渴亦常与血瘀有关。故本题选E。

92.(A1型题)92金匱肾气丸适用于治疗糖尿病的证型是

- A.胃热炽盛
- B.气阴两虚
- C.肺热津伤
- D.阴阳两虚
- E.肾阴亏虚

答案:D

解析:金匱肾气丸能温阳育阴,治疗糖尿病的阴阳两虚证。B多选用生脉散。E多选用六味地黄丸。故本题选D。

93.(A1型题)96风湿热风寒湿阻证,治疗应首选的方剂是

- A.蠲痹汤
- B.独活寄生汤
- C.五阴煎
- D.白虎加桂枝汤
- E.防风汤

答案:A

解析:治疗风湿热风寒湿阻,治以祛风化湿,散寒宣痹,方选蠲痹汤加减。B用于风湿热气血两虚。C用于风湿热气阴两虚。D用于风湿热热邪痹阻。故本题选A。

94.(A1型题)99癫痫肝肾阴虚证的治法是

- A.补益肝肾,育阴熄风
- B.健脾和胃,化痰熄风



- C.活血化痰, 通络熄风
- D.清热化痰, 熄风定痫
- E.清肝泻火, 化痰熄风

答案:A

解析:癫痫肝肾阴虚证的治法宜补益肝肾, 育阴熄风, 方用左归丸。B为脾虚痰湿证的治法。C为瘀阻清窍证的治法。D为痰热内扰的治法。E为肝郁痰火证的治法。故本题选A。

95.(A1型题)101下列各项, 大脑中动脉病变不会出现的是

- A.病变对侧偏瘫
- B.病变对侧偏身感觉障碍
- C.嗅觉障碍
- D.病变对侧同向偏盲
- E.失语或失认

答案:C

解析:大脑中动脉主干闭塞出现典型的“三偏征”, 即病变对侧偏瘫、偏身感觉障碍和同向偏盲, 优势半球病变伴失语。故本题选C。

96.(A2型题)104患者, 女, 58岁。咳声重浊, 反复发作, 咯痰黏稠, 色白量多, 胸闷呕恶, 舌苔白腻, 脉濡滑。其证型是

- A.痰湿蕴肺
- B.寒痰阻肺
- C.燥痰伤肺
- D.痰热郁肺
- E.肝火犯肺

答案:A

解析:患者以痰多色白质黏、胸闷、苔白腻、脉濡滑等为主要表现, 因此辨证为痰湿蕴肺证。B型应表现为呼吸急促, 喉间有哮鸣音, 痰白而黏或稀薄多沫, 胸膈满闷如窒, 面色晦暗带青, 苔白滑, 脉浮紧等。C以干咳少痰, 痰黏难咯, 口干咽燥, 舌红少苔乏津, 脉细数等为主要表现。D以咳嗽吐黄痰, 口干, 恶心呕吐, 腹胀纳呆或腹部胀痛, 小便短赤, 舌红苔黄腻, 脉滑数等为主要表现。E主要与情志有密切关系。故本题选A。

97.(A2型题)107患者, 男, 23岁。有花粉过敏史。突然出现咳嗽, 打喷嚏, 呼吸困难, 不能平卧, 喉中痰鸣, 发热, 汗出, 舌红苔黄, 脉弦滑。对诊断最有意义的检查是

- A.肺功能
- B.心电图
- C.血气分析
- D.血常规
- E.痰涂片镜检、培养

答案:A

解析:根据患者花粉过敏病史, 及突然咳嗽、打喷嚏、喉中痰鸣等临床症状, 高度怀疑此为支气管哮喘急性发作。A对于急性发作的哮喘病人常明显受限, 但属于

诊断哮喘的依据。B无明显意义。C用于判断哮喘的严重程度。D为一般检查，对哮喘的诊断意义不大。E对于哮喘的诊断意义不及肺功能。故本题选A。

98.(A2型题)109患者，男，64岁。患哮喘20年，胸痹5年。今日突感鼻痒，随即出现呼吸困难，张口抬肩，汗出。查体：心率112次/分，双肺满布哮鸣音。错误的处理是

- A.吸氧
- B.静滴氨茶碱
- C.静滴氢化可的松
- D.口服硝苯地平
- E.皮下注射吗啡

答案:E

解析:支气管哮喘急性发作时处理有①氧疗;②解痉平喘:氨茶碱、抗胆碱药、 $\beta_2$ 受体激动剂;③纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱;④抗生素;⑤糖皮质激素;⑥其他药物:防治支气管哮喘的药物,如硝苯地平、维拉帕米等。E多用于治疗心源性哮喘。故本题选E。

99.(A2型题)111患者，女，21岁。突感胸闷，呼吸困难，大汗。查体：口唇微绀，呼吸急促，听诊双肺布满干啰音，心率96次/分。既往有类似发作，有时休息后可缓解。为缓解症状，应首选的措施是

- A.喷吸激素(二丙酸氯地米松)
- B.口服强的松
- C.吸氧
- D.静脉注射安定
- E.吸入沙丁胺醇或舒喘灵气雾剂

答案:A

解析:此患者发病急，以呼吸困难为主要表现，且有该疾病史。考虑是支气管哮喘急性发作。糖皮质激素是目前控制哮喘发作最有效的药物，首选吸入，吸入无效时口服。当糖皮质激素效果不佳时可加 $\beta_2$ 受体激动剂。故本题选A。

100.(A2型题)113患者，男，25岁。因淋雨后高热畏寒，今日高热骤降，大汗肢冷，胸痛不止，咳嗽气急，咯铁锈色痰，唇甲青紫，神情淡漠，舌红少津，脉微细欲绝。应首选考虑的是

- A.干性胸膜炎
- B.休克型肺炎
- C.心绞痛
- D.胃溃疡穿孔
- E.急性心肌梗死

答案:B

解析:患者年纪轻，有受凉史，有肺部感染的表现，如咳嗽气急、咯铁锈色痰、胸痛等，另有大汗肢冷、神情淡漠、唇甲青紫、脉微欲绝等外周循环障碍的休克表现，考虑为休克型肺炎。A以胸痛为主要表现，多无休克表现。C多能自行缓解，无休克表现。D以腹膜刺激征为主要表现。E可有休克表现，但发病多有诱因，且肺部感染不明显。故本题选B。

101.(A2型题)116患者,男,63岁。因刺激性咳嗽,痰中带血3周就诊。气短自汗,纳呆便溏,查痰找到癌细胞,舌淡胖有齿痕,脉沉缓。其证型是

- A.脾肺气虚
- B.肺肾气虚
- C.肺肾阴虚
- D.脾肾阳虚
- E.气血两虚

答案:A

解析:患者已确诊为肺癌。根据气短自汗、纳呆便溏,此患者可辨为脾肺气虚证。B多表现为短气喘息。C表现为咳嗽痰少或痰中带血,口燥咽干,或声音嘶哑,腰膝酸软,或见骨蒸潮热,盗汗颧红。D多表现为泄泻或水肿。E表现为黏膜皮肤苍白、四肢倦怠、食欲减退、头昏眼花等。故本题选A。

102.(A2型题)119患者,男,53岁。慢性肺源性心脏病史,咳嗽痰多,色白黏腻,气短喘息,脘痞纳少,倦怠乏力,舌质淡,苔薄腻,脉滑。其中医治法是

- A.清肺化痰,降逆平喘
- B.涤痰开窍,熄风止痉
- C.温肾健脾,化饮利水
- D.补肺纳肾,降气平喘
- E.健脾益肺,化痰降气

答案:E

解析:本患者症状经辨证属于痰湿阻肺兼脾虚证,故治宜健脾益肺,化痰降气。A多用于痰热壅盛证。B多用于痰扰心神证。C多用于阳虚水泛证。D多用于肺肾气虚证。故本题选E。

103.(A2型题)121患者,女,23岁。活动后气促半年。查体:颧部紫红,心尖区听到局限性舒张期隆隆样杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进。应首先考虑的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.二尖瓣关闭不全合并狭窄
- D.主动脉瓣狭窄
- E.肺动脉瓣狭窄

答案:B

解析:此患者颧部紫红,心尖部可听到舒张期杂音即为二尖瓣狭窄的表现。余参见123题。故本题选B。

104.(A2型题)124患者,女,35岁。风湿性二尖瓣闭锁不全10年,现下肢水肿,喘促气短,腰膝酸软,形寒肢冷,心悸胸闷,小便短少,舌淡苔腻,脉沉细。治疗应首选

- A.真武汤
- B.葶苈大枣泻肺汤
- C.保元煎
- D.参附汤
- E.通脉四逆汤

答案:A

解析:患者久病伤阳,肾阳虚衰,不能蒸腾气化,水湿内停于下,泛滥肌肤,而见下肢水肿、小便短少。肾虚不纳气而见喘促气短。阳虚温煦失职见腰膝酸软、形寒肢冷。水气凌心,抑遏心阳,则见心悸,水湿内停见胸闷。舌脉均为肾阳虚兼湿停之证,辨证为阳虚水泛,方用真武汤。B用于水饮停肺证。C用于气虚证。D用于阳气虚脱证。E用于阴盛格阳证。故本题选A。

105.(A2型题)127患者,男,62岁。患高血压病8年,突发气促,端坐呼吸,咯吐粉红色泡沫痰。检查:双肺广泛水泡音,血压160/90mmHg。治疗应首选

- A.氨茶碱
- B.螺内酯(安体舒通)
- C.地高辛
- D.吗啡
- E.多巴酚丁胺

答案:B

解析:参见22题。故本题选B。

106.(A2型题)130患者,女,65岁。因冠心病心绞痛反复发作3年住院。胸痛绵绵,心悸失眠,气短乏力,潮热多汗,口干,伴头晕耳鸣,舌红少苔,脉细数无力。首选

- A.保元汤
- B.肾气丸
- C.生脉散
- D.大七气汤
- E.温胆汤

答案:C

解析:患者已明确是心绞痛。心气阴虚无以濡养心脉及心神,故见胸痛绵绵、心悸失眠。气虚而见气短乏力多汗,阴虚阴液不足见口干、潮热。舌红少苔、脉细数无力均为气阴两虚的表现。故辨证为气阴两虚证,方用生脉散。A多用于痈疽之气虚证。B多用于肾阳不足证。D多用于积聚证。E多用于痰热内盛证。故本题选C。

107.(A2型题)132患者,男,65岁。胸闷刺痛,痛有定处,恶心呕吐,口中黏腻,头晕目眩,心悸气短,面部暗青,舌质紫暗,舌体胖大,苔白腻,脉弦滑。其治法是

- A.豁痰化瘀,行气止痛
- B.通阳泄浊,豁痰散结
- C.益气养阴,活血化瘀
- D.健脾化湿,祛痰通络
- E.温阳补肾,活血祛痛

答案:D

解析:患者年逾六旬,痰瘀互结,胸阳不运而见胸闷刺痛,痛有定处。胸阳不展心气被遏故见心悸气短。寒湿上泛于口,见口中黏腻。湿聚困脾,致脾失健运,痰湿阻滞中焦而见恶心呕吐,痰湿上泛于清窍而头晕目眩。面部暗青舌质紫暗为血瘀之证,舌苔脉象均为痰瘀阻络之证。故辨证为脾虚湿阻、痰瘀互结证,治以健脾化湿、祛痰通络。故本题选D。

108.(A2型题)134患者,男,46岁。心胸阵作隐痛,疾走则发,胸闷气短,动则尤甚,心悸,倦怠无力,神疲懒言,面白易出汗,舌淡胖苔薄白,脉虚细缓。心电图示ST段压低,T波倒置。应考虑的诊断是

- A.心绞痛,心气不足
- B.心绞痛,心阴亏虚
- C.心绞痛,心虚胆怯
- D.心肌梗死,心气不足
- E.心肌梗死,心阴亏虚

答案:A

解析:患者心电图提示心肌缺血,无心肌梗死之症。心气亏虚,致心气鼓动无力,见胸部阵作隐痛。劳则气耗,故见疾走则发、动则尤甚。气虚不能推动营血,而见神疲懒言、倦怠无力、面白。气虚固摄无力而见汗出。舌脉均为气虚之证。辨证为心气不足。故本题选A。

109.(A2型题)136患者,男,70岁。既往有高血压和糖尿病病史。经常感体乏少力,气短懒言,今洗衣服时突然心前区疼痛,伴有心悸汗出,含服硝酸甘油2分钟疼痛缓解。舌淡暗有齿痕,脉沉细。心电图示V<sub>3</sub>~V<sub>6</sub>导联T波倒置。心肌酶谱正常。应首先考虑的诊断是

- A.冠心病心绞痛气虚血瘀证
- B.冠心病心绞痛痰浊内阻证
- C.冠心病心肌梗死气滞血瘀证
- D.冠心病心肌梗死寒凝心脉证
- E.冠心病心肌梗死心肾阳虚证

答案:A

解析:本患者因劳累使心肌张力增加、心肌收缩力增加、心率增快,致心肌耗氧量增加,心肌对血液的需求增加,冠状动脉血流量进一步减少,引起心绞痛。心绞痛疼痛可波及大部分心前区,持续时间为1~5分钟,含服硝酸甘油疼痛可缓解。由于患者平时感体乏少力,气短懒言,辨证为气虚型;舌淡暗有齿痕为血瘀之象。故可辨证为气虚血瘀证。故本题选A。

110.(A2型题)138患者,男,60岁。3年前患急性广泛性前壁心肌梗死,现又见持续剧烈胸痛,甚则心痛彻背,背痛彻心,形寒肢冷,神疲气怯,伴心悸气促,手足青紫厥冷,舌紫暗苔滑润,脉沉细。其治法是

- A.益气养阴,化瘀通络
- B.益气温阳,开痹散寒
- C.温阳泻肺,活血利水
- D.益气温阳,清热祛痰
- E.滋阴逐饮,化瘀通络

答案:B

解析:患者有急性心肌梗死病史,且以剧烈胸痛为主证,中医诊断为真心痛。阳虚之体,胸阳不振,阴寒之邪乘虚侵袭,胸阳被遏,导致心脉闭阻而见胸痛剧烈。阳气不能转行于背,故见心痛彻背、背痛彻心。阳虚故见形寒肢冷、神疲气怯。胸阳

被遏而见心悸气促。寒主收引见手足青紫厥冷，舌脉亦为阳虚寒凝之证。辨证为心阳气虚、阴寒凝滞。治以益气温阳、散寒开痹。故本题选B。

111.(A2型题)140患者，女，25岁。风心病二尖瓣狭窄。近来感冒后病情加重，心悸，胸闷，气短，心率110次/分。此外，还可能出现的症状是

- A.呼吸困难，咳嗽，咯血
- B.低热，气急，心尖搏动向左下移动
- C.胸痛，晕厥，水冲脉
- D.枪击音，毛细血管搏动
- E.收缩压高，脉压增大

答案:A

解析:风湿性二尖瓣狭窄常表现为在体力劳动、呼吸道感染、情绪激动或心房颤动时出现端坐呼吸，阵发性夜间呼吸困难和肺水肿。咳嗽、咯血，出血的数量多少不等。查体可见二尖瓣面容，心前区可隆起，心浊音界可能向左扩大。听诊检查心尖区可听到二尖瓣狭窄引致的舒张中晚期隆隆样杂音及开瓣音。C、D、E为主动脉关闭不全的典型表现。故本题选A。

112.(A2型题)142患者，男，50岁。患萎缩性胃炎15年，并发巨幼红细胞性贫血。其贫血发生的机理，是因为缺乏

- A.铁
- B.盐酸
- C.胆盐
- D.维生素D
- E.内因子

答案:E

解析:慢性萎缩性胃炎因胃黏膜腺体萎缩减少，可以使胃酸和内因子的分泌减少，首先胃酸缺乏，铁吸收减少就会导致贫血，其次因维生素B<sub>12</sub>的吸收必须有一种称为内因子的物质参与才能完成，内因子由胃黏膜产生，如果内因子缺乏，维生素B<sub>12</sub>的吸收障碍，也会导致贫血。而巨幼红细胞性贫血主要因缺乏维生素B<sub>12</sub>或叶酸所致，所以说慢性萎缩性胃炎引起巨幼红细胞贫血主要是因为内因子的缺乏。故本题选E。

113.(A2型题)145患者，女，24岁。反复饥饿痛、夜间痛1年，再发1周伴呕吐，呕吐物为大量酸臭宿食。查体:心率80次/分，上腹部有振水音。应首先考虑的诊断是

- A.胃窦癌
- B.急性肠梗阻
- C.消化性溃疡合并幽门梗阻
- D.急性胆囊炎
- E.急性胰腺炎

答案:C

解析:患者胃痛特点是饥饿痛，考虑是溃疡。幽门梗阻临床表现主要有:上腹疼痛及饱胀感，多在进食后发生，入晚尤甚，暖气带有臭味。常于餐后上腹疼痛加重，随着胃潴留的出现，变为上腹弥漫性胀痛或饱胀不适。呕吐为幽门梗阻最突出的症状，呕吐多发生在下午和晚间，梗阻程度愈重，呕吐次数愈多。呕吐物含有宿

食。患者于呕吐后症状减轻或完全消失，故喜自行诱发呕吐。本患者症状属于此病，诊断为幽门梗阻。故本题选C。

114.(A2型题)150患者，男，50岁。肝硬化腹水。症见：腹膨大，按之坚满，脘闷腹胀纳呆，大便溏泄，小便不利，舌苔白腻，脉弦缓。其治法是

- A.疏肝理气，利湿散满
- B.运脾利湿，化气行水
- C.活血化瘀，利水消肿
- D.调脾行气，清热利湿
- E.温补肾阳，通阳利水

答案:B

解析：脾虚，湿浊中阻则腹胀按之坚满。湿邪伤脾，脾运不健而见脘闷腹胀纳呆。脾运化失职，清气不升，浊气不降，清浊不分，而见小便不利、大便溏泄。舌脉均为湿阻之证。辨证为水湿内停证，治以运脾利湿，化气行水。故本题选B。

115.(A2型题)152患者，男，52岁。间歇发作右上腹钝痛2个月。实验室检查：甲胎球蛋白310ng/ml。为明确诊断，应首先考虑的检查是

- A.肝功能
- B.癌胚抗原
- C.腹腔镜
- D.B型超声波
- E.腹部X线

答案:D

解析：参见58题。故本题选D。

116.(A2型题)155患者，男，29岁，浮肿少尿，纳呆泛恶4年。面色晦暗，舌暗红有瘀点，苔薄白，脉弦细。实验室检查：尿蛋白(++++)。治疗应首选

- A.猪苓汤
- B.桂枝茯苓丸
- C.当归芍药散合泽兰汤
- D.五苓散
- E.当归芍药散

答案:C

解析：水湿内停，见浮肿少尿，湿致脾土受困，运化障碍，而见纳呆泛恶。日久阻遏气机，气滞血瘀，而见面色晦暗，舌脉均为瘀血证的表现。辨证为血瘀水阻。故本题选C。

117.(A2型题)158患者，女，26岁。产后第3天出现寒战，高热，腰痛，下腹痛，排尿痛。检查：肾区叩击痛，耻骨上压痛，尿白细胞30个/高倍视野，尿蛋白(+)，血白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞86%。下列哪项检查对确诊最有帮助

- A.尿细胞计数
- B.尿细菌培养
- C.静脉肾盂造影
- D.膀胱镜检查

E.肾脏B超

答案:B

解析:妊娠后易发生尿路感染,根据患者的临床表现及尿细胞、尿蛋白阳性及血常规等均提示有感染,故考虑尿路感染。凡有感染症状、腰部不适、尿液改变,若再有真性细菌尿者,就可诊断尿路感染。真性细菌尿的诊断主要依靠尿细菌学检查。故本题选B。

118.(A2型题)162患者,男,72岁。慢性淋巴细胞白血病1年余,经化疗后病情有缓解。现症见气短懒言、乏力、低热、手足心热,腰膝酸软,皮肤瘀点、瘀斑,舌淡,脉沉细。治疗应首选

A.桃红四物汤

B.四君子汤合沙参麦冬汤

C.加味瓜蒌散

D.归脾汤

E.银翘散

答案:B

解析:气虚而见气短懒言、乏力。肾阴虚而见低热、手足心热、腰膝酸软。阴虚虚热内生,血行较缓,而成瘀滞,溢于皮下而见皮肤瘀点瘀斑。舌脉均为气虚之象,故辨证为气阴两虚证,方用四君子汤合沙参麦冬汤。A治疗血瘀兼血虚证。C治疗气血不足、肝气郁结、经脉瘀阻证。D治疗心脾两虚证。E治疗风热犯表证。故本题选B。

119.(A2型题)164患者,男,15岁。反复鼻出血,广泛皮肤紫癜1周。检查:肝、脾无肿大,血红蛋白115g/L,白细胞 $90 \times 10^9/L$ ,血小板 $10 \times 10^9/L$ ,骨髓幼稚型巨核细胞比例增高。其诊断是

A.特发性血小板减少性紫癜

B.急性白血病

C.慢性白血病

D.再生障碍性贫血

E.缺铁性贫血

答案:A

解析:患者以出血为主要表现,伴有血小板严重下降及骨髓幼稚型巨核细胞比例增高,可推断为特发性血小板减少性紫癜。B多以贫血、发热、出血、肝脾肿大等为主要表现,骨髓象提示有核细胞增生明显或轻度活跃。C以乏力、低热、多汗、消瘦为主要表现,骨髓象示各系细胞极度增生,其中以粒系为主。D以贫血、发热、出血为主要表现,网织红细胞计数极低。E主要表现为贫血,铁代谢检查、储备铁检查等有明显下降。故本题选A。

120.(A2型题)167患者,女,40岁。患有特发性血小板减少性紫癜。下肢皮肤紫斑,月经色紫暗有血块,伴腹痛,头晕目眩,面色黧黑,舌紫暗,脉细涩。治疗应首先考虑的方剂是

A.归脾汤

B.桃红四物汤

C.茜根散



D.犀角地黄汤

E.保元汤

答案:B

解析:根据患者临床症状,可辨证为瘀血内阻证,治宜活血化瘀止血,方用桃红四物汤。余参见169题。故本题选B。

121.(A2型题)169患者,女,26岁。心悸,多汗,多食,失眠2年。检查:甲状腺II度肿大,血管杂音(-),尿糖(+),血糖正常。对确诊最有意义的检查是

A.T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>测定

B.血脂

C.基础代谢率

D.空腹血糖

E.甲状腺B型超声波

答案:A

解析:诊断甲状腺功能亢进症主要有几方面:有甲状腺激素分泌过多证候群、弥漫性甲状腺肿和眼征等表现;血清FT<sub>4</sub>、FT<sub>3</sub>升高,TSH下降,TRAb阳性,这是明确甲亢诊断,尤其是临床表现不典型以及淡漠型甲亢的重要依据。故本题选A。

122.(A2型题)171患者,女,45岁。患糖尿病8年,面色晦暗,消瘦乏力,胸中闷痛,肢体麻木、刺痛,夜间加重,唇紫,舌暗有瘀斑,苔薄白,脉弦涩。治疗应首选

A.生脉散

B.消渴方

C.桃核承气汤

D.黄连温胆汤

E.桃红四物汤

答案:E

解析:该患者症状以瘀为特点。瘀血内积,气血运行受阻,不通则痛,而见胸中闷痛,肢体麻木、刺痛。夜间阳气不足,推动血行无力,故见夜间加重。血行瘀滞,而见面色晦暗。舌脉亦为血瘀之象。故辨证为瘀阻脉络,治以活血化瘀,方用桃红四物汤。A治疗气阴两虚证。B治疗阴虚燥热证。C治疗瘀热互结证。D治疗痰热证。故本题选E。

123.(A2型题)175患者,45岁。患类风湿性关节炎20年,反复关节肿痛,渐涩硬变形,屈伸不利,疼痛固定,痛如锥刺,昼轻夜重,口干不欲饮,舌紫暗苔白腻,脉细。治疗应首选

A.蠲痹汤

B.大秦苳汤

C.桃红饮

D.三痹汤

E.独活寄生汤

答案:C

解析:患者痹病日久耗气伤血,损阴伤津致血停为瘀,湿凝为痰,阻闭经络,不通则痛而出现关节肿痛、涩硬变形、屈伸不利、疼痛固定、痛如锥刺。夜间阳气不足

，阴气更无力推动血行，血阻更甚而见昼轻夜重。湿邪内聚而见口干不欲饮。舌脉亦为瘀、湿之象，辨证为痰瘀痹阻证，治以化痰行瘀，蠲痹通络，方用桃红饮加味。故本题选C。

124.(A2型题)177患者，男，60岁。劳动中突发左侧头痛，伴呕吐，面赤，舌强语謇，舌红苔黄，脉弦数。查体：血压195/105mmHg，右侧上、下肢瘫痪，右下肢病理反射阳性。应首先考虑的是

- A.痫证
- B.中风
- C.痿证
- D.厥证
- E.痹证

答案：B

解析：中风是以突然昏厥，不省人事，伴有口眼歪斜，语言不利，半身不遂或仅有半身不遂为主要表现的疾病。其特点是发病急骤，变化迅速。根据患者临床症状，不难诊断为中风。A、D多醒后不留有后遗症。C只是肢体萎废无力。E只表现为活动不利，无神志等神经系统改变。故本题选B。

125.(A2型题)179患者，女，69岁。看电视时突然倒地，呼之不应。查体：深昏迷，左侧瞳孔大于右侧瞳孔，血压170/90mmHg。应首先考虑的是

- A.高血压
- B.脑血栓形成
- C.脑出血
- D.脑栓塞
- E.蛛网膜下腔出血

答案：B

解析：患者发病急，有神志昏迷，血压高，两侧瞳孔大小不等提示出现脑出血、脑血栓、脑肿瘤等，由此推断为脑血栓形成。A一般不引起神志及瞳孔的改变。C多在情绪激动或活动时发生。D无相关病史栓子没有来源。E多发生在年轻人，且有剧烈头痛。故本题选B。

126.(A2型题)181患者，女，68岁。既往有高血压病史。今晨起床时发现右侧偏瘫，口眼歪斜，言语不利，头晕，手足麻木，肌肤不仁，舌暗，舌苔薄白，脉浮数。查体：血压170/80mmHg。头颅CT检查未见异常。应首先考虑的诊断是

- A.高血压病痰热腑实，风痰上扰证
- B.高血压病阴虚风动证
- C.高血压病脑出血痰热腑实，风痰上扰证
- D.高血压病脑梗塞风痰瘀血，痹阻脉络证
- E.高血压病脑梗塞肝阳暴亢，风火上扰证

答案：D

解析：本患者未出现头痛症状，因此排除脑出血疾患；而右侧偏瘫，口眼歪斜，言语不利，头晕，手足麻木，肌肤不仁为中风(脑梗塞)的表现。由于患者未出现眩晕的症状，故不属于风痰上扰证；且未出现热证，故不属于风火上扰证。故本题选D。

127.(B型题)187普萘洛尔(心得安)禁用于治疗

- A.心源性哮喘
- B.支气管哮喘
- C.慢性支气管炎
- D.原发性支气管癌
- E.肺脓肿

答案:B

解析:吗啡禁用于慢性阻塞性肺疾患、支气管哮喘、肺源性心脏病;急性左心衰竭晚期并出现呼吸衰竭时忌用。心得安禁用于支气管哮喘、心源性休克、心传导阻滞(II至III度房室传导阻滞)、重度心力衰竭、窦性心动过缓。故186题选B, 187题选B。

128.(B型题)190治疗急性肺水肿,利尿剂应首选

- A.氢氯噻嗪(双氢克尿噻)
- B.呋塞米(速尿)
- C.巯甲丙脯酸(开搏通)
- D.甘露醇
- E.氨苯喋啶

答案:B

解析:急性肺水肿发作时,应进行快速利尿,因此选用速尿。充血性心力衰竭时禁用甘露醇,会加重肺淤血或肺水肿。A用于水肿和高血压病人。C用于高血压及心力衰竭病人。E用于治疗心力衰竭、肝硬化和慢性肾炎等引起的顽固性水肿或腹水。故190题选B, 191题选D。

129.(B型题)193心房颤动的心房率是

- A.80次/分
- B.100~150次/分
- C.150~350次/分
- D.250~300次/分
- E.350~600次/分

答案:E

解析:典型房扑的心房率通常是150~350次/分;而正常心率为60~100次/分;心房颤动的心房率是350~600次/分;房速的心房率为150~200次/分。故192题选D, 193题选E。

130.(B型题)196心绞痛遇劳则发,神疲乏力,气短懒言,心悸自汗,舌淡暗,苔薄白,脉结代。证属

- A.阴寒凝滞
- B.心血瘀阻
- C.气虚血瘀
- D.痰浊内阻
- E.气阴两虚

答案:C

解析:心绞痛遇劳则发,神疲乏力,气短懒言,心悸自汗,舌淡为气虚证;舌暗,脉结代属于血瘀证,辨为气虚血瘀证,治以补气活血。痰浊盘踞,胸阳失展,故胸闷痛如窒;脾主四肢,痰浊困脾,脾气不运,故肢体沉重;舌苔浊腻,脉滑为痰浊内阻之象。治宜通阳泄浊,豁痰开窍,方用瓜蒌薤白白酒汤。故196题选C,197题选D

131.(B型题)199治疗真心痛之气阴亏损、心络瘀阻型,应首选

- A.生脉散合血府逐瘀汤
- B.柴胡疏肝散
- C.参附龙牡汤合桃红饮
- D.当归四逆汤
- E.参附汤合枳实薤白桂枝汤

答案:A

解析:真心痛之阳气虚衰、寒凝心络型,应治以温补肾阳、散寒通络,方用参附汤合枳实薤白桂枝汤。气阴亏损、心络瘀阻型应治以益气养阴、活血通络,方用生脉散合血府逐瘀汤。B多用于肝郁气滞证。C多用于虚阳浮越之痹证。D多用于血虚寒厥证。故198题选E,199题选A。

132.(B型题)201治疗风心病心肾阳虚证,应首选

- A.保元汤
- B.天王补心丹
- C.真武汤
- D.苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- E.五味子汤合桃仁红花煎

答案:C

解析:风心病水气凌心射肺证,应治以温阳化气,泻肺利水,方用苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减。心肾阳虚证,治以温补心肾,方用真武汤。A多用于气虚证。B多用于心肾阴虚证。E多用于肺气不足证。故200题选C,201题选D。

133.(B型题)204治疗消化性溃疡肝胃不和证,应首选

- A.柴胡疏肝散合五磨饮子
- B.黄芪建中汤
- C.一贯煎合芍药甘草汤
- D.化肝煎合左金丸
- E.活络效灵丹合丹参饮

答案:A

解析:治疗消化性溃疡肝胃不和证,宜疏肝和胃,方用柴胡疏肝散合五磨饮子;治疗消化性溃疡脾胃虚寒证,宜温补脾胃,方用黄芪建中汤。C治疗胃阴亏虚证。D治疗肝胃郁热证。E治疗瘀阻胃络证。故204题选A,205题选B。

134.(B型题)206与雌激素增加有关的肝硬化,可见

- A.贫血
- B.出血倾向
- C.腹水

D.肝昏迷

E.蜘蛛痣

答案:E

解析:肝硬化时,肝脏对雌激素的灭活能力下降,故男性可见性功能减退,男性乳房发育,女性可发生闭经、不孕,皮肤可见蜘蛛痣、肝掌等。肝硬化时,肝脏对氨的代谢能力明显减退,血氨浓度升高,氨能干扰脑细胞的代谢,而易发展为肝性脑病,表现为肝昏迷。A多是出血后引起的。B多与肝脏合成凝血因子减少及脾功能亢进有关。C多由于门静脉高压引起。故206题选E, 207题选D。

135.(B型题)208急性胰腺炎肝郁气滞证,治疗应首选的方剂是

A.小柴胡汤

B.清胰汤合龙胆泻肝汤

C.大承气汤

D.桃仁承气汤

E.大柴胡汤

答案:A

解析:A用于急性胰腺炎肝郁气滞证。B用于急性胰腺炎肝胆湿热证。C用于急性胰腺炎肠胃热结证。D、E均不是急性胰腺炎的适用方。故208题选A, 209题选B。

136.(B型题)210慢性肾小球肾炎普通型的特点是

A.中度蛋白尿

B.贫血及高脂血症

C.中度以上舒张压升高

D.全身高度水肿,血脂增高

E.肾衰竭

答案:A

解析:慢性肾小球肾炎分为五型。其中普通型较为常见,病程迁延,病情相对稳定,多表现为轻度至中度的水肿、高血压和肾功能损害,尿蛋白(+~+++),离心尿红细胞>10个/高倍视野和管型尿等。而肾病型除具有普通型的表现外,主要表现为肾病综合征,24h尿蛋白定量>3.5g,血清白蛋白低于30g/L,水肿一般较重和伴有或不伴高脂血症。B是肾病综合征的特点。C是高血压型的特点。E是急性发作型的特点。故210题选A, 211题选D。

137.(B型题)213对确诊泌尿系感染最有意义的检查是

A.24小时尿蛋白定量

B.尿培养及菌落计数

C.肾功能检查

D.摄腹部平片

E.静脉肾盂造影

答案:B

解析:肾病综合征诊断要点为①大量蛋白尿>3+, 24h尿蛋白定量>3.5g;②血浆白蛋白<30g/L;③血脂升高;④浮肿可轻可重。以上①②为必具条件,因此对尿蛋白的定量是最有意义的。而诊断泌尿系感染,取清洁中段尿行细菌培养、菌落

计数及药物敏感度测定,革兰阴性杆菌菌落计数 $\geq 10$ 万/ml者有诊断意义。故212题选A, 213题选B。

138.(B型题)215水肿的治疗原则中,“开鬼门”是指

- A.逐水
- B.降浊
- C.利尿
- D.通下
- E.发汗

答案:E

解析:内经中提到水肿的治疗原则有洁净府、开鬼门及去菟陈莖。其中“洁净府”意指利尿,“开鬼门”意指发汗,“去菟陈莖”原意为去瘀阻,现意指攻下逐水。故214题选C, 215题选E。

139.(B型题)217再生障碍性贫血的关联脏腑是

- A.心、肝
- B.心、脾
- C.骨髓
- D.心、肝、脾、肾
- E.肺、心、脾、肾

答案:D

解析:再障属于中医“虚劳”、“髓劳”、“髓枯”范畴。病变部位在骨髓,与肾脏的关系密切。其病机主要为热入营血、脾虚失摄、脾肾阳虚和肝肾阴虚。故216题选C, 217题选D。

140.(B型题)220慢性粒细胞性白血病阴血亏虚证的治法是

- A.补气养血
- B.滋阴补血
- C.补肾助阳
- D.滋阴降火
- E.活血化瘀

答案:B

解析:慢性粒细胞阴血亏虚证治以滋阴补血,瘀血内阻证治以活血化瘀。A用于气血两虚证。C用于肾阳亏虚证。D用于阴虚火旺证。故220题选B, 221题选E。

141.(B型题)222抗血小板抗体增加,见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.慢性粒细胞白血病

答案:A

解析:抗血小板抗体增加常见于原发性血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、败血症、高 $\gamma$ 球蛋白血症、肝病、母婴血小板不合等。造血原料缺乏常见于缺铁性贫血。故222题选A, 223题选C。

142.(B型题)225正常白细胞减少,骨髓中异常原始细胞大量增殖并浸润各器官组织,见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.急性白血病

答案:E

解析:特发性血小板减少性紫癜血象表现为急性型发病时血小板计数可明显减少,常低于 $20 \times 10^9/L$ ;慢性血小板计数一般在 $50 \times 10^9/L$ 左右。骨髓象表现为急性型骨髓巨核细胞正常或增多,幼稚型巨核细胞比例增多,体积小,无血小板形成;慢性型骨髓巨核细胞增多,以颗粒型巨核细胞增多为主,体积正常,血小板形成减少。急性白血病血象表现为贫血一般呈正细胞正色素型,网织红细胞计数减少,也有轻度增高者。血小板计数大多降低,白细胞一般早期常偏低。骨髓象表现为有核细胞增生明显或轻度活跃,具有决定性诊断价值。故224题选A, 225题选E。

143.(B型题)227治疗糖尿病气阴两虚证,应首选

- A.消渴方合玉女煎
- B.生脉散合六味地黄丸
- C.金匱肾气丸
- D.桃红四物汤
- E.生脉散合参附汤

答案:B

解析:糖尿病阴虚热盛证治以清热生津止渴,方用消渴方合玉女煎。气阴两虚证治以补气滋阴,方用生脉散合六味地黄丸。C用于阴阳两虚证。D用于气滞血瘀证。E用于阴阳衰微证。故226题选A, 227题选B。

144.(B型题)229糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者,治疗应首选

- A.六味地黄丸
- B.杞菊地黄丸
- C.六味地黄丸合生脉散
- D.知柏地黄丸
- E.金匱肾气丸

答案:B

解析:糖尿病气阴两虚证治以益气养阴,方用六味地黄汤合生脉散。糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者,因其主要病机为肝肾精血不足,不能上承耳目所致,宜滋补肝肾、益精补血,方用杞菊地黄丸加减。故228题选C, 229题选B。

145.(B型题)231糖尿病阴阳两虚,治疗首选

- A.生脉散
- B.桃红四物汤
- C.金匱肾气丸
- D.消渴方
- E.归脾汤

答案:C

解析:此题暂无解析

146.(B型题)233脑血栓形成急性期的血液稀释疗法,应首选

- A.甘露醇
- B.低分子右旋糖酐
- C.川芎嗪
- D.阿司匹林
- E.肝素

答案:B

解析:脑CT显示基底节区低密度影及周围有水肿带,视神经乳头水肿提示脑梗死,并有颅内压增高的表现。故治以降低颅内压,选用甘露醇。而脑血栓形成急性期的血液稀释法,选用低分子右旋糖酐,可以扩充血容量,降低血液黏滞性,改善微循环。C有抗血小板聚集作用,可用于脑血栓形成,但不属于血液稀释疗法。D对血小板聚集有抑制作用,阻止血栓形成,临床常用于预防暂时性脑缺血发作。E有较强抗凝血作用,对无出血倾向者,可采用此法。故232题选A,233题选B。

147.(B型题)235患者起病急,头痛重,伴有呕吐,意识障碍,克匿格征阳性。应首先考虑的是

- A.短暂性脑缺血发作
- B.脑血栓
- C.脑栓塞
- D.脑出血
- E.蛛网膜下腔出血

答案:E

解析:患者有长期卧床史,突发意识障碍、偏瘫及偏身感觉障碍。长期卧床易使血液高凝,而形成栓子,故首先考虑脑栓塞。而患者起病急,以头痛为主要表现,伴有呕吐、脑膜刺激征,亦不难判断为蛛网膜下腔出血。故234题选C,235题选E。

148.(A1型题)1在下列外科致病因素中,毒蛇咬伤属于

- A.外感六淫
- B.外来伤害
- C.情志内伤
- D.房室损伤
- E.感受特殊之毒

答案:E

解析:特殊之毒包括虫毒、蛇毒、疯犬毒、药毒、食物、疫毒。故本题选E。A包括风、寒、湿、燥、火。B包括直接伤害人体的理化因素,如跌仆损伤、沸水、寒冷等。C包括喜、怒、忧、思等超过人体调节的情志活动。D是指房事过度所致的损伤。



149.(A1型题)4下列损伤按致伤因素分类, 错误的是

- A.机械性
- B.物理性
- C.化学性
- D.车祸性
- E.生物性

答案:D

解析:损伤按致伤因素分类可分为机械性、物理性、化学性、生物性四类。故本题选D。

150.(A1型题)8补托法的代表方剂是

- A.透脓散
- B.托里消毒散
- C.异功散
- D.四君子散
- E.右归丸

答案:B

解析:补托法分益气托毒法和温阳托毒法, 益气托毒法的代表方剂是托里消毒散。透脓散是内托法的代表方剂。异功散是调胃法的代表方剂。四君子散是补益法益气方的代表方剂。右归丸是补益法助阳方的代表方剂。故本题选B。