

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

中医助理医师精选300题

套卷二【151-300题】

金英杰医学教育

151.(A1型题)下列各项,不属于感冒常见病因的是

- A.风寒
- B.风热
- C.暑湿
- D.食滞
- E.时行病毒

答案:D

解析:感冒是感受风邪或时行病毒(也可兼夹寒、热、暑、湿、燥邪,但以风寒、风热居多),引起肺卫功能失调,出现鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身不适、脉浮等为主要临床表现的一种外感病证。食滞不是感冒常见病因,为内伤的原因之一。故本题选D。

152.(A1型题)感冒的主要病机是

- A.肺气失宣
- B.肺失肃降
- C.卫表失和
- D.营卫不和
- E.肺虚不固

答案:C

解析:感冒的病位在肺卫;基本病机为六淫入侵,卫表不和,肺气失宣。因病邪在外、在表,故尤其以卫表不和为主。故本题选C。

153.(A1型题)临床上具有发作性痰鸣气喘特点的疾患

- A.咳嗽
- B.哮病
- C.喘证
- D.肺痈
- E.痢证

答案:B

解析:咳嗽、喘证、肺痈可以有气喘的表现但不伴有痰鸣;痢证虽然也偶有异常的声音——

口中如作猪羊叫声,而非痰鸣。哮病具有发作性痰鸣、气喘这两个特点。故本题选B。

154.(A1型题)治疗哮病之肺脾气虚证宜选用

- A.金匱肾气丸合参蛤散
- B.参附汤
- C.生脉散合补肺汤
- D.生脉地黄汤合金水六君煎
- E.六君子汤

答案:E

解析:哮病缓解期肺脾气虚证用六君子汤,肺肾两虚证用生脉地黄汤合金水六君煎;虚喘肺气虚耗证用生脉散合补肺汤,肾虚不纳证用金匱肾气丸合参蛤散,正虚喘脱证用参附汤送服黑锡丹。故本题选E。

155.(A1型题)虚喘之肺虚证治宜选用

- A.生脉散合补肺汤

- B.生脉散
- C.补肺汤
- D.玉屏风散
- E.参附汤

答案:A

解析:虚喘之肺气虚证气阴两虚,治法益气养阴。生脉散益气阴,补肺汤补益肺气。故本题选A。

156.(A1型题)胸痹的病理变化主要表现为本虚标实,下列哪项不是标实所指

- A.气滞
- B.寒凝
- C.痰浊
- D.阳虚
- E.血瘀

答案:D

解析:A、B、C、E均是胸痹的标实病理变化,而气虚、阳虚、阴伤、气阴两虚和阴阳两虚是胸痹的本虚因素。故本题选D。

157.(A1型题)心痛的主要病机是

- A.气滞血瘀,风痰痹阻
- B.寒凝气滞,痰阻血瘀
- C.阴寒凝滞,胸阳不振
- D.寒凝血瘀,心脉痹阻
- E.阳气不足,湿聚生痰

答案:C

解析:心痛是以人体心、肝、脾、肾诸脏的盛衰为基础,以寒邪、饮食、情志内伤、肝肾亏虚为病因,由特定的诱因诱发,导致机体的胸阳痹阻、气机不畅、心脉挛急或滞塞而发。故本题选C。

158.(A1型题)下列各项,与癫狂发病无关的病因病机是

- A.阴阳失调
- B.情志抑郁
- C.痰气上扰
- D.气血凝滞
- E.外感风寒

答案:E

解析:癫狂的基本病机是阴阳失调,情志抑郁,痰气上扰,气血凝滞。外感风寒是与癫狂发病无关的病因病机。故本题选E。

159.(A1型题)胃脘隐痛,喜温喜按,得食痛减,神疲乏力,手足欠温,纳差便溏,舌淡苔白,脉迟缓者,治疗选用

- A.良附丸
- B.理中丸
- C.小建中汤
- D.黄芪建中汤
- E.大建中汤

答案:D

解析:隐痛、喜温喜按,此为虚寒之证。患者食后痛减,神疲乏力,手足欠温,纳差便溏,故可诊断为脾胃虚寒型胃痛,治以温中健脾,和胃止痛,方选黄芪建中汤加减。故本题选D。

160.(A1型题)治疗脾胃虚弱泄泻,应首选

- A.枳术丸
- B.香砂六君子汤
- C.参苓白术散
- D.附子理中汤
- E.补中益气汤

答案:C

解析:脾胃虚弱泄泻:大便时溏时泻,完谷不化,迁延反复。病机为脾胃虚弱,运化无权,清浊不分。食少,食后脘闷不适,稍进油腻之物,则便次明显增多。病机为脾失健运,胃不受纳。面色萎黄,神疲倦怠。病机为脾胃虚弱,气血生化不足。舌质淡,苔薄白,脉细弱。病机为脾胃虚弱之象。综上相应的治疗原则为健脾益气,化湿止泻,代表方剂为参苓白术散。故本题选C。

161.(A1型题)下列哪项不是痢疾与泄泻的鉴别

- A.有无里急后重
- B.有无因情志不舒诱发
- C.有无排便次数增多
- D.有无脓血便
- E.有无腹痛肠鸣

答案:C

解析:两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加,粪质稀溏,甚则如水样,或完谷不化为主证,大便不带脓血,也无里急后重,腹痛或无。而痢疾以腹痛,里急后重,便下赤白脓血为特征。故本题选C。

162.(A1型题)冷秘的首选方是

- A.麻子仁丸
- B.六磨汤
- C.温脾汤
- D.黄芪汤
- E.润肠丸

答案:C

解析:参见35题。故本题选C。

163.(A1型题)与胁痛发病关系最为密切的脏腑是

- A.心、肺
- B.脾、胃
- C.肝、胆
- D.肝、肾
- E.脾、肾

答案:C

解析:因肝居胁下,经脉布于两胁,胆附于肝,其脉亦循于胁,故胁痛之病,当主要责之于肝胆。故本题选C。

164.(A1型题)治疗风热头痛,应首选

- A.芎芷石膏汤
- B.天麻钩藤饮
- C.大补元煎
- D.龙胆泻肝汤
- E.半夏白术天麻汤

答案:A

解析:风热头痛治法为疏风清热。芎芷石膏汤有疏风清热之功。天麻钩藤饮平肝潜阳,治疗肝阳头痛,排除B。大补元煎养阴补肾,治疗肾虚头痛,排除C。龙胆泻肝汤泻肝胆实火,治疗肝胆实火上扰之头痛,排除D。半夏白术天麻汤化痰降逆,治疗痰浊头痛,排除E。故本题选A。

165.(A1型题)“无虚不能作眩”出自

- A.《素问》
- B.《灵枢》
- C.《丹溪心法》
- D.《景岳全书》
- E.《古今医统》

答案:D

解析:《景岳全书·眩运》指出:“眩运一证,虚者居其八九,而兼火兼痰者,不过十中一二耳。”强调“无虚不能作眩”。故本题选D。

166.(A1型题)治疗中风后遗症半身不遂,气虚血瘀证,治疗应选用

- A.天麻钩藤饮
- B.半夏白术天麻汤
- C.镇肝息风汤
- D.补阳还五汤
- E.局方至宝丹

答案:D

解析:中风后遗症半身不遂,气虚血瘀证,治则宜益气养血,化瘀通络,治疗应选用补阳还五汤。故本题选D。

167.(A1型题)治疗水肿脾阳虚衰证,应首选

- A.真武汤
- B.越婢加术汤
- C.五皮饮
- D.五苓散
- E.实脾饮

答案:E

解析:水肿脾阳虚衰证病机为中阳不振,健运失司,气不化水。E有振奋脾阳,温运水湿的作用,其他选项的方药应用病位、病机都不甚合拍。故本题选E。

168.(A1型题)治疗膏淋实证,应首选

- A.八正散
- B.沉香散
- C.小蓟饮子
- D.程氏萆薢分清饮
- E.无比山药丸

答案:D

解析:膏淋治以清热利湿、分清泄浊,方用程氏萆薢分清饮。八正散治疗热淋,沉香散治疗气淋,小蓟饮子治疗血淋,无比山药丸治疗劳淋。故本题选D。

169.(A1型题)下列哪一项不属于内伤发热的诊断要点

- A.起病缓慢,病程长
- B.多为低热
- C.多为高热
- D.自觉发热,体温并不高
- E.有反复发热史

答案:C

解析:内伤发热是指以内伤为病因,脏腑功能失调,气、血、阴、阳失衡为基本病机,以发热为主要临床表现的病证。一般起病较缓,病程较长,热势轻重不一,但以低热为多,或自觉发热而体温并不升高。故本题选C。

170.(A1型题)痹证日久,邪痹心脉,瘀阻不通,心血运行不畅,多导致

- A.痉证
- B.厥证
- C.心悸
- D.痫证
- E.以上均非

答案:C

解析:痹证日久,复感外邪,内舍于心,邪痹心脉,瘀阻不通,心血运行不畅,心失所养而悸。故本题选C。

171.(A2型题)患者,男,35岁。胃脘灼热疼痛,痛势急迫,易怒,口苦,泛吐酸水,舌红苔薄黄,脉弦数。其治法是

- A.疏肝理气止痛
- B.清肝泄热化湿
- C.疏肝泄热和胃
- D.疏肝理气和胃
- E.理气和胃止痛

答案:C

解析:胃脘灼热疼痛,为胃热灼伤血络;易怒,口苦,泛吐酸水,舌红苔薄黄,脉弦数,均为肝热之征。故辨证为肝胃郁热,治以疏肝泄热和胃。故本题选C。

172.(A2型题)患者腹部刺痛较剧,痛处不移,触之痛甚,舌质紫暗,脉弦涩。其治法是

- A.理气和胃

- B.理气活血
- C.活血化瘀
- D.化瘀散结
- E.化痰祛瘀

答案:C

解析:刺痛为血瘀特点,患者腹部刺痛较剧,痛处不移,触之痛甚,舌质紫暗,脉弦涩,为瘀血表现。治以活血化瘀。故本题选C。

173.(A2型题)患者大便秘结不通,面色无华,头晕目眩,心悸,唇、舌淡白,脉细涩。其治法是

- A.清热润肠
- B.顺气行滞
- C.养血润肠
- D.益气润肠
- E.温阳通便

答案:C

解析:面色无华,头晕目眩,心悸,唇、舌淡白,脉细涩为阴血不足之表现。血虚,不能下润大肠,故大便秘结不通。辨证属血虚,治以养血润肠。故本题选C。

174.(A2型题)患者久患胁痛,痛势隐隐,绵绵不休,口干咽燥,心烦少寐,头晕目眩,舌红少苔,脉弦细。其治法是

- A.养血通络
- B.养阴柔肝
- C.滋阴养血
- D.滋养肝肾
- E.养阴润燥

答案:B

解析:胁痛,痛势隐隐,绵绵不休,头晕目眩,为肝郁日久化热伤阴,久病体虚,精血亏损,不能濡养肝络之表现。口干咽燥,心烦少寐,舌红少苔,脉弦细为阴虚内热之象。辨证属肝络失养证,治以养阴柔肝。故本题选B。

175.(A2型题)患者发病急骤,黄疸迅速加深,色黄如金,高热烦渴,胁痛腹满,神昏谵语,舌质红绛,脉弦数。其证候是

- A.阳黄之热重于湿
- B.阳黄之湿重于热
- C.急黄
- D.阴黄
- E.胆腑郁热

答案:C

解析:湿热夹毒,郁而化火,热毒炽盛,故发病急骤,黄疸迅速加深,高热烦渴。热毒内盛,气机失调,故胁痛腹满。神昏谵语,为热毒内陷心营。辨证属急黄。故本题选C。

176.(A2型题)患者身目黄色鲜明如橘皮,发热口渴,心中懊,恶心欲吐,小便短少,色黄赤,大便秘结,舌苔黄腻,脉弦数。治疗应首选

- A.茵陈五苓散
- B.麻黄连翘赤小豆汤
- C.茵陈蒿汤

D.茵陈术附汤

E.大柴胡汤

答案:C

解析:湿热熏蒸,困遏脾胃,壅滞肝胆,胆汁泛溢,则身目黄色鲜明;湿阻中焦,升降失常,则恶心呕吐;小便短少,大便秘结,舌苔黄腻,脉弦数,为湿热内蕴,热重于湿热之征。故辨证属阳黄之热重于湿证,治以清热利湿,方用茵陈蒿汤。茵陈五苓散、茵陈术附汤以利湿化浊为主,排除A、D。麻黄连翘赤小豆汤治疗阳黄初起兼表证者,大柴胡汤解表攻里,非首选,排除B、E。故本题选C。

177.(A2型题)患者,女,54岁。近来时常齿衄,血色淡红,齿摇不坚,舌红少苔,脉细数,其治法是

A.益气摄血

B.滋阴润肺

C.清肝泻火

D.清胃泻火

E.滋阴降火

答案:E

解析:血色淡红,齿摇不坚,舌红少苔,脉细数,为肾阴虚,阴虚火动之象。治以滋阴降火。故本题选E。

178.(A2型题)患者,男,40岁。近3个月来,多食易饥,形体消瘦,体重减轻3公斤,大便干燥,舌苔黄,脉滑有力。其诊断是

A.消渴上消肺热津伤

B.消渴中消胃热炽盛

C.消渴下消肾阴亏虚

D.消渴下消阴阳两虚

E.便秘热秘

答案:B

解析:参见168题。故本题选B。

179.(A2型题)患者肢体痿软,麻木微肿,足胫热气上腾,身体困重,胸脘痞闷,溲短涩痛,舌苔黄腻,脉滑数。其证候是

A.肺热津伤

B.脾胃虚弱

C.肝肾亏损

D.湿热浸淫

E.阴损及阳

答案:D

解析:湿热浸渍肌肤,故见肢体微肿,身体困重。湿热不去,气血运行不畅,故见麻木。湿热浸淫经脉,气血阻滞,故肢体痿软。胸膈痞闷,乃湿阻气机之故。湿热下注,故溲短涩痛。舌苔黄腻,脉滑数,为湿热内蕴之征,故本题选D。

180.(A1型题)冻疮的命名方法是

A.以病因命名

B.以部位命名

C.以疾病特征命名

D.以形态命名

E.以范围大小命名

答案:A

解析:冻疮是由于寒冷引起的局限性炎症损害,是以病因命名的疾病。故本题选A。

181.(A1型题)肿势或软如绵,或硬如馒,形态各异,不红不热。其肿的性质是

- A.热肿
- B.寒肿
- C.风肿
- D.痰肿
- E.湿肿

答案:D

解析:A肿而色红,皮薄光泽,焮热疼痛,肿势急剧。B肿而不硬,皮色不泽,苍白或紫暗,皮肤清冷,常伴有酸痛,得暖则舒。C发病急骤,漫肿宣浮,或游走不定,不红微热,轻微疼痛。D肿势如棉,或硬如馒,大小不一,形态各异,不红不热,皮色不变。E肿而皮肉重垂胀急,深则按之如烂棉不起,浅则光亮如水疱,搔破流黄水,浸淫皮肤。故本题选D。

182.(A1型题)下列各项,不属确认成脓方法的是

- A.接触法
- B.推拿法
- C.穿刺法
- D.透光法
- E.点压法

答案:B

解析:确认成脓的方法有接触法、穿刺法、透光法、点压法。故本题选B。

183.(A1型题)下列各项,不属于疔疮走黄的原因的是

- A.麻痘余毒未清
- B.误食辛热之品
- C.早期失治
- D.挤压碰撞
- E.过早切开

答案:A

解析:生疔之后,早期失治,毒势未得控制,或挤压碰伤,过早切开,疔毒虽鸱张,每得以直入营血,或误食辛热及酒肉鱼腥等发物,或艾灸疮头,更增火毒,均可促使疔毒发散,入营入血,内攻脏腑而成。故本题选A。

184.(A1型题)下列各项,与瘰疬的病因病机无关的是

- A.心阳不足
- B.肝气郁结
- C.脾失健运
- D.肺阴不足
- E.肾阴亏虚

答案:A

解析:瘰疬的发生可因情志不畅,肝气郁结,进而影响脾的运化功能(主要指消化、吸收功能),使痰热内生,于颈项结成核块。或者病人原有肺肾阴虚,阴虚则火旺,热灼津液为痰,痰火互相凝结成核而生瘰疬。故本题选A。

185.(A1型题)下列各项,不属系统性红蝴蝶疮临床表现的是

- A.80%患者出现对称性皮损
- B.患处对日光不敏感,春夏减轻
- C.发生在指甲周围皮肤及甲下者,可有出血性紫红色斑片
- D.严重者,可有全身泛发性多形性红斑
- E.手部遇冷可出现雷诺现象

答案:B

解析:典型者在两颊和鼻部出现蝶形红斑,为不规则形,色鲜红或紫红,边界清楚或模糊,有时可见鳞屑。皮损发生在指甲周围皮肤及甲下者,常为出血性紫红色斑片,高热时红肿光亮,时隐时现。发生在唇者,则为下唇部红斑性唇炎的表现。皮损严重者,可有全身泛发性多形性红斑、紫红斑、水疱等,口腔、外阴黏膜有糜烂,头发可逐渐稀疏或脱落。手部遇冷时有雷诺现象,常为本病的早期症状。故本题选B。

186.(A1型题)顾步汤适用的脱疽证候是

- A.寒湿阻络
- B.血脉瘀阻
- C.湿热毒盛
- D.热毒伤阴
- E.气阴两虚

答案:D

解析:脱疽的分型论治为:①寒湿阻络-温阳散寒,活血通络-阳和汤加减;②血脉瘀阻-活血化瘀,通络止痛-桃红四物汤加减;③湿热毒盛-清热利湿,活血化瘀-四妙勇安汤加减;④热毒伤阴-清热解毒,养阴活血-顾步汤加减;⑤气阴两虚-益气养阴-黄芪鳖甲汤加减。故本题选D。

187.(A1型题)一期梅毒和三期梅毒分别又称为

- A.硬下疳、杨梅结毒
- B.硬下疳、杨梅疮
- C.杨梅疮、杨梅结毒
- D.杨梅结毒、杨梅疮
- E.杨梅结毒、硬下疳

答案:A

解析:一期梅毒主要表现为疳疮(硬下疳),发生于不洁性交后约2~4周;二期梅毒主要表现为杨梅疮,一般发生在感染后7~10周或硬下疳出现后6~8周;三期梅毒亦称晚期梅毒,主要表现为杨梅结毒。此期特点为病程长,易复发,除皮肤黏膜损害外,常侵犯多个脏器。故本题选A。

188.(A2型题)患者,女,32岁。左臀部出现硬结,红热不显,有触痛,步行不便,有患处肌肉注射史。应首先考虑的是

- A.无头疽
- B.有头疽
- C.臀痈

D.痈

E.肉瘤

答案:C

解析:发病前常有臀部糜烂损伤史,或臀部肌肉注射史。痈发于一侧臀部,肿硬疼痛,形大如盘,肿逾盈尺,范围较广,边缘不清,步履艰难。及至酿脓,焮肿疼痛,肿势渐聚。身伴寒热,四肢酸楚,尿赤便秘。脓成外溃,色黄稠厚,或疮口内有腐烂坏死组织,泄脓不畅。故本题选C。

189.(A2型题)患者,男,30岁。颈部肿块,溃后脓水清稀,夹有败絮样物质,经久不消。应首先考虑的是

A.发

B.瘰疬

C.颈痈

D.失荣

E.无头疽

答案:B

解析:看到夹有败絮样物质,首先应考虑瘰疬,此为其典型的临床表现。发以皮肤疏松的部位突然红肿蔓延成片,灼热疼痛,红肿以中心最为明显为典型特点。颈痈以初起脐部微肿,渐大如瓜,脓稠无臭则易愈,脓水臭秽则成漏为临床表现。失荣是以颈部肿块坚硬如石,推之不移,皮色不变,面容憔悴,形体消瘦,状如树木失去荣华为主要表现的肿瘤性疾病。无头疽发于四肢长骨,局部肿胀,附筋着骨,推之不移,疼痛彻骨,溃后脓水淋漓,不易收口。故本题选B。

190.(A2型题)颈部核块如黄豆大小,一个或数个,可同时出现或相继发生,皮色不变,质稍硬,表面光滑,不热不痛,推之能活动。治疗应首选

A.生肌散

B.内托生肌散加减

C.逍遥散合二陈汤加减

D.香贝养营汤合六味地黄汤加减

E.托里消毒散

答案:C

解析:瘰疬初期:颈部核块如黄豆大小,一个或数个,可同时出现或相继发生,皮色不变,质稍硬,表面光滑,不热不痛,推之能活动,可用逍遥散合二陈汤加减治疗。瘰疬中期:核块渐增大,与表皮粘连,有时数个核块互相融合成大的肿块,推之不能活动,疼痛;当进一步化脓时,则表面皮肤转成暗红色,微热,按之有轻微波动感,可用托里消毒散、内托生肌散加减治疗。瘰疬后期:已化脓的肿块经切开或自行破溃后,流出清稀脓水,夹有败絮状物质,疮口呈潜行性管腔(表面皮肤较薄,皮下有向周围延伸的空腔),疮口肉色灰白,四周皮肤紫黯,并可以形成窦道;如果脓水转稠,肉芽变成鲜红色,表示即将愈合,可用香贝养营汤合六味地黄汤加减治疗。故本题选C。

191.(A2型题)患者,男,45岁。左上臂内侧有一肿块,呈半球形,暗红色,质地柔软,状如海绵,压之可缩小。应首先考虑的是

A.气瘤

B.筋瘤

C.脂瘤

D.血瘤

E.肉瘤

答案:D

解析:血瘤可发生于身体任何部位,但以四肢、躯干、面颈部多见。常在出生后即发现,随着年龄增长而长大,长到某种程度后,可停止进展。瘤体外观呈暗红色或紫蓝色,亦可为正常皮色,小如豆粒,大如拳头,质地柔软,状如海绵,压之可缩小,肢体活动时胀大。故本题选D。

192.(A2型题)患者,男,33岁,患白疕,发病较久,皮疹多呈斑片状,颜色淡红,鳞屑减少,干燥皲裂,自觉瘙痒,伴口干,舌质淡红,苔少,脉沉细。其治法是

A.清热泻火,凉血解暑

B.清利湿热,解暑通络

C.活血化瘀,解毒通络

D.养血滋阴,润肤息风

E.清热凉血,解暑消斑

答案:D

解析:患者皮疹颜色淡红,舌质淡红,脉沉细,为血虚所致。鳞屑减少,干燥皲裂,自觉瘙痒等证,故可诊断为血虚风燥型白疕,治法以养血滋阴,润肤息风,方选当归饮子加减。故本题选D。

193.(B型题)治疗肛痈火毒炽盛证,应首选

A.透脓散

B.仙方活命饮

C.黄连解毒汤

D.青蒿鳖甲汤合三妙丸

E.萆薢渗湿汤

答案:A

解析:肛痈的分型论治:①湿热蕴结——清热解毒——

仙方活命饮、黄连解毒汤加减;②火毒炽盛——清热解毒透脓——

透脓散加减;③阴虚毒恋——养阴清热,祛湿解毒——

青蒿鳖甲汤合三妙丸加减。

194.(B型题)治疗肛痈阴虚毒恋证,应首选

A.透脓散

B.仙方活命饮

C.黄连解毒汤

D.青蒿鳖甲汤合三妙丸

E.萆薢渗湿汤

答案:D

解析:肛痈的分型论治:①湿热蕴结——清热解毒——

仙方活命饮、黄连解毒汤加减;②火毒炽盛——清热解毒透脓——

透脓散加减;③阴虚毒恋——养阴清热,祛湿解毒——

青蒿鳖甲汤合三妙丸加减。

195.(A1型题)下列除哪项外,均是胞宫的别称

A.胞室

B.子宫

- C.子处
- D.阴户
- E.女子胞

答案:D

解析:胞宫, 别名女子胞、子处、子宫、子脏、血室、胞室。阴户非胞宫的别称。故本题选D。

196.(A1型题)下列哪项不是月经的生理现象

- A.周期21~35天
- B.经期3~7天
- C.经量100~150ml
- D.经色暗红
- E.经质不稀不稠, 无血块, 无特殊气味

答案:C

解析:经量正常为50~80ml。故本题选C。

197.(A1型题)妊娠初期, 每月仍有少量月经而无损于胎儿者, 称为

- A.暗经
- B.居经
- C.垢胎
- D.胎漏
- E.暗产

答案:C

解析:妊娠初期, 每月仍有少量月经而无损于胎儿者, 称为垢胎。终身不行经而能受孕的, 称为“暗经”。三月一至的, 称为“居经”。妊娠期, 阴道少量出血, 时发时止, 或淋漓不断, 而无腰酸腹痛者, 称为“胎漏”。怀孕未足一月而流产者, 其时胚胎尚未成形, 人多不知有胎, 称为“暗产”。故本题选C。

198.(A1型题)下列有关预产期的计算正确的是

- A.以末次月经结束后的第一天起计算
- B.以末次月经的最后一天起计算
- C.以尿检阳性的第一天起计算
- D.以末次月经的第一天起计算
- E.月数加9(或减3)日数加14

答案:D

解析:预产期从末次月经的第一天算起, 月数加9(或减3)日数加7。故本题选D。

199.(A1型题)下列哪项不是月经先期肝郁血热证的主症

- A.经量或多或少
- B.色鲜红或紫红
- C.胸闷, 乳胀
- D.少腹胀痛
- E.精神抑郁

答案:E

解析:月经先期肝郁血热证表现为肝气郁结和血热两部分。肝郁疏泄失调, 血海失司, 故经量或多或少; 热灼于血, 故经色鲜红或紫红; 气滞肝经则胸闷, 乳胀; 少

腹胀痛;心烦易怒,口苦咽干,舌红,苔薄黄,脉弦数均为肝郁血热之象。其精神为易怒而非抑郁。故本题选E。

200.(A1型题)下列哪项不是月经先期气虚证的主证

- A.月经量多
- B.色淡质稀
- C.神疲肢软
- D.小腹疼痛拒按
- E.纳少便溏

答案:D

解析:月经先期气虚证以气虚为主证,气虚统血无权,月经量多。色淡质稀、神疲肢软、纳少便溏为气虚之表现。小腹疼痛拒按为实证之表现。故本题选D。

201.(A1型题)月经先期脾气虚证,治疗应首选

- A.补中益气汤
- B.固阴煎
- C.清经散
- D.两地汤
- E.丹栀逍遥散

答案:A

解析:月经先期主要病机为气虚和血热。脾气虚用补中益气汤或归脾汤;肾气虚用固阴煎或归肾丸。阳盛血热用清经散;阴虚血热用两地汤;肝郁血热用丹栀逍遥散。故本题选A。

202.(A1型题)温经汤(《妇人大全良方》)适用于月经后期的哪种证型

- A.实寒
- B.虚寒
- C.血瘀
- D.血虚
- E.气滞

答案:A

解析:实寒证方用温经汤(《妇人大全良方》),虚寒证方用温经汤《金匱要略》或艾附暖宫丸,血虚证方用大补元煎,气滞证方用乌药汤,肾虚证方用当归地黄饮。故本题选A。

203.(A1型题)经血非时暴下不止或淋漓不尽,最恰当的称谓是

- A.经崩
- B.经漏
- C.崩漏
- D.漏下
- E.崩中

答案:C

解析:妇女不在行经期间,阴道突然大量出血,或淋漓下血不断者,称为“崩漏”。前者称为“崩中”,后者称为“漏下”。阴道出血淋漓不断,或经期血来持续日久不止,名为“经漏”,经血忽然大下不止者,名为“经崩”。故本题选C。

204.(A1型题)下列除哪一脏腑外,其他脏腑都是中医“经行吐衄”的病位

- A.肝

- B.心
- C.胃
- D.肺
- E.肾

答案:C

解析:性格常抑郁,忿怒伤肝,肝郁化火,气火上逆,发为经行吐衄。素体肝肾阴虚,阴虚内热;或忧思不解,积念在心,心火偏亢,经期冲脉气盛,气火上逆,灼肺伤津,损伤肺络,发为经行吐衄。肝、肾、心、肺皆为病位所在。故本题选C。

205.(A1型题)妊娠恶阻的主要病机是

- A.胃气亏虚,和降失司
- B.冲脉之气上逆,胃失和降
- C.肝郁化热,气逆犯胃
- D.痰湿内蕴,胃失和降
- E.气血逆乱,冲气上逆

答案:B

解析:妊娠恶阻的主要病机是冲气上逆,胃失和降。故本题选B。

206.(A1型题)产后血瘀发热最佳选方

- A.解毒活血汤
- B.生化汤
- C.桃红四物汤
- D.少腹逐瘀汤
- E.失笑散

答案:B

解析:解毒活血汤治疗感染邪毒型。生化汤化瘀生新、温经止痛,治疗产后瘀血腹痛,恶露不行,小腹冷痛。桃红四物汤养血活血,主治妇女经期超前,血多有块,色紫稠黏,腹痛等。少腹逐瘀汤活血祛瘀,温经止痛,主治少腹瘀血积块。失笑散活血祛瘀,散结止痛,主治瘀血停滞。故本题选B。

207.(A1型题)治疗血瘀不孕症,应首选

- A.血府逐瘀汤
- B.膈下逐瘀汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.桃红四物汤
- E.开郁种玉汤

答案:C

解析:血瘀不孕症治以活血化瘀,温经通络,方用少腹逐瘀汤,主治少腹瘀血。血府逐瘀汤主治胸中血瘀,膈下逐瘀汤主治膈下瘀血,桃红四物汤主治血虚夹瘀,开郁种玉汤主治肝郁不孕症。故本题选C。

208.(A1型题)阴痒的病机是

- A.肾阴虚损,阴虚燥热
- B.肝经湿热,肝肾阴虚
- C.肝郁血虚,血虚生风
- D.会阴损伤,湿热虫蚀

E.痰湿瘀结，郁而化热

答案：B

解析：阴痒有内外因，常见病机为肝经湿热，肝肾阴虚。故本题选B。

209.(A1型题)治疗阴痒肝肾阴虚证，应首选

A.左归丸

B.归肾丸

C.保阴煎

D.固阴煎

E.知柏地黄汤

答案：E

解析：左归丸育阴涵阳，适用于真阳不足，精髓亏损之证；归肾丸滋阴养血，填精益髓，用于肾水不足，精亏血少证；保阴煎滋阴清热凉血，用于阴虚内热动血证；固阴煎滋补肝肾，用于肝肾两亏证；知柏地黄汤滋阴降火，用于阴虚热盛证。阴痒肝肾阴虚证应调补肝肾，滋阴降火，方选知柏地黄汤。故本题选E。

210.(A1型题)哪种情况可以放置宫内节育器

A.顺产3月后

B.剖宫产3月后

C.顺产1月后

D.剖宫产1月后

E.剖宫产半年后

答案：E

解析：放置宫内节育器的时间：月经干净后3~7天；人工流产术后无感染或无出血倾向者；自然流产转经后；足月产及孕中期引产后3个月或剖宫产术后半年。注意混淆选项A。关键点为顺产与足月产的概念。顺产是指一种分娩方式，从阴道分娩。足月产是指妊娠足月后分娩，与不足月、早产相对应。故本题选A。

211.(A2型题)患者，女，38岁，已婚。近半年来，月经20天一行，量多，色暗红时有血块，小腹及乳房作胀，舌略暗，苔薄，脉弦。应首先考虑的是

A.月经先期

B.月经过多

C.痛经

D.行经乳房胀痛

E.崩漏

答案：A

解析：月经周期提前7天以上，连续2个周期以上者称为“月经先期”。正常的月经周期为21~35天。此患者20天一行，且已持续半年，诊断为月经先期。故本题选A。

212.(A2型题)患者，女，34岁，已婚。月经50多天一行，量少，色暗，少腹胀闷，胸胁乳房作胀，舌苔薄白，脉弦。治疗应首选

A.逍遥散

B.丹栀逍遥散

C.乌药汤

D.香棱丸

E.小柴胡汤

答案：C

解析:气不宣达,血行受阻,冲任气血运行不畅,血海不能如期满溢,而致月经后期,量少,少腹胀闷,胸肋乳房作胀,舌苔薄白,脉弦。辨证属气滞,方用乌药汤,理气行滞。逍遥散调和肝脾。丹栀逍遥散疏肝清热。香棱丸行气活血。小柴胡汤和解少阳。故本题选C。

213.(A2型题)患者,女,27岁,未婚。经间期出血,色红,无血块,无腹痛,头晕腰酸,大便艰,溲黄,舌红,脉细弦数。治疗应首选

- A.六味地黄丸
- B.清肝止淋汤
- C.逐瘀止血汤
- D.两地汤
- E.清肝引经汤

答案:D

解析:肾阴不足,受阳气冲击,阴络易伤而血溢,出现经间期出血。色红,头晕腰酸,大便艰难,溲黄,舌红,脉细弦数,均为肾阴虚之表现,治以滋肾益阴,固冲止血,方选两地汤。六味地黄丸用于肝肾亏损证。清肝止淋汤用于血虚火旺证。逐瘀止血汤用于血崩证。清肝引经汤用于经行吐血。故本题选D。

214.(A2型题)患者,女,29岁,已婚。每于经前和经期少腹灼痛,拒按,痛连腰骶,经量多、色暗红,伴低热,带下量多、黄稠、臭秽,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

- A.血府逐瘀汤
- B.解毒活血汤
- C.膈下逐瘀汤
- D.清热固经汤
- E.清热调血汤

答案:E

解析:湿热内蕴,与血搏结,稽留于冲任胞宫,以致气血凝滞不畅,经行之际,气血下注冲任,胞脉气血更加壅滞,“不通则痛”,故出现少腹灼痛拒按,痛连腰骶,经量多,色暗红,带下量多、黄稠、臭秽,舌红苔黄腻,脉滑数。辨证属湿热蕴结证,治以清热除湿、化瘀止痛,方用清热调血汤。血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。解毒活血汤清热解毒止血。膈下逐瘀汤主治气滞血瘀。清热固经汤主治实热血热证。清热调血汤清热除湿、化瘀止痛。故本题选E。

215.(A2型题)患者,女,49岁,已婚。月经紊乱1年,烘热汗出,头晕耳鸣,失眠多梦,腰膝酸软,烦躁起急,舌红少苔,脉细数。治疗应首选

- A.二至丸
- B.左归饮
- C.知柏地黄汤
- D.甘麦大枣汤
- E.固阴煎

答案:B

解析:由患者49岁月经紊乱可知属绝经前后诸证。烘热汗出,头晕耳鸣,失眠多梦,腰膝酸软,烦躁起急,舌红少苔,脉细数,皆属于肾阴虚。辨证属肾阴虚证,治以滋肾益阴,育阴潜阳,方用左归饮。二至丸主治气血虚损。知柏地黄汤滋阴降火。甘麦大枣汤主治心气不足之脏躁。固阴煎补肾益气,养血调经。故本题选B。

216.(A2型题)患者,女,28岁,已婚。孕50天。腰酸腹痛,阴道少量出血,色淡暗,头晕耳鸣,小便清长,舌淡苔白,脉细缓滑。治疗应首选

- A.寿胎丸
- B.圣愈汤
- C.胎元饮
- D.举元煎
- E.保阴煎

答案:A

解析:此题暂无解析

217.(B型题)直接损伤冲任,导致妇科疾病的是

- A.气血失调,脏腑功能失常
- B.情志不畅,肝气郁结
- C.思虑过度,劳伤心脾
- D.阴虚肺燥,虚火内生
- E.经期产时,感染邪毒

答案:E

解析:经期产时,感染邪毒,搏结胞宫,直接损伤冲任,导致妇科疾病。气血失调,脏腑功能失常,冲任功能失常,间接损伤冲任,导致妇科疾病。

218.(B型题)治疗崩漏虚热证,应首选

- A.右归丸
- B.上下相资汤
- C.固本止崩汤
- D.清热固经汤
- E.左归丸

答案:B

解析:崩漏脾虚证用固本止崩汤或固冲汤,肾气虚证用加减苁蓉菟丝子丸,肾阳虚证用右归丸,肾阴虚证用左归丸合二至丸或滋阴固气汤,血虚热证用上下相资汤,血实热证用清热固经汤,血瘀证用逐瘀止血汤或将军斩关汤。

219.(B型题)治疗崩漏脾虚证,应首选

- A.右归丸
- B.上下相资汤
- C.固本止崩汤
- D.清热固经汤
- E.左归丸

答案:C

解析:崩漏脾虚证用固本止崩汤或固冲汤,肾气虚证用加减苁蓉菟丝子丸,肾阳虚证用右归丸,肾阴虚证用左归丸合二至丸或滋阴固气汤,血虚热证用上下相资汤,血实热证用清热固经汤,血瘀证用逐瘀止血汤或将军斩关汤。

220.(B型题)治疗产后发热血瘀证,应首选

- A.五味消毒饮
- B.生化汤
- C.补中益气汤

D.荆防四物汤

E.银翘散

答案:B

解析:产后发热血瘀证,治以活血祛瘀清热,方用生化汤;产后发热血虚证,治以养血益气退热,方用补中益气汤。

221.(B型题)治疗产后发热血虚证,应首选

A.五味消毒饮

B.生化汤

C.补中益气汤

D.荆防四物汤

E.银翘散

答案:C

解析:产后发热血瘀证,治以活血祛瘀清热,方用生化汤;产后发热血虚证,治以养血益气退热,方用补中益气汤。

222.(B型题)肾气虚,胎失所系,可发生

A.滑胎

B.不孕症

C.带下过少

D.经行浮肿

E.子肿

答案:A

解析:肾气虚,胎失所系,可发生滑胎。肾阳虚,命门火衰,不能暖宫,可发生不孕症。

223.(B型题)肾阳虚,命门火衰,不能暖宫,可发生

A.滑胎

B.不孕症

C.带下过少

D.经行浮肿

E.子肿

答案:B

解析:肾气虚,胎失所系,可发生滑胎。肾阳虚,命门火衰,不能暖宫,可发生不孕症。

224.(A1型题)小儿易发生好动、惊惕、抽风等症,原因主要是

A.心常有余

B.肝常有余

C.脾常不足

D.稚阳未充

E.肾常虚

答案:B

解析:小儿肝常有余,外感内伤均可使肝气亢盛,刚性之脏,易于动风,风阳上扰,伤及头面故见头面部肌肉不自主抽动,肝气不舒,肝风内动,欲畅其通达之性,故喉中有异声或口出秽语,肝阳上亢故抽动力而频繁,声音响亮,且性情急躁、好动。故本题选B。

225.(A1型题)小儿感冒夹痰的病机是

- A.肺脏娇嫩
- B.先天不足
- C.乳食积滞
- D.脾胃湿困
- E.肾气不足

答案:A

解析:小儿肺脏娇嫩,易受外邪,肺络失宣,气机不利,易凝聚津液,酿液为痰,以致痰阻气道,故可见咳嗽加剧,喉间有痰声,此为感冒夹痰。故本题选A。

226.(A1型题)疳证的基本病理改变为

- A.脾胃虚弱,运化失健
- B.脾胃虚弱,乳食停滞
- C.脾失运化,水湿内停
- D.脾胃不和,生化乏源
- E.脾胃受损,津液消亡

答案:E

解析:疳证指由于喂养不当或多种疾病的影响,使脾胃受损,气液耗伤而导致的以全身虚弱羸瘦,面黄发枯,精神萎靡或烦躁,饮食异常为特征的慢性病证。故本题选E。

227.(A1型题)疔腮毒窜辜腹证的治法是

- A.疏风清热,散结消肿
- B.清肝泻火,活血止痛
- C.清热解毒,软坚散结
- D.清热解毒,息风开窍
- E.清肝泻火,软坚散结

答案:B

解析:疔腮常证一为邪犯少阳证,治以疏风清热,散结消肿;一为热毒壅盛证,治以清热解毒,软坚散结。变证一为邪陷心肝证,治以清热解毒,息风开窍;一为毒窜辜腹证,治以清肝泻火,活血止痛。故本题选B。

228.(A1型题)夏季热上盛下虚证的病机是

- A.脾胃亏虚
- B.脾阳不振
- C.胃热炽盛
- D.心火内盛
- E.脾肾阳虚

答案:E

解析:小儿素体脾肾虚弱,外为暑气熏蒸,内则真阳不足,易出现上盛下虚之证。故本题选E。

229.(A2型题)患儿,2岁,纳差2个月,腹泻1周。平素食欲不振,挑食偏食,近日大便日行3~4次,食后作泻,面色萎黄,舌淡苔白,指纹淡红。治疗应首选

- A.熏洗法
- B.擦拭法
- C.割治疗法

D.推拿疗法

E.拔罐疗法

答案:D

解析:A、B多用于外科病证。C常用以治疗疝证和哮喘等病证。E常用于肺炎咳嗽、哮喘、腹痛、遗尿等病证。故本题选D。

230.(A2型题)患儿,10岁。昨天受凉后,见喷嚏、鼻塞、流清涕,今晨起喘咳,咯痰稠黄,口渴欲饮,大便干燥。查体:鼻煽,口周发绀,咽红,双肺满布哮鸣音,舌质红,苔薄白,脉滑数。其证候是

A.寒性哮喘

B.热性哮喘

C.外寒内热

D.肺实肾虚

E.肺肾阴虚

答案:C

解析:患儿咳痰稠黄,口渴欲饮,大便干燥是有内热之证,又因受凉而发病,是一外寒内热证,外寒内热临床表现为喘促痰鸣,鼻塞喷嚏,流清涕,或恶寒发热,咯痰黏稠色黄,口渴,大便干结,尿黄,舌红,苔白,脉滑数或浮紧。治以解表清里,定喘止咳。故本题选C。

231.(A2型题)患儿,5岁。臀部及下肢紫癜1天,呈对称性,色鲜红,瘙痒,发热,舌红,苔薄黄,脉浮数。治疗应首选

A.犀角地黄汤

B.连翘败毒散

C.归脾汤

D.化斑汤

E.大补阴丸

答案:B

解析:A主治紫癜之血热妄行证。B主治紫癜之风热伤络,从胁下至腰下肿,发赤大小便不通,治痈疽、疔疮、乳痈,及一切无名肿毒,初期憎寒壮热,头痛拘急者。C主治紫癜之气不摄血。D主治气血两燔之发斑。见发热,或身热夜甚,外透斑疹,色赤,口渴或不渴,脉数等。E主治紫癜之阴虚火旺。患儿紫癜色鲜红、瘙痒为风热之邪伤及络脉,发热、舌红、脉浮数都符合风热伤络证,为紫癜初起,病未入血分,无脾虚、阴虚表现,发热不属于气血两燔。故当疏风散邪,凉血止血。故本题选B。

232.(B型题)当小儿出现脾胃病时,应特别注意询问的是

A.胎产史

B.喂养史

C.生长发育史

D.预防接种史

E.家族史

答案:B

解析:乳食摄入量偏少可导致气血生化不足,乳食摄入量过多又可导致食伤脾胃,因此小儿出现脾胃病时,应注意喂养史。传染病鉴别时,应询问预防接种史,包括卡介苗、麻疹减毒活疫苗、脊髓灰质炎减毒活疫苗、白喉类毒素疫苗的预防接种情况,记录接种年龄和反应等。

233.(B型题)需要与传染病鉴别时,应特别注意询问的是

- A.胎产史
- B.喂养史
- C.生长发育史
- D.预防接种史
- E.家族史

答案:D

解析:乳食摄入量偏少可导致气血生化不足,乳食摄入量过多又可导致食伤脾胃,因此小儿出现脾胃病时,应注意喂养史。传染病鉴别时,应询问预防接种史,包括卡介苗、麻疹减毒活疫苗、脊髓灰质炎减毒活疫苗、白喉类毒素疫苗的预防接种情况,记录接种年龄和反应等。

234.(B型题)汗证肺卫不固的主症是

- A.自汗为主,头部、肩背部明显
- B.自汗为主,汗出遍身而不温
- C.盗汗为主,手足心热
- D.自汗或盗汗,头部、四肢为多
- E.盗汗为主,遍身出汗

答案:A

解析:常见的汗证有四种:①肺卫不固:以自汗为主,或伴盗汗,以头部、肩背部汗出明显,动则尤甚,神疲乏力,面色少华,平时易患感冒。舌淡,苔薄,脉细弱。②营卫失调:以自汗为主,或伴盗汗,汗出遍身而不温,微寒怕风,不发热,或伴有低热,精神疲倦,胃纳不振,舌质淡红,苔薄白,脉缓。③气阴亏虚:以盗汗为主,常伴自汗,手足心热。

235.(B型题)汗证营卫失调的主症是

- A.自汗为主,头部、肩背部明显
- B.自汗为主,汗出遍身而不温
- C.盗汗为主,手足心热
- D.自汗或盗汗,头部、四肢为多
- E.盗汗为主,遍身出汗

答案:B

解析:常见的汗证有四种:①肺卫不固:以自汗为主,或伴盗汗,以头部、肩背部汗出明显,动则尤甚,神疲乏力,面色少华,平时易患感冒。舌淡,苔薄,脉细弱。②营卫失调:以自汗为主,或伴盗汗,汗出遍身而不温,微寒怕风,不发热,或伴有低热,精神疲倦,胃纳不振,舌质淡红,苔薄白,脉缓。③气阴亏虚:以盗汗为主,常伴自汗,手足心热。

236.(B型题)治疗丹痧邪侵肺卫证,应首选

- A.解肌透痧汤
- B.凉营清气汤
- C.沙参麦冬汤
- D.银翘散
- E.清胃解毒汤

答案:A

解析:丹痧西医学称为猩红热。丹痧邪侵肺卫证用解肌透痧汤,毒炽气营证用凉营清气汤,疹后伤阴证用沙参麦冬汤。银翘散用于水痘邪伤肺胃证,清胃解毒汤用于水痘邪炽气营证。

237.(B型题)治疗丹痧毒炽气营证,应首选

- A.解肌透痧汤
- B.凉营清气汤
- C.沙参麦冬汤
- D.银翘散
- E.清胃解毒汤

答案:B

解析:丹痧西医学称为猩红热。丹痧邪侵肺卫证用解肌透痧汤,毒炽气营证用凉营清气汤,疹后伤阴证用沙参麦冬汤。银翘散用于水痘邪伤肺胃证,清胃解毒汤用于水痘邪炽气营证。

238.(A1型题)下列哪项可引起变态反应性发热

- A.血型不合的输血
- B.重度脱水
- C.大面积烧伤
- D.心肌梗死
- E.中暑

答案:A

解析:多次输血后受血者产生同种白细胞或血小板抗体,再输血时,可与供者的白细胞或血小板发生抗原抗体反应,激活补体,进一步引起白细胞或血小板溶解而释放致热原,引起发热。故本题选A。

239.(A1型题)下列除哪项外,均可发生胸痛

- A.带状疱疹
- B.食管炎
- C.自发性气胸
- D.支气管哮喘
- E.肋软骨炎

答案:D

解析:支气管哮喘的时候,气道因为高反应性而分泌物增加,痉挛,导致气道狭窄,气流进入肺部出现困难,会导致呼吸困难,胸闷等,但不会引起胸痛。故本题选D。

240.(A1型题)腹痛位于右下腹部,应首先考虑的是

- A.急性胆囊炎
- B.急性阑尾炎
- C.急性胰腺炎
- D.急性膀胱炎
- E.急性胃炎

答案:B

解析:右下腹部的脏器主要为阑尾,升结肠,空、回肠等。疼痛应优先考虑原位器官的疾病,即急性阑尾炎。D、E不会出现右下腹疼痛。A导致穿孔的时候可以出现右下腹痛,但不是最早出现的症状。出血坏死性胰腺炎可沿十二指肠流至右下腹引起疼痛,但也不是最早的症状。故本题选B。

241.(A1型题)下列哪项不是采集“既往史”所要求的内容

- A.是否到过传染病流行地区
- B.过去手术史
- C.预防接种情况
- D.传染病史
- E.过敏史

答案:A

解析:是否到过传染病流行地区应属于社会经历,书写于个人史中。故本题选A。

242.(A1型题)昏迷伴双侧瞳孔大小不等,多见于

- A.巴比妥中毒
- B.海洛因中毒
- C.颅内血肿
- D.低血糖昏迷
- E.有机磷农药中毒

答案:C

解析:双侧瞳孔大小不等常提示有颅内病变,如脑外伤、脑肿瘤、中枢神经梅毒、脑疝、颅内高压等。故本题选C。

243.(A1型题)在下列哪个部位闻及支气管呼吸音属于病理性呼吸音

- A.喉部
- B.胸骨上窝
- C.背部6、7颈椎附近
- D.背部1、2胸椎附近
- E.右下肺

答案:E

解析:右下肺在正常情况下应能听到肺泡呼吸音,若闻及支气管呼吸音则为病理性呼吸音。这是气流通过声门、气管和支气管时发出的湍流声。故本题选E。

244.(A1型题)下列各项中,有匙状甲的是

- A.支气管扩张
- B.缺铁性贫血
- C.支气管肺癌
- D.慢性肺脓肿
- E.脓胸

答案:B

解析:匙状甲表现为指甲中部凹陷,边缘翘起,较正常变薄,表面粗糙有条纹。常为组织缺铁和某些氨基酸代谢障碍所引起。多见于缺铁性贫血。故本题选B。

245.(A1型题)血小板计数的参考值是

- A. $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
- B. $(100 \sim 300) \times 10^8 / L$
- C. $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
- D. $> 400 \times 10^9 / L$
- E. $< 100 \times 10^9 / L$

答案:C

解析:血小板计数的参考值是 $(100\sim 300)\times 10^9/L$ 。血小板 $>400\times 10^9/L$ 称为血小板增多, $<100\times 10^9/L$ 称为血小板减少。故本题选C。

246.(A1型题)腰穿进行脑脊液检查的禁忌证是

- A.颈强直
- B.克匿格征阳性
- C.布鲁津斯基征阳性
- D.双侧瞳孔不等大伴有视乳头水肿
- E.昏迷

答案:D

解析:双侧瞳孔不等大伴有视乳头水肿提示颅内高压。如果此时进行腰穿,可使脑脊液迅速流出,造成脑疝。故本题选D。

247.(A1型题)下列哪项不是肺气肿的X线表现

- A.中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影
- B.肺体积膨大
- C.肺纹理稀疏
- D.肋间隙增宽
- E.膈肌下降且活动度减弱

答案:A

解析:肺气肿的时候,患者两肺含气量增多,扩大,密度降低,会导致肺纹理之间距离增大,压迫膈肌使其下降并且不易上移,肋间隙也会被扩大的肺脏挤压增宽。而中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影多见于肺炎患者,主要为炎性渗出而引起的高密度影。故本题选A。

248.(A1型题)下列描述属于浸润型肺结核X线表现的是

- A.哑铃状双极现象
- B.肺门和(或)纵隔淋巴结肿大而突向肺野
- C.渗出、增殖、播散、纤维、空洞等多种性质的病灶同时存在
- D.均匀一致的粟粒状阴影
- E.患侧肋膈角变钝

答案:C

解析:浸润型肺结核病变多在肺尖和锁骨下区开始,X线可见渗出、增殖、播散、纤维和空洞等多种性质的病灶同时存在。A是原发综合征;B是胸内淋巴结结核;D是急性粟粒型肺结核;E是结核性胸膜炎。故本题选C。

249.(A2型题)患者,男,65岁。皮肤、巩膜黄染进行性加重,大便持续变白,消瘦明显。应首先考虑的是

- A.急性病毒性肝炎
- B.肝硬化
- C.肝癌
- D.胰头癌
- E.胆总管结石

答案:D

解析:肝管和胆总管收集肝内和胆囊内胆汁汇入胆管,胆管和胰管共同开口于十二指肠乳头;胰头癌时,肿瘤阻塞胆管,无胆汁进入消化道,故可见黄疸进行性加

重、大便持续变白；急性病毒性肝炎、肝硬化、肝癌、胆总管结石时，也可出现黄疸，但重度黄疸时考虑胰头癌可能性大。故本题选D。

250.(A2型题)患者少尿2天。实验室检查：尿比重持续低于1.012。应首先考虑的是

- A.肾病综合征
- B.严重失水
- C.心功能不全
- D.急性肾炎
- E.急性肾功能衰竭

答案：E

解析：正常人在普通膳食情况下，尿比重波动在1.015~1.025。肾病综合征患者伴有大量蛋白尿，尿比重增高，排除A。严重失水患者，尿液浓缩，尿比重增高，排除B。心功能不全患者，可出现少量蛋白尿，但肾脏稀释浓缩功能正常，尿比重正常，排除C。急性肾炎患者也伴轻、中度蛋白尿，尿液比重增加，排除D。急性肾功能衰竭患者，肾脏稀释浓缩功能衰竭，患者可出现持续少尿及尿比重下降。故本题选E。

251.(A2型题)患者，女，70岁。冠心病史5年。今日突然心悸气短，不能平卧，咳嗽，咳粉红色沫样痰。应首先考虑的是

- A.肺癌
- B.肺脓肿
- C.肺结核
- D.急性肺水肿
- E.支气管扩张

答案：D

解析：肺癌临床表现为刺激性干咳及咯血，排除A。肺脓肿，以咳腥臭浓痰为其表现，排除B。肺结核有潮热、盗汗、消瘦、咳嗽症状，排除C。支气管扩张，以长期咳吐大量浓痰、血痰为主，排除E。粉红色泡沫样痰为急性肺水肿的特征性表现，此患者急性肺水肿可因左心衰引起肺淤血所致。故本题选D。

252.(B型题)二尖瓣狭窄出现呼吸困难时，常伴有

- A.窒息感
- B.双下肢水肿
- C.发热
- D.咯血
- E.昏迷

答案：B

解析：二尖瓣狭窄致心脏功能不全，心功能衰竭时，患者出现呼吸困难时，还可出现心衰的其他症状，如双下肢水肿等；急性脑血管疾病出现呼吸困难时，常伴有一些精神神经症状，如昏迷等。

253.(B型题)急性脑血管疾病出现呼吸困难时，常伴有

- A.窒息感
- B.双下肢水肿
- C.发热

D.咯血

E.昏迷

答案:E

解析:二尖瓣狭窄致心脏功能不全,心功能衰竭时,患者出现呼吸困难时,还可出现心衰的其他症状,如双下肢水肿等;急性脑血管疾病出现呼吸困难时,常伴有一些精神神经症状,如昏迷等。

254.(B型题)主动脉瓣狭窄的杂音,性质是

A.多局限在心尖部的舒张期杂音

B.向左腋窝传导的收缩期杂音

C.向胸骨下端左缘传导的舒张期杂音

D.沿胸骨右缘向颈部传导的收缩期杂音

E.向左肩胛下角传导的收缩期杂音

答案:D

解析:主动脉狭窄时,可闻及收缩期喷射性杂音,在胸骨右缘第2肋间最响,主要向颈动脉传导;主动脉关闭不全时,为与第二心音同时产生的高调叹气样递减型舒张早期杂音。

255.(B型题)主动脉瓣关闭不全的杂音,性质是

A.多局限在心尖部的舒张期杂音

B.向左腋窝传导的收缩期杂音

C.向胸骨下端左缘传导的舒张期杂音

D.沿胸骨右缘向颈部传导的收缩期杂音

E.向左肩胛下角传导的收缩期杂音

答案:C

解析:主动脉狭窄时,可闻及收缩期喷射性杂音,在胸骨右缘第2肋间最响,主要向颈动脉传导;主动脉关闭不全时,为与第二心音同时产生的高调叹气样递减型舒张早期杂音。

256.(B型题)慢性肾炎患者,尿中最多见的细胞是

A.红细胞

B.白细胞

C.血小板

D.小圆上皮细胞

E.扁平上皮细胞

答案:A

解析:慢性肾炎患者以血尿、蛋白尿、水肿、高血压为其临床表现,尿液里以红细胞最多见;而慢性肾盂肾炎是泌尿系感染中的一种,由感染引起,尿液里以白细胞最多见。

257.(B型题)慢性肾盂肾炎患者,尿中最多见的细胞是

A.红细胞

B.白细胞

C.血小板

D.小圆上皮细胞

E.扁平上皮细胞

答案:B

解析:慢性肾炎患者以血尿、蛋白尿、水肿、高血压为其临床表现,尿液里以红细胞最多见;而慢性肾盂肾炎是泌尿系感染中的一种,由感染引起,尿液里以白细胞最多见。

258.(B型题)急性左心功能不全,常伴有

A.咳铁锈色痰

B.咳粉红色泡沫痰

C.咯吐大量鲜血

D.咳大量脓痰

E.干咳无痰

答案:B

解析:左心功能不全时,肺循环淤血,患者咳粉红色泡沫样痰;咳铁锈色痰为肺炎球菌肺炎特有的临床表现。

259.(B型题)肺炎球菌肺炎,常伴有

A.咳铁锈色痰

B.咳粉红色泡沫痰

C.咯吐大量鲜血

D.咳大量脓痰

E.干咳无痰

答案:A

解析:左心功能不全时,肺循环淤血,患者咳粉红色泡沫样痰;咳铁锈色痰为肺炎球菌肺炎特有的临床表现。

260.(A1型题)流行性出血热三红三痛见于哪一期

A.发热期

B.低血压休克期

C.少尿期

D.多尿期

E.恢复期

答案:A

解析:流行性出血热在发热期主要表现为感染中毒症状、毛细血管损伤和肾脏损害,此期体温可达 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$,热型多为弛张热或稽留热,一般持续3~7日;全身中毒症状见高度乏力,周身酸痛——

“三痛”(头痛、腰痛、眼眶痛),常伴较突出的胃肠道症状;毛细血管损伤见“三红”征——

颜面、颈部及上胸部弥漫性潮红如酒醉貌;颜面和眼睑浮肿,眼结膜充血,球结膜水肿。故本题选A。

261.(A1型题)诊断霍乱不需要做的辅助检查是

A.增菌培养

B.血清学检查

C.粪便涂片染色

D.特异性核酸检测

E.悬滴检查

答案:D

解析:霍乱的实验室检查包括一般检查——
血液检查、尿液检查、粪便常规;血清学检查;病原学检查——
粪便涂片染色、悬滴检查、增菌培养、PCR。特异性核酸检测是细菌性痢疾的实验室检查之一。故本题选D。

262.(A2型题)患者,男,18岁。突然出现无痛性腹泻,米泔水样便,量多,大便频繁,继之出现喷射状呕吐,呕吐物为米泔水样。查体:神志淡漠,声音嘶哑,眼窝深凹,口唇干燥。应首先考虑的是

- A.霍乱
- B.急性细菌性痢疾
- C.急性胃肠炎
- D.伤寒
- E.副伤寒

答案:A

解析:霍乱多突然发病,以剧烈腹泻开始,继之呕吐。多无腹痛、里急后重,大便日数次至数十次,开始为稀便,后为水样,少数为米泔水样。腹泻1~2次后出现喷射状呕吐,与大便性质相似,常无恶心。严重吐泻后,可迅速出现脱水虚脱。细菌性痢疾的特点为里急后重,黏液脓血便,排除B。伤寒、副伤寒会伴有皮疹或皮下出血点,排除D、E。急性胃肠炎患者,出现腹泻,呕吐症状,但不是米泔样,排除C。故本题选A。

263.(A2型题)某患者由印尼入境后2天,频繁腹泻,无腹痛及里急后重,伴有呕吐。最重要的检查是

- A.血常规
- B.尿常规
- C.电解质
- D.泻吐物悬滴检查
- E.以上均非

答案:D

解析:频繁腹泻,无腹痛及里急后重,伴有呕吐,考虑为霍乱,最重要的检查是泻、吐物悬滴检查。故本题选D。

264.(A1型题)慢性肺心病最常发生的休克是

- A.中毒性休克
- B.失血性休克
- C.心源性休克
- D.过敏性休克
- E.低血糖性休克

答案:C

解析:慢性肺心病患者可以因为肺淤血和肺水肿,呼吸困难,导致血氧浓度降低,应激反应造成神经体液变化。一方面使心率加快,心肌收缩力增强,另一方面使外周血管阻力增加,提高动脉血压,保证重要脏器血液灌注。但这些变化又进一步加重心脏的负担和缺氧,促使心泵衰竭。最终引起脑供氧不足,休克。故本题选C。

265.(A1型题)下列不属于肺癌局部扩散引起的症状的是

- A. 呕吐
- B. 呼吸困难
- C. 声音嘶哑
- D. 上腔静脉压迫综合征
- E. 胸痛

答案:A

解析:肺癌局部扩展引起胸痛、呼吸困难、咽下困难、声音嘶哑、上腔静脉压迫综合征、Horner综合征等。故本题选A。

266.(A1型题)我国高血压病最常见的死亡原因是

- A. 高血压危象
- B. 急性脑血管病
- C. 尿毒症
- D. 心力衰竭
- E. 缺血性心脏病

答案:B

解析:高血压并发症为高血压危象、高血压脑病、脑血管病、心力衰竭、慢性肾衰竭,其中脑血管意外是我国高血压病最常见的死亡原因。故本题选B。

267.(A1型题)胃癌的首要转移途径是

- A. 直接蔓延,可直接侵犯相邻器官和组织,以大网膜、肝、胰、横结肠为常见
- B. 空肠、膈肌以至腹壁
- C. 左锁骨上淋巴结转移
- D. 右锁骨上淋巴结转移
- E. 血行转移

答案:C

解析:胃癌的转移途径有:直接蔓延至相邻器官;淋巴转移至胃旁及远处淋巴结(左锁骨上淋巴结最早最常见);血循转移至其他脏器;种植转移于腹腔、盆腔。故本题选C。

268.(A1型题)关于急性出血坏死型胰腺炎的诊断,下列哪项是错误的

- A. 血钙显著升高
- B. 无糖尿病史而血糖升高
- C. 血清淀粉酶突然下降
- D. 烦躁不安,四肢厥冷,有休克表现
- E. 范围广泛的剧烈腹痛伴高热与腹膜刺激征象

答案:A

解析:急性出血性坏死型胰腺炎时,患者常出现明显脱水与代谢性酸中毒,低钙血症($<2\text{mmol/L}$)。血糖升高、血清淀粉酶开始升高突然下降、休克表现及腹膜刺激征等都是急性出血性坏死型胰腺炎的常见临床表现。故本题选A。

269.(A1型题)下列哪项容易引起泌尿系感染

- A. 肾盂造影
- B. 导尿
- C. 核素肾图检查

- D.肾穿刺
E.血液透析

答案:B

解析:尿路器械的使用不但会将细菌带入尿路,而且常使尿路黏膜损伤,因而易引起泌尿系感染,而肾盂造影、核素肾图检查几乎不引起感染,排除A、C。肾穿刺、血液透析须在严格无菌条件下进行,感染可能性极低,排除D、E。故本题选B。

270.(A1型题)下列各项中,除哪项外,均是肾病综合征的临床表现

- A.大量蛋白尿
B.高血压
C.高胆固醇血症
D.低血浆白蛋白
E.水肿

答案:B

解析:肾病综合征临床表现为:三高一低。三高:蛋白尿 $>3.5\text{g/d}$ 、水肿、血脂升高;一低:血浆白蛋白低于 30g/L 。故本题选B。

271.(A1型题)2型糖尿病患者空腹血糖正常,餐后血糖122,治疗宜选用

- A.阿卡波糖
B.二甲双胍
C.胰岛素
D.格列本脲
E.格列喹酮

答案:A

解析:①二甲双胍:2型糖尿病无明显消瘦以及伴血脂异常、高血压或高胰岛素血症者;1型糖尿病与胰岛素联合应用。②格列本脲、格列吡嗪、格列美脲:非肥胖2型糖尿病患者;肥胖2型糖尿病患者应用双胍类血糖控制仍不满意,或不耐受者。③阿卡波糖、伏格列波糖:2型糖尿病或IGT,尤其是餐后血糖高者;1型糖尿病用胰岛素时加用。④罗格列酮、吡格列酮:2型糖尿病肥胖、胰岛素抵抗明显者。⑤瑞格列奈、那格列奈和米格列奈:2型糖尿病早期餐后高血糖阶段或以餐后高血糖为主的老年患者。故本题选A。

272.(A1型题)糖尿病酮症酸中毒急救的首要措施是

- A.补液
B.补钾
C.小剂量胰岛素
D.适量补钠
E.碱治疗

答案:A

解析:糖尿病酮症酸中毒见“三多一少”症状加重,恶心、厌食、酸中毒、脱水、休克、昏迷。立即补液为救治的关键性措施;同时予小剂量(短效)胰岛素,纠正酸碱平衡失调(以纠正代谢性酸中毒为主),充分补钾,去除诱因和处理并发症。故本题选A。

273.(A1型题)脑栓塞多长时间CT可见低密度影

- A.0~12小时
B.12~24小时

- C.24~48小时
- D.36~48小时
- E.48~72小时

答案:C

解析:急性脑梗死通常在起病24~48小时后CT可见闭塞血管低密度病变区,并能发现周围水肿区,以及有无合并出血和脑疝。在3~5天内可见缺血性脑水肿高峰期,2~3周后完全消退。故本题选C。

274.(A2型题)李某,男,24岁。2周前患扁桃体炎,近日心悸,气短,发热,出汗,疲乏,踝、膝关节游走性疼痛。查体:第一心音减弱,上肢内侧皮肤有环形红斑。应首先考虑的是

- A.类风湿性关节炎
- B.病毒性心肌炎
- C.心包炎
- D.风湿热
- E.特发性血小板减少性紫癜

答案:D

解析:类风湿性关节炎的临床表现主要是晨僵、关节痛、关节肿,排除A。病毒性心肌炎发病前也有病毒感染前驱症状,然后出现心悸、胸痛、呼吸困难等,但不会出现心脏外表现,排除B。心包炎患者也不会出现关节类的病变,排除C。特发性血小板减少性紫癜不会出现关节游走性疼痛,排除E。故本题选D。

275.(A2型题)风湿性心脏病心衰服用地高辛13天,出现恶心、呕吐,室早二联律,除停用洋地黄外,治疗应首选

- A.慢心律
- B.心得安
- C.钾盐
- D.心律平
- E.胺碘酮

答案:C

解析:洋地黄中毒最重要的反应是各类心律失常,最常见的为室性期前收缩,所表现为二联律;还可出现各种胃肠道反应,如恶心、呕吐;根据患者病史及临床表现,可诊断洋地黄中毒;对于洋地黄中毒的处理,应立即停药,对快速性心律失常者,应静脉补充钾盐;有传导阻滞及缓慢性心律失常者可用阿托品0.5~1.0mg皮下或静脉注射。故本题选C。

276.(A2型题)患者,男,56岁。心前区疼痛,反复发作,疼痛向左臂放射。应首先考虑的是

- A.胸膜炎
- B.自发性气胸
- C.肋间神经炎
- D.带状疱疹
- E.心绞痛

答案:E

解析:肋间神经炎的疼痛特点为刺痛或灼痛,疼痛为持续性,排除C;带状疱疹疼痛为持续性,排除D;胸膜炎患者应该有发热等炎症反应特点,患者主要表现为疼

痛,排除A;自发性气胸患者,疼痛持续时间短暂,但继疼痛后患者会出现胸闷、呼吸困难等表现,排除B。故本题选E。

277.(A2型题)某男,饱餐后突发剧烈中上腹刀割样疼痛,板状腹,最可能的诊断是

- A.急性阑尾炎
- B.消化性溃疡穿孔
- C.急性胃炎
- D.急性胆囊炎
- E.急性胰腺炎

答案:B

解析:板状腹为急性弥漫性腹膜炎的特征性表现,多由急性胃肠穿孔或实质性脏器破裂所引起,患者为餐后突发,考虑消化性溃疡穿孔可能性大。故本题选B。

278.(A2型题)王某,男,53岁。有乙肝病史,近1个月右上腹胀痛加重,时有牙龈出血。查体:有肝掌,胸部有蜘蛛痣,肝肋缘下3cm,质硬,有压痛,脾肿大,腹水征阳性,腹壁静脉曲张,应首先考虑的是

- A.慢性乙肝活动期
- B.原发性肝癌
- C.肝硬化
- D.疟疾
- E.肝脓肿

答案:C

解析:当肝细胞严重受损时,凝血因子合成减少,会出现各种出血倾向,如牙龈出血、皮肤紫癜;肝细胞严重受损时,对雌激素灭活能力减弱,使雌激素在体内蓄积,出现肝掌、蜘蛛痣等;腹水、脾大、腹壁静脉曲张,均为门静脉高压的表现,综合患者有乙肝病史,肝脏肿大、质硬、压痛可诊断为肝硬化。故本题选C。

279.(A2型题)患者,女,26岁。婚后2周突发畏寒,高热,尿频,尿痛。检查:肾区有叩击痛。尿镜检白细胞增多,并见白细胞管型,尿细菌培养阳性。其诊断是

- A.急性肾盂肾炎
- B.急性膀胱炎
- C.急性肾炎
- D.慢性肾炎
- E.肾结石

答案:A

解析:患者婚后2周起病,发病急,考虑是性生活引起尿道黏膜损伤或刺激后,细菌上行感染引起,排除慢性病的可能,排除D。尿镜检见白细胞管型,可与膀胱炎相鉴别,排除B。患者无血尿、蛋白尿、水肿、高血压等症状,可与急性肾炎相鉴别,排除C。肾结石主要临床表现是:疼痛,患侧胀痛、钝痛或肾绞痛,肾区叩击痛或从尿中排出结石为主,依据患者临床表现,排除E。急性肾盂肾炎是细菌及其他微生物病原体引起的感染性肾脏疾病,起病急,寒战、高热等全身中毒的表现为其主要特征;尿频、尿急、尿痛为泌尿系刺激症状;查体:肾区叩击痛,尿细菌培养阳性,均可支持诊断。故本题选A。

280.(A2型题)女性,40岁,低热半年,牙龈易出血,全身浅表淋巴结肿大,肝右肋缘下3cm,脾肋下10cm,化验:血红蛋白110g/L,白细胞计数 $200 \times 10^9/L$,原粒及

早幼粒为6%，骨髓原粒为2%，Ph染色体(+)。诊断为

- A.慢粒急变
- B.类白血病反应
- C.急性粒细胞性白血病
- D.慢性粒细胞性白血病
- E.慢性淋巴细胞性白血病

答案:D

解析:因原粒及早幼粒在血液及骨髓中比例很小,疾病为慢性,排除C。且ph染色体(+),类白血病反应中,ph染色体(-),排除B。白细胞计数为 $200 \times 10^9/L$,排除E。慢粒急变时,原粒+早幼粒 $>30\%$,排除A。故本题选D。

281.(A2型题)患儿,男,14岁。患1型糖尿病2年,今日在家中用胰岛素治疗后突然出现昏迷。其昏迷原因最可能是

- A.酮症酸中毒
- B.高渗性昏迷
- C.呼吸性酸中毒
- D.乳酸性酸中毒
- E.低血糖昏迷

答案:E

解析:参见69题。故本题选E。

282.(A2型题)某患者,女,23岁。被人发现时躺在地板上,呈昏迷状态,口吐白沫。查体:神志不清,两瞳孔针尖大小,口唇发绀,两肺满布水泡音,心率60次/分,肌肉震颤。应首先考虑的是

- A.癫痫大发作
- B.肝昏迷
- C.尿毒症
- D.有机磷农药中毒
- E.安眠药中毒

答案:D

解析:有机磷农药中毒患者临床表现有:①毒蕈碱样表现,主要为瞳孔缩小、心跳减慢等;②烟碱样表现,主要为肌肉纤颤甚至全身肌肉强直性痉挛。故本题选D。

283.(B型题)慢性支气管炎与肺结核的主要鉴别依据是

- A.有无发热
- B.有无咳嗽
- C.有无咯血
- D.痰菌检查
- E.支气管造影

答案:D

解析:在肺结核患者痰液中找到抗酸杆菌,可用于鉴别慢性支气管炎与肺结核;支气管造影可见到扩张的支气管,能明确支气管扩张的部位、程度等,可用于慢性支气管炎与支气管扩张症的鉴别。

284.(B型题)缓解急性支气管哮喘的药物是

- A.茶碱类药

- B.抗胆碱能药
- C.β₂受体激动剂
- D.吸入型糖皮质激素
- E.钙拮抗剂

答案:C

解析:β₂受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物,吸入型糖皮质激素是长期治疗哮喘的首选药物。

285.(B型题)肝硬化,雌激素灭活障碍,可出现

- A.扑翼样震颤
- B.出血倾向
- C.皮肤色素沉着
- D.脾脏肿大
- E.蜘蛛痣

答案:E

解析:肝硬化,雌激素灭活障碍可出现蜘蛛痣、肝掌;肝硬化凝血因子合成障碍的时候可出现出血倾向;肾上腺皮质功能减损时,患者面部(尤其眼眶周围)和其他暴露部位,可出现皮肤色素沉着;肝硬化门脉高压时,可出现脾大、腹水、腹壁静脉曲张等,肝硬化肝性脑病时,出现扑翼样震颤。

286.(B型题)肝硬化门脉高压,可出现

- A.扑翼样震颤
- B.出血倾向
- C.皮肤色素沉着
- D.脾脏肿大
- E.蜘蛛痣

答案:D

解析:肝硬化,雌激素灭活障碍可出现蜘蛛痣、肝掌;肝硬化凝血因子合成障碍的时候可出现出血倾向;肾上腺皮质功能减损时,患者面部(尤其眼眶周围)和其他暴露部位,可出现皮肤色素沉着;肝硬化门脉高压时,可出现脾大、腹水、腹壁静脉曲张等,肝硬化肝性脑病时,出现扑翼样震颤。

287.(A1型题)下列各项,不属中国古代医德思想内容的是

- A.救死扶伤、一视同仁的道德准则
- B.仁爱救人、赤诚济世的事业准则
- C.清廉正直、不图钱财的道德品质
- D.认真负责、一丝不苟的服务态度
- E.不畏权贵、忠于医业的献身精神

答案:D

解析:中国古代医德思想的主要内容包括:仁爱救人、赤诚济世的事业准则;清廉正直、不图名利的道德品质;

288.(A1型题)最早出现医学伦理学起源的是

- A.英国
- B.美国
- C.埃及

D.古希腊

E.中国

答案:D

解析:古希腊文化是西方文明的源头,其医德思想直接影响了整个西方医德的发展。其代表为希波克拉底的《希波克拉底誓言》。故本题选D。

289.(A1型题)在使用辅助检查手段时,不适宜的是

A.认真严格地掌握适应证

B.可以广泛积极地依赖各种辅助检查

C.有利于提高医生诊治疾病的能力

D.必要检查能尽早确定诊断和进行治疗

E.应从患者的利益出发决定该做的项目

答案:B

解析:在使用辅助检查手段时,认真严格地掌握适应证,可以积极利用辅助检查手段,有利于提高医生诊治疾病的能力,应从患者的利益出发决定该做的项目,必要检查能尽早确定诊断和进行治疗。但不可广泛地依赖辅助检查。故本题选B。

290.(A1型题)根据美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念,不能确诊“脑死亡”的条件是

A.自主运动和自主呼吸消失

B.对外部刺激和内部需求毫无知觉和反应

C.体温低于 32.2°C 或服用中枢抑制药物者

D.脑电波平直或等电位

E.诱导反射消失

答案:C

解析:体温低于 32.2°C 或服用中枢抑制药物者,属暂时中枢抑制,不能确诊“脑死亡”。故本题选C。

291.(A1型题)将安乐死立法的第一个国家是

A.美国

B.中国

C.澳大利亚

D.意大利

E.荷兰

答案:E

解析:2002年4月1日,荷兰安乐死法律正式生效,成为世界上第一个承认安乐死合法的国家。故本题选E。

292.(B型题)“无恒德者,不可以作医,人命死生之系”。出自的著作是

A.《省心录·论医》

B.《备急千金要方》

C.《外科正宗》

D.《本草纲目》

E.《迈蒙尼提斯祷文》

答案:A

解析:“无恒德者,不可以作医,人命死生之系”出自《省心录·论医》。“启我爱医术,复爱世间人,愿绝名利心,尽力为病人,无分爱与憎,不问富与贫,凡诸疾病者,一视如同仁”出自《迈蒙尼提斯祷文》。

293.(B型题)“启我爱医术,复爱世间人,愿绝名利心,尽力为病人,无分爱与憎,不问富与贫,凡诸疾病者,一视如同仁”。出自的著作是

A.《省心录·论医》

B.《备急千金要方》

C.《外科正宗》

D.《本草纲目》

E.《迈蒙尼提斯祷文》

答案:E

解析:“无恒德者,不可以作医,人命死生之系”出自《省心录·论医》。“启我爱医术,复爱世间人,愿绝名利心,尽力为病人,无分爱与憎,不问富与贫,凡诸疾病者,一视如同仁”出自《迈蒙尼提斯祷文》。

294.(B型题)反映医患关系本质的是

A.医患关系是一种民事法律关系

B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系

C.医患关系是一种商家与消费者的关系

D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系

E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

答案:B

解析:医患关系是具有道德意义较强的社会关系,反映的是医患关系本质。医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系,概括的是医患关系内容。

295.(B型题)概括医患关系内容的是

A.医患关系是一种民事法律关系

B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系

C.医患关系是一种商家与消费者的关系

D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系

E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

答案:E

解析:医患关系是具有道德意义较强的社会关系,反映的是医患关系本质。医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系,概括的是医患关系内容。

296.(B型题)超过有效期的药品是

- A.劣药
- B.假药
- C.残次药品
- D.仿制药品
- E.特殊管理药品

答案:A

解析:劣药包括:①未标明有效期或者更改有效期的;②不注明或者更改生产批号的;③超过有效期的;④直接接触药品的包装材料和容器未经批准的;⑤擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的;⑥其他不符合药品标准规定的。假药包括:①国务院药品监督管理部门规定禁止使用的;②依照本法必须批准而未经批准生产、进口,或者依照本法必须检验而未经检验即销售的;③变质的;④被污染的;⑤使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的;⑥所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。

297.(B型题)所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品是

- A.劣药
- B.假药
- C.残次药品
- D.仿制药品
- E.特殊管理药品

答案:B

解析:劣药包括:①未标明有效期或者更改有效期的;②不注明或者更改生产批号的;③超过有效期的;④直接接触药品的包装材料和容器未经批准的;⑤擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的;⑥其他不符合药品标准规定的。假药包括:①国务院药品监督管理部门规定禁止使用的;②依照本法必须批准而未经批准生产、进口,或者依照本法必须检验而未经检验即销售的;③变质的;④被污染的;⑤使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的;⑥所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。

298.(B型题)属于甲类传染病的是

- A.鼠疫
- B.流行性感
- C.百日咳
- D.麻风病
- E.流行性腮腺炎

答案:A

解析:《传染病防治法》第三条,本法规定的传染病分为甲类、乙类和丙类。甲类传染病是指鼠疫、霍乱。乙类传染病是指传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑

脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

299.(B型题)各级各类卫生防疫机构按照专业分工应

- A.在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- B.承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
- C.做出对甲类传染病疫区实施封锁管理的决定
- D.承担责任范围内的传染病监测管理工作
- E.对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

答案:D

解析:《传染病防治法》第七条规定,各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。医疗机构承担与医疗救治有关的传染病防治工作和责任区域内的传染病预防工作。城市社区和农村基层医疗机构在疾病预防控制机构的指导下,承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。

300.(B型题)各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应

- A.在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- B.承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
- C.做出对甲类传染病疫区实施封锁管理的决定
- D.承担责任范围内的传染病监测管理工作
- E.对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

答案:B

解析:《传染病防治法》第七条规定,各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。医疗机构承担与医疗救治有关的传染病防治工作和责任区域内的传染病预防工作。城市社区和农村基层医疗机构在疾病预防控制机构的指导下,承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。