

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷四【451-600题】

金英杰医学教育

451.(B型题)187普萘洛尔(心得安)禁用于治疗

- A.心源性哮喘
- B.支气管哮喘
- C.慢性支气管炎
- D.原发性支气管癌
- E.肺脓肿

答案:B

解析:吗啡禁用于慢性阻塞性肺疾患、支气管哮喘、肺源性心脏病;急性左心衰竭晚期并出现呼吸衰竭时忌用。心得安禁用于支气管哮喘、心源性休克、心传导阻滞(II至III度房室传导阻滞)、重度心力衰竭、窦性心动过缓。故186题选B, 187题选B。

452.(B型题)191治疗充血性心力衰竭时,不宜使用

- A.氢氯噻嗪(双氢克尿噻)
- B.呋塞米(速尿)
- C.巯甲丙脯酸(开搏通)
- D.甘露醇
- E.氨苯喋啶

答案:D

解析:急性肺水肿发作时,应进行快速利尿,因此选用速尿。充血性心力衰竭时禁用甘露醇,会加重肺淤血或肺水肿。A用于水肿和高血压病人。C用于高血压及心力衰竭病人。E用于治疗心力衰竭、肝硬化和慢性肾炎等引起的顽固性水肿或腹水。故190题选B, 191题选D。

453.(B型题)194劳力型心绞痛的诊断标准是

- A.增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛
- B.无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛
- C.心绞痛发作时,心电图示此导联ST段抬高
- D.心尖部针刺样疼痛,发作时无心电图异常
- E.心前区压迫样疼痛15分钟以上,心电图有病理性Q波

答案:A

解析:心绞痛分为稳定型心绞痛和不稳定型心绞痛。不稳定型又分为初发劳力型心绞痛、恶化劳力型心绞痛、静息心绞痛、梗死后心绞痛、变异型心绞痛。劳力型心绞痛指由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发的心绞痛。变异型心绞痛是指发作时心电图表现不同,显示有关导联的ST段抬高,而之相对应的导联ST段压低(其他类型心绞痛则除aVR及V₁外各导联ST段普遍压低)。故194题选A, 195题选C。

454.(B型题)197心绞痛发则胸闷痛如窒,气短痰多,肢体沉重,纳呆泛恶,舌苔浊腻,脉滑。证属

- A.阴寒凝滞
- B.心血瘀阻
- C.气虚血瘀

D.痰浊内阻

E.气阴两虚

答案:D

解析:心绞痛遇劳则发,神疲乏力,气短懒言,心悸自汗,舌淡为气虚证;舌暗,脉结代属于血瘀证,辨为气虚血瘀证,治以补气活血。痰浊盘踞,胸阳失展,故胸闷痛如窒;脾主四肢,痰浊困脾,脾气不运,故肢体沉重;舌苔浊腻,脉滑为痰浊内阻之象。治宜通阳泄浊,豁痰开窍,方用瓜蒌薤白白酒汤。故196题选C,197题选D

455.(B型题)200治疗风心病水气凌心射肺证,应首选

A.保元汤

B.天王补心丹

C.真武汤

D.苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤

E.五味子汤合桃仁红花煎

答案:D

解析:风心病水气凌心射肺证,应治以温阳化气,泻肺利水,方用苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减。心肾阳虚证,治以温补心肾,方用真武汤。A多用于气虚证。B多用于心肾阴虚证。E多用于肺气不足证。故200题选C,201题选D。

456.(B型题)202治疗胃溃疡脾胃虚寒证,应首选

A.理中丸合黄芪建中汤

B.柴胡疏肝散合左金丸

C.失笑散合丹参饮

D.一贯煎合左金丸

E.化肝煎

答案:A

解析:胃溃疡脾胃虚寒证治以温中补虚,健脾和胃,方用理中丸合黄芪建中汤加减。而胃络瘀阻证治以活血通络、和胃止痛,方用失笑散合丹参饮加减。B多用于治疗肝胃不和证。D多用于治疗肝肾阴虚证。E多用于治疗肝胃郁热证。故202题选A,203题选C。

457.(B型题)206与雌激素增加有关的肝硬化,可见

A.贫血

B.出血倾向

C.腹水

D.肝昏迷

E.蜘蛛痣

答案:E

解析:肝硬化时,肝脏对雌激素的灭活能力下降,故男性可见性功能减退,男性乳房发育,女性可发生闭经、不孕,皮肤可见蜘蛛痣、肝掌等。肝硬化时,肝脏对氨的代谢能力明显减退,血氨浓度升高,氨能干扰脑细胞的代谢,而易发展为肝性脑病,表现为肝昏迷。A多是出血后引起的。B多与肝脏合成凝血因子减少及脾功能亢进有关。C多由于门静脉高压引起。故206题选E,207题选D。

458.(B型题)208急性胰腺炎肝郁气滞证,治疗应首选的方剂是

- A.小柴胡汤
- B.清胰汤合龙胆泻肝汤
- C.大承气汤
- D.桃仁承气汤
- E.大柴胡汤

答案:A

解析:A用于急性胰腺炎肝郁气滞证。B用于急性胰腺炎肝胆湿热证。C用于急性胰腺炎肠胃热结证。D、E均不是急性胰腺炎的适用方。故208题选A, 209题选B。

459.(B型题)210慢性肾小球肾炎普通型的特点是

- A.中度蛋白尿
- B.贫血及高脂血症
- C.中度以上舒张压升高
- D.全身高度水肿,血脂增高
- E.肾衰竭

答案:A

解析:慢性肾小球肾炎分为五型。其中普通型较为常见,病程迁延,病情相对稳定,多表现为轻度至中度的水肿、高血压和肾功能损害,尿蛋白(+~+++),离心尿红细胞>10个/高倍视野和管型尿等。而肾病型除具有普通型的表现外,主要表现为肾病综合征,24h尿蛋白定量>3.5g,血清白蛋白低于30g/L,水肿一般较重和伴有或不伴高脂血症。B是肾病综合征的特点。C是高血压型的特点。E是急性发作型的特点。故210题选A, 211题选D。

460.(B型题)213对确诊泌尿系感染最有意义的检查是

- A.24小时尿蛋白定量
- B.尿培养及菌落计数
- C.肾功能检查
- D.摄腹部平片
- E.静脉肾盂造影

答案:B

解析:肾病综合征诊断要点为①大量蛋白尿>3+, 24h尿蛋白定量>3.5g;②血浆白蛋白≤30g/L;③血脂升高;④浮肿可轻可重。以上①②为必具条件,因此对尿蛋白的定量是最有意义的。而诊断泌尿系感染,取清洁中段尿行细菌培养、菌落计数及药物敏感度测定,革兰阴性杆菌菌落计数≥10万/ml者有诊断意义。故212题选A, 213题选B。

461.(B型题)216再生障碍性贫血的中医病位是

- A.心、肝
- B.心、脾
- C.骨髓
- D.心、肝、脾、肾
- E.肺、心、脾、肾

答案:C

解析:再障属于中医“虚劳”、“髓劳”、“髓枯”范畴。病变部位在骨髓,与肾脏的关系密切。其病机主要为热入营血、脾虚失摄、脾肾阳虚和肝肾阴虚。故216题选C, 217题选D。

462.(B型题)218治疗再生障碍性贫血,应首选

- A.马利兰
- B.康力龙
- C.泼尼松
- D.硫酸亚铁
- E.叶酸

答案:B

解析:治疗再生障碍性贫血常选用免疫抑制剂及促造血治疗,前者主要药物有抗淋巴细胞球蛋白及环孢素等,后者包括雄激素(康力龙、安雄等)及造血生长因子、造血干细胞移植。而治疗慢性粒细胞白血病常用的方法有化学治疗(羟基脲、马利兰、靛玉红等)、干扰素 α 、甲磺酸伊马替尼、异基因造血干细胞移植等。C用于血小板减少性紫癜、粒细胞减少症、急性淋巴性白血病。D多用于缺铁性贫血。E用于巨幼细胞贫血。故218题选B, 219题选A。

463.(B型题)220慢性粒细胞性白血病阴血亏虚证的治法是

- A.补气养血
- B.滋阴补血
- C.补肾助阳
- D.滋阴降火
- E.活血化瘀

答案:B

解析:慢性粒细胞阴血亏虚证治以滋阴补血,瘀血内阻证治以活血化瘀。A用于气血两虚证。C用于肾阳亏虚证。D用于阴虚火旺证。故220题选B, 221题选E。

464.(B型题)222抗血小板抗体增加,见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.慢性粒细胞白血病

答案:A

解析:抗血小板抗体增加常见于原发性血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、败血症、高 γ 球蛋白血症、肝病、母婴血小板不合等。造血原料缺乏常见于缺铁性贫血。故222题选A, 223题选C。

465.(B型题)224外周血血小板明显减少,骨髓巨核细胞增多,见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血

D.溶血性贫血

E.急性白血病

答案:A

解析:特发性血小板减少性紫癜血象表现为急性型发病时血小板计数可明显减少,常低于 $20 \times 10^9/L$;慢性血小板计数一般在 $50 \times 10^9/L$ 左右。骨髓象表现为急性型骨髓巨核细胞正常或增多,幼稚型巨核细胞比例增多,体积小,无血小板形成;慢性型骨髓巨核细胞增多,以颗粒型巨核细胞增多为主,体积正常,血小板形成减少。急性白血病血象表现为贫血一般呈正细胞正色素型,网织红细胞计数减少,也有轻度增高者。血小板计数大多降低,白细胞一般早期常偏低。骨髓象表现为有核细胞增生明显或轻度活跃,具有决定性诊断价值。故224题选A,225题选E。

466.(B型题)226治疗糖尿病阴虚热盛证,应首选

A.消渴方合玉女煎

B.生脉散合六味地黄丸

C.金匱肾气丸

D.桃红四物汤

E.生脉散合参附汤

答案:A

解析:糖尿病阴虚热盛证治以清热生津止渴,方用消渴方合玉女煎。气阴两虚证治以补气滋阴,方用生脉散合六味地黄丸。C用于阴阳两虚证。D用于气滞血瘀证。E用于阴阳衰微证。故226题选A,227题选B。

467.(B型题)229糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者,治疗应首选

A.六味地黄丸

B.杞菊地黄丸

C.六味地黄丸合生脉散

D.知柏地黄丸

E.金匱肾气丸

答案:B

解析:糖尿病气阴两虚证治以益气养阴,方用六味地黄汤合生脉散。糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者,因其主要病机为肝肾精血不足,不能上承耳目所致,宜滋补肝肾、益精补血,方用杞菊地黄丸加减。故228题选C,229题选B。

468.(B型题)232脑CT示基底节区低密度影,周围有水肿带,视神经乳头水肿者,治疗应首选

A.甘露醇

B.低分子右旋糖酐

C.川芎嗪

D.阿司匹林

E.肝素

答案:A

解析:脑CT显示基底节区低密度影及周围有水肿带,视神经乳头水肿提示脑梗死,并有颅内压增高的表现。故治以降低颅内压,选用甘露醇。而脑血栓形成急性

期的血液稀释法, 选用低分子右旋糖酐, 可以扩充血容量, 降低血液黏滞性, 改善微循环。C有抗血小板聚集作用, 可用于脑血栓形成, 但不属于血液稀释疗法。D对血小板聚集有抑制作用, 阻止血栓形成, 临床常用于预防暂时性脑缺血发作。E有较强抗凝血作用, 对无出血倾向者, 可采用此法。故232题选A, 233题选B。

469.(A1型题)4下列损伤按致伤因素分类, 错误的是

- A.机械性
- B.物理性
- C.化学性
- D.车祸性
- E.生物性

答案:D

解析:损伤按致伤因素分类可分为机械性、物理性、化学性、生物性四类。故本题选D。

470.(A1型题)9下列各项, 适用“托法”的是

- A.外疡中期, 正虚毒盛
- B.初期肿疡
- C.溃疡后期, 疮口难敛
- D.肿疡疮形已成
- E.蜂窝织炎破溃

答案:A

解析:尚未成脓的初期肿疡宜用消法。外疡中期适用托法。溃疡后期元气虚弱, 新肌不生, 疮口不敛者适用补法。故本题选A。

471.(A1型题)14手术敷料高压蒸气灭菌的要求是

- A.121°C, 20分钟
- B.121°C~126°C, 20分钟
- C.121°C~126°C, 30分钟
- D.130°C, 10分钟
- E.130°C, 20分钟

答案:C

解析:高压蒸气灭菌的要求是温度提高到121°C~126°C, 持续30分钟。故本题选C。

472.(A1型题)19外生殖器部位的皮肤消毒, 应采取

- A.2.5%碘酊擦涂
- B.0.75%碘酊擦涂
- C.0.1%洗必泰酊擦涂2次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂1次
- E.70%酒精擦涂

答案:C

解析:对婴儿、面部皮肤、口腔、肛门、外生殖器等不能用碘酊消毒处,应选用刺激性小的消毒剂,如0.75%吡咯烷酮碘、2%红汞、0.1%洗必泰或0.1%新洁尔灭溶液涂擦2次。70%酒精多用于植皮时供皮区的消毒。故本题选C。

473.(A1型题)24低钾血症的血清钾浓度,低于

- A.3.5mmol/L
- B.4mmol/L
- C.4.5mmol/L
- D.5mmol/L
- E.5.5mmol/L

答案:A

解析:血清钾正常值为3.5~5.5mmol/L, <3.5mmol/L为低钾血症, >5.5mmol/L为高钾血症。故本题选A。

474.(A1型题)28下列哪项不是输血的适应证

- A.严重感染
- B.大面积烧伤
- C.心力衰竭
- D.凝血功能异常
- E.低蛋白血症

答案:C

解析:输血的适应证包括急性出血、贫血或低蛋白血症、凝血机制异常和出血性疾病、重症感染、器官移植。故本题选C。

475.(A1型题)31白血症引起的休克,属于

- A.创伤性休克
- B.失血性休克
- C.过敏性休克
- D.感染性休克
- E.心源性休克

答案:D

解析:白血病患者常伴粒细胞减少,特别在化疗、放疗后粒缺将持续相当长时间,故易致感染性休克。创伤性休克常见病因有严重烧伤、骨折、内脏损伤、软组织挤压伤。失血性休克常见病因有上消化道出血、宫外孕破裂出血、动脉瘤破裂以及肝、脾和大动脉破裂出血。过敏性休克多发生于对青霉素、普鲁卡因、血清制剂和疫苗过敏者。心源性休克常见于大面积心肌梗死、室壁瘤形成、严重心律不齐、急性心肌炎和心包填塞。故本题选D。

476.(A2型题)69感染性休克患者,症见:高热,神昏谵语,唇干烦渴,小便短赤,舌红绛,苔黄燥,脉细数无力。其证型是

- A.热厥
- B.寒厥
- C.血脱
- D.气脱

E.气逆

答案:A

解析:热厥证表现为烦躁不安,汗出咽干,口渴欲饮,尿少或无尿,舌红少津,脉细无力。寒厥证表现为精神萎靡,反应迟钝,大汗淋漓,身冷畏寒,口淡不渴,心悸胸闷,四肢厥冷,尿少或无尿,舌淡苔白,脉微欲绝。血脱证表现为大汗淋漓,烦躁不安,口燥咽干,皮干,静脉萎陷,尿少或无尿,舌质红而干,脉微细数。气脱证表现为神志模糊,语声低微,冷汗不出,身凉畏冷,四肢不温,尿少或无尿,舌质淡白或淡暗,脉微欲绝。气逆证表现为面色灰白,精神恍惚或神昏,汗出身冷,口燥咽干,肌肤干皱,四肢厥冷,尿少或无尿,舌淡光滑无苔,脉微欲绝。故本题选A。

477.(A2型题)71患者,72岁。烧伤1周后,神识淡漠,面色苍白,呼吸急促,口唇淡紫,体温36.5℃,四肢厥冷,脉细缓。其证型是

- A.气阴两伤
- B.阴损及阳
- C.胃阴伤败
- D.气血两亏
- E.热入营血

答案:B

解析:阴损及阳证表现为面色苍白,呼吸气微,表情淡漠,自汗肢冷,体温不升反降,脉细缓。气阴两伤证表现为精神疲倦,气短懒言,口干喜饮,自汗,盗汗,舌淡苔少,脉细弱。胃阴伤败证表现为面色萎黄,纳呆食少,腹胀便溏,口干少津或口舌生糜,舌干红,苔花剥或无苔,脉细数。气血两亏证表现为神疲倦卧,气短懒言,形体消瘦,面色无华,创面愈合迟缓,舌淡,苔薄白或薄黄,脉细弱。热入营血证表现为壮热躁动,口干唇燥,大便秘结,小便短赤,舌红绛而干,苔黄或黄糙或焦干起刺,脉洪数。故本题选B。

478.(A2型题)74患者,男,20岁。初起颜面部红肿热痛,肿势局限,可见一个脓头,3~5日化脓,出脓即愈。应首先考虑的是

- A.疔
- B.痈
- C.急性淋巴管炎
- D.急性淋巴结炎
- E.痤疮

答案:A

解析:疔的局部症状为初起有红、肿、热、痛的小结节,逐渐肿大,数天后脓栓脱落,脓液排出,炎症随之消退而愈。痈早期在局部呈片状稍隆起的紫红色浸润区,随后中央形成多个脓栓,破溃后呈蜂窝眼状,相当于中医的有头疽。急性淋巴管炎浅部见一条或数条“红线”,硬且明显压痛,深部肢体明显肿胀和压痛,淋巴管走行部位压痛更明显。急性淋巴结炎早期有局部淋巴结肿大和压痛,后局部红肿热痛加剧。痤疮初为坚实丘疹,挤之有白色粉样物质,反复挤压形成大小不等的结节,病程较长。故本题选A。

479.(A2型题)77患者,男,41岁。头面丹毒,红肿,恶寒发热,口渴,便秘溲黄,舌红苔黄,脉洪数。其证型是

- A.风热化火
- B.气血两燔
- C.湿热化火
- D.热毒蕴结
- E.热毒入营

答案:A

解析:丹毒风热化火证发于头面部,发热恶寒,口干舌燥,舌红,苔薄黄,脉洪数。故本题选A。

480.(A2型题)79患者,男,34岁。左腰背浅表肿物约拇指头大小,外观圆形,表面光滑,边界清楚,与皮肤粘连,基底无粘连。其诊断是

- A.皮样囊肿
- B.表皮囊肿
- C.皮脂腺囊肿
- D.腱鞘囊肿
- E.纤维瘤

答案:C

解析:皮脂腺囊肿圆形,界清,与皮肤粘连,与基底不粘连。皮样囊肿圆形,界清,与皮肤不粘连,与基底粘连。表皮囊肿圆形,与基底不粘连,可与皮肤粘连。腱鞘囊肿界限不清,有肿胀和疼痛、压痛。纤维腺瘤圆形,界清,无粘连,活动性大。故本题选C。

481.(A2型题)82患者,男,45岁。脘腹胀痛,呕吐,停止排便排气60小时。检查:神情淡漠,末梢循环差,腹胀如鼓,全腹压痛、反跳痛及肌紧张,肠鸣音微弱,舌红绛苔黄腻,脉沉细数。应首先考虑的是

- A.肠梗阻瘀结证
- B.肠梗阻疽结证
- C.肠梗阻痞结证
- D.阑尾炎瘀滞证
- E.阑尾炎湿热证

答案:A

解析:肠梗阻症状主要为腹痛、呕吐、腹胀、停止排便排气,其中瘀结证表现为腹痛、腹胀、呕吐、无排气排便,舌红绛苔黄腻,脉沉细数。故本题选A。

482.(A2型题)84患者,男,32岁。酗酒后突感左上腹剧痛,并向左腰部放射,伴发热,恶心呕吐。查体:腹平软,左上腹呈束带式压痛,肝、脾不大。应首先考虑的是

- A.现为右上腹阵发性绞痛。C伴腹泻。D腹部无压痛,查心电图及心肌酶谱等可鉴别。E为中上腹持续性剧痛,与酗酒无关。
- B.急性胰腺炎
- C.急性肠炎
- D.心肌梗死
- E.急性胃炎

答案:B

解析:急性胰腺炎腹痛剧烈,起始于中上腹,也可偏重于右上腹或左上腹,放射至背部,累及全胰则呈腰带状向腰背部放射痛,伴恶心、呕吐、腹胀,可有发热、腹膜炎体征、黄疸等。

483.(A2型题)87患者,女,26岁。左侧急性乳腺炎7天,现左乳房红肿,疼痛剧烈,呈持续性搏动性疼痛,伴高热,口渴喜饮,舌苔黄,脉弦数。其治法是

- A.疏肝清胃,通乳散结
- B.清热解毒,通乳透脓
- C.疏肝理气,化痰软坚
- D.调理气血,通乳散结
- E.行气活血,软坚散结

答案:B

解析:此为急性乳腺炎热毒炽盛证,且乳房里脓肿已成,治法应清热解毒,通乳透脓。故本题选B。

484.(A2型题)89患者,女,25岁。左乳内肿块,呈卵圆形,质地坚韧,表面光滑,活动度大,无压痛。应首先考虑的是

- A.乳房结核
- B.乳腺增生病
- C.乳腺纤维腺瘤
- D.乳癌
- E.乳腺导管扩张症

答案:C

解析:乳腺纤维腺瘤肿块较硬,边界清楚,表面光滑,活动度好,无压痛。乳房结核肿块质硬,边界不清,往往和皮肤有粘连。乳腺增生病肿块边界不清,质韧,推之可移,有压痛。乳腺癌肿块质硬,活动性差,边界不清。乳腺导管扩张症乳头、乳晕及其附近可有小结节,乳头有溢液。故本题选C。

485.(A2型题)92患者,女,58岁。右乳房发现肿块2个月。查体:右乳头抬高,乳头凹陷,右乳外上象限可扪及一个2cm×2.5cm大小肿块,质硬,表面不平,边界不清,活动度差。应首先考虑的是

- A.乳腺纤维腺瘤
- B.乳腺囊性增生病
- C.乳腺癌
- D.乳房结核
- E.乳腺导管扩张症

答案:C

解析:乳腺癌包块质硬,表面不光滑,边界不清,活动度差,无压痛,局部皮肤可有酒窝征,橘皮样改变,乳头可内陷、溢液。余参见89题。故本题选C。

486.(A2型题)94患者,男,27岁。患右腹股沟斜疝2个月,今早剧烈运动后,肿块不能回纳,伴腹痛,呕吐,腹胀。应首先考虑的是

- A.难复性疝

- B.滑动性疝
- C.嵌顿性疝
- D.可复性疝
- E.肠管壁疝

答案:C

解析:腹内压突然增高时,疝内容物可强行进入疝囊,囊颈将内容物卡住,使其不能回纳,称为嵌顿性疝,如其内容物为肠管,可使肠壁淤血和水肿,出现消化道症状。难复性疝其内容物反复突出,致囊颈损伤并产生粘连,使内容物不能完全回纳。滑动性疝属难复性疝,其内容物不能完全回纳。可复性疝在站立、行走、劳动或腹内压骤增时突出,在平卧、休息或用手推送时可回纳。肠壁管疝嵌顿的内容物仅为部分肠壁。故本题选C。

487.(A2型题)97患者,男,66岁。有膀胱结石史。现小便淋漓,夜尿频多,间有尿痛,腰膝酸软,舌尖红苔微黄,脉虚数。其证型是

- A.肾阴虚
- B.肾虚有热
- C.膀胱湿热
- D.肾气虚
- E.瘀阻水道

答案:B

解析:小便淋漓,夜尿频多,腰膝酸软是肾虚的表现,舌尖红苔微黄,脉数为热象。故本题选B。

488.(A2型题)100患者,男,35岁。尿频,尿道灼痛,会阴部隐痛1周。前列腺液镜检:白细胞增多,卵磷脂小体减少。应首先考虑的中医诊断是

- A.精癯
- B.子痛
- C.子痰
- D.水疝
- E.精浊

答案:E

解析:患者出现尿频,尿道灼痛,会阴部隐痛,前列腺液镜检:白细胞增多,卵磷脂小体减少,这些症状符合慢性前列腺炎的诊断要点。慢性前列腺炎中医称为精浊。而B是指睾丸及附睾的感染性疾病。故本题选E。

489.(A2型题)102前列腺增生症患者,小便点滴不尽,小腹胀满疼痛,舌质紫暗,脉涩。治疗应首选

- A.五神汤加减
- B.枸橼汤加减
- C.抵挡丸
- D.龙胆泻肝汤
- E.知柏地黄丸

答案:C

解析:此属前列腺增生血瘀证,法应活血化瘀止痛,选用抵挡丸。故本题选C。

490.(A2型题)104患者便血,色鲜红,伴有肿物脱出肛外,便后可自行复位。应首先考虑的是

- A.肛裂
- B.一期内痔
- C.二期内痔
- D.三期内痔
- E.直肠息肉

答案:C

解析:I期内痔便秘时粪便带血或滴血,无痔核脱出,II期内痔为无痛性便血,便秘时痔核能脱出肛外,便后能自行还纳,III期内痔便血少或无便血,便秘时痔核常脱出肛外,不能自行还纳。故本题选C。肛裂便血鲜红,肛门疼痛剧烈,无脱出肛外肿物。直肠息肉以便血、肿物脱出为主,便后不可自行复位。

491.(B型题)108内托法的代表方是

- A.荆防败毒散
- B.托里消毒散
- C.五味消毒饮
- D.龙胆泻肝汤
- E.香贝养营汤

答案:B

解析:托里消毒散是益气托毒法代表方,用于肿疡毒势方盛,正气已虚,不能托毒外出。五味消毒饮是清热解毒法的代表方,用于热毒之证。A是解表法中辛温解表法的代表方。D是理湿法之清热利湿法的代表方。E是祛痰法之养营化痰法的代表方。故108题选B,109题选C。

492.(B型题)110将各种不同的药物浸泡于乙醇溶液中取其药液,即为

- A.油膏
- B.箍围药
- C.草药
- D.酊剂
- E.消毒剂

答案:D

解析:A是指将药物和油类煎熬或调匀成膏的制剂。B是指将具有箍集围聚,收束疮毒作用的粉剂用液体、蜜或饴糖等调成糊状敷疮上。D是将各种不同的药物浸泡于乙醇溶液中取其药液。故110题选D,111题选B。

493.(B型题)113皮肤消毒,应首选

- A.甲醛
- B.石炭酸
- C.0.1%新洁尔灭
- D.0.5%亚硝酸钠
- E.2.5%碘酊

答案:E

解析:口腔黏膜消毒应选用0.1%新洁尔灭,皮肤消毒一般选用2.5%碘酊。故112题选C,113题选E。

494.(B型题)115椎管内麻醉由于某种原因引起脑脊液压力过低,可致

- A.血压下降
- B.呼吸抑制
- C.恶心呕吐
- D.头痛
- E.尿潴留

答案:D

解析:血压下降常发生于麻醉范围过广或高部位阻滞。呼吸抑制多见于高位硬膜外阻滞。恶心呕吐常由于血压骤降或手术牵拉内脏引起。头痛与脑脊液由针眼不断外渗到硬膜外腔有关,是椎管内麻醉的常见术后并发症。尿潴留是因支配膀胱排尿功能的神经恢复最慢或伤口致膀胱括约肌反射性痉挛。故114题选A,115题选D。

495.(B型题)117在短时间内输入所需血量者,适用于

- A.大出血
- B.中度缺水
- C.纠正贫血和低蛋白血症
- D.严重感染
- E.凝血异常

答案:A

解析:单纯贫血者应输红细胞混悬液,合并低蛋白血症者宜用全血,输血量取决于红细胞丢失的程度。急性大量失血患者应迅速恢复血容量并输红细胞。凝血异常除输新鲜血外,更重要还要输有关的凝血因子。严重感染要替换血液中的有害物质。故116题选C,117题选A。

496.(B型题)120治疗骨折初期,外用药应首选

- A.消瘀止痛膏
- B.阳和解凝膏
- C.金不换膏
- D.驳骨散
- E.玉露散

答案:D

解析:驳骨散可接骨续筋,用于骨折初期。金不换膏可舒筋活络,可用于骨折后期。故120题选D,121题选C。

497.(B型题)122烧伤患者,高热灼手,汗多气粗,口渴头痛,烦躁不安,舌红绛苔黄,脉洪数。其证型是

- A.火热伤津
- B.气阴两伤
- C.阴损及阳
- D.气营两燔

E.热入营血

答案:E

解析:热入营血证表现为壮热躁动,口干唇燥,大便秘结,小便短赤,舌红绛而干,苔黄或黄糙或焦干起刺,脉洪数。火热伤津证候表现为壮热,口干唇燥,口渴喜饮,大便秘结,小便短赤,舌红而干,苔黄少津,脉细数。故122题选E,123题选A。

498.(B型题)125西医学的颈部急性淋巴结炎,相当于中医学的

A.蛇眼疔

B.红丝疔

C.颈痈

D.有头疽

E.烂疔

答案:C

解析:急性淋巴结炎相当于中医学的外痈,长于颈部的外痈称为颈痈。蛇眼疔相当于西医学的甲沟炎。红丝疔相当于西医学的急性淋巴管炎。西医学的痈中医学称为有头疽。烂疔相当于西医学的气性坏疽。故126题选D,127题选C。

499.(B型题)128中医学的附骨疽,相当于西医学的

A.败血症

B.痈

C.急性化脓性骨髓炎

D.手指化脓性感染

E.气性坏疽

答案:C

解析:化脓性骨髓炎相当于中医学的附骨疽。败血症属于全身性感染,全身性感染相当于中医学的走黄。痈相当于中医学的有头疽。手指化脓性感染相当于西医学的蛇头疔。气性坏疽相当于中医学的烂疔。故128题选C,129题选A。

500.(B型题)130来自间叶组织的恶性肿瘤,称为

A.癌

B.瘤

C.肉瘤

D.临界瘤

E.纤维瘤

答案:C

解析:肉瘤是来自于间叶组织的恶性肿瘤。癌是来自上皮组织的恶性肿瘤。瘤是来自于上皮组织的良性肿瘤。介于良性与恶性肿瘤间的过渡性肿瘤称为临界瘤。纤维瘤是良性肿瘤。故130题选C,131题选A。

501.(B型题)132急性阑尾炎瘀滞证,转移性右下腹痛,脘腹胀闷,大便秘结,舌淡红苔薄白,脉弦紧。治疗以通里攻下为主,还应

A.行气祛瘀,佐以清热解毒

B.活血祛瘀,佐以清热利湿

- C.清热利湿, 佐以行气活血
- D.清热解毒, 佐以行气凉血
- E.行气凉血, 佐以利湿消肿

答案:A

解析:急性阑尾炎瘀滞证治法以行气活血, 通腑泻热为主, 脘腹胀闷, 大便秘结为胃肠热毒积聚, 故应佐以清热解毒。急性阑尾炎湿热证治法以通腑泻热, 利湿解毒为主, 同时为防湿热致气血瘀滞, 故佐以行气活血。故132题选A, 133题选C。

502.(B型题)135最易嵌顿的疝, 是指

- A.腹股沟斜疝
- B.腹股沟直疝
- C.股疝
- D.肠梗阻
- E.睾丸鞘膜积液

答案:A

解析:腹股沟斜疝肿块常在站立、行走、咳嗽或劳动时出现, 多呈带蒂柄的梨形, 并可降至阴囊或大阴唇, 平卧时肿块可向腹腔回纳而消失。腹股沟直疝当病人直立时, 在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿物, 平卧时可消失。嵌顿性疝通常发生在斜疝, 强劳力或排便等腹内压骤增是其主要原因, 临床上表现为疝块突然增大, 并伴有明显疼痛, 平卧或用手推送不能使肿物回纳, 肿物紧张发硬, 且明显触痛。故134题选A, 135题选A。

503.(B型题)137患者左输尿管结石, 停留日久不移, 外形不整, 腰部胀痛, 舌有瘀点, 脉沉涩。其治法是

- A.滋阴清热, 通淋排石
- B.行气利水, 通淋排石
- C.清热利湿, 消石通淋
- D.理气祛瘀, 软坚排石
- E.健脾益气, 通淋排石

答案:D

解析:肾结石患者证属脾虚气滞, 治法应为健脾益气, 通淋排石。输尿管结石患者证属气滞血瘀, 法应理气祛瘀, 软坚排石。故136题选E, 137题选D。

504.(A1型题)1女性外阴发生感染时, 最易形成炎症及脓肿的部位是

- A.大阴唇
- B.小阴唇
- C.前庭大腺
- D.阴道前庭
- E.处女膜

答案:C

解析:前庭大腺位于阴道口的两侧, 大阴唇的后部, 腺管开口与前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 此处容易细菌滋生和存活, 所以一旦女性外阴发生感染时, 细菌容易侵犯腺体导致其形成炎症及脓肿。故本题选C。

505.(A1型题)5下列关于子宫的叙述,错误的是

- A.位于盆腔中央
- B.宫腔呈上窄下宽的三角形
- C.主月经
- D.主孕育胎儿
- E.形态似腑,功能似脏

答案:B

解析:子宫正常位置于盆腔中央,位于直肠之前、膀胱之后,下接阴道,呈倒置的梨形,前面扁平,后面稍凸出、前倾前屈位。它形态似腑,功能似脏,主月经,主孕育胎儿,主分娩。故本题选B。

506.(A1型题)8下列各项,不属女性生殖器内藏部分的是

- A.子宫
- B.卵巢
- C.前庭大腺
- D.输卵管
- E.附件

答案:C

解析:女性生殖器内藏部分包括胞宫及子门。其中胞宫包括解剖学的子宫、卵巢、输卵管。后两者有称为附件。故本题选C。

507.(A1型题)11使子宫内膜由增殖期变为分泌期的激素是

- A.雌激素
- B.促性腺激素释放激素(GnRH)
- C.促卵泡素(FSH)
- D.孕激素
- E.黄体生成素(LH)

答案:D

解析:孕激素能使子宫内膜由增殖期变为分泌期。故本题选D。

508.(A1型题)14若卵子排出后未受精,黄体开始萎缩的时间,是在排卵后的

- A.4~5天
- B.7~8天
- C.9~10天
- D.11~12天
- E.13~14天

答案:C

解析:黄体开始萎缩的时间,是在排卵后的9~10天。故本题选C。

509.(A1型题)16中医学的“居经”是指

- A.月经1月两行
- B.月经2月一行
- C.月经3月一行
- D.终身不来月经而能受孕

E.受孕之初,仍按月少行经

答案:C

解析:参见15题。故本题选C。

510.(A1型题)20下列产褥期的临床表现,正确的是

A.产后第一日,子宫底稍下降

B.产后初期,产妇脉搏增快

C.产后1~2天可发生“泌乳热”

D.产后宫缩痛多见于经产妇

E.恶露通常持续1~2周

答案:D

解析:产后宫缩痛多见于经产妇。A产后第一日因子宫颈外口升至坐骨棘水平,致使宫底稍上升。B产后脉搏略缓慢,可能与子宫胎盘循环停止及卧床休息有关。C产后3~4天可出现泌乳热。E产褥期恶露通常可持续4~6周。故本题选D。

511.(A1型题)23下列哪项不是妇科的常用治法

A.滋肾补肾

B.疏肝养肝

C.健脾和胃

D.滋肺养心

E.清热解毒

答案:D

解析:妇产科的常用内治法包括:滋肾补肾、疏肝养肝、健脾和胃、调理气血、清热解毒、利湿除痰、调理奇经。故本题选D。

512.(A1型题)26下列各项,属妊娠剧吐肝胃不和证主要症状的是

A.呕吐血性分泌物

B.呕吐清水

C.呕吐痰涎

D.呕吐食物残渣

E.呕吐酸水或苦水

答案:E

解析:妊娠剧吐肝胃不和证主要呕吐酸水或苦水。A为气阴两虚证的表现。B为脾胃虚弱证的表现。C为痰湿阻滞证。D不见于妊娠呕吐。故本题选E。

513.(A1型题)30中医学认为,异位妊娠最主要的病因病机是

A.冲任虚弱

B.肾气不足

C.寒凝气滞

D.痰湿阻胞

E.少腹血瘀

答案:E

解析:中医认为本病的病因病机:一因虚,主要是脾肾气虚,不能把孕卵及时送达胞宫;二因阻,孕卵受到阻滞,不能送达胞宫。由于孕卵未能移行至胞宫,而居于

胞脉，久而胞脉破损，血溢妄行，离经之血淤积少腹，气机阻滞，不通则痛，形成少腹血瘀证。最主要的病因病机为少腹血瘀。故本题选E。

514.(A1型题)35白术散适用于妊娠高血压综合症的哪种证型

- A.脾虚湿盛
- B.肾虚水泛
- C.气滞湿阻
- D.脾虚肝旺
- E.阴虚肝旺

答案:A

解析:参见32题。故本题选A。

515.(A1型题)39产后发热感染邪毒证，若实热瘀血内结阳明者，治疗应首选

- A.青霉素加五味消毒饮合失笑散
- B.青霉素加白虎加人参汤
- C.青霉素加大黄牡丹皮汤
- D.庆大霉素加清营汤送服紫雪丹
- E.庆大霉素加清营汤送服安宫牛黄丸

答案:C

解析:产后发热感染邪毒证，若实热瘀血内结阳明者，治疗宜用青霉素加大黄牡丹皮汤。故本题选C。

516.(A1型题)44治疗霉菌性阴道炎，应首选

- A.柏己片塞药加3%小苏打液冲洗
- B.制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗
- C.灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗
- D.柏己片塞药加1%乳酸液冲洗
- E.灭滴灵塞药加3%小苏打液冲洗

答案:B

解析:治疗念珠菌阴道炎宜首选制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗。故本题选B。

517.(A1型题)49下列哪项不是无排卵型功能失调性子宫出血的特征

- A.月经周期紊乱
- B.经期长短不一，反复不净
- C.经量或多或少如注，或少而淋漓
- D.基础体温呈单相型
- E.宫内膜呈分泌期改变

答案:E

解析:①阴道流血，量多或时多时少；②月经周期紊乱、缩短或正常，经期长短不一；③妇检：子宫、附件无异常，基础体温呈单相型或黄体不健；④阴道脱落细胞涂片无排卵的周期性变化；⑤宫颈黏液结晶呈羊齿状或不典型；⑥经前或以期子宫内膜检查可见不同程度的增生期变化，无分泌期改变。故本题选E。

518.(A1型题)54治疗无排卵型功能失调性子宫出血肾阴虚证，应首选

- A.四物汤合二至丸
- B.左归丸合二至丸
- C.右归丸合二至丸
- D.保阴煎合失笑散
- E.两地汤合失笑散

答案:B

解析:无排卵型功血肾阴虚证治宜滋肾益阴,固冲止血,方选左归丸合二至丸。A用于血虚证。C用于肾阳虚证。D、E用于阴虚血瘀证。故本题选B。

519.(A1型题)59治疗因口服避孕药所致月经不调肾阳虚证,应首选

- A.失笑散合四物汤
- B.左归丸合二至丸
- C.右归丸合二至丸
- D.保阴煎合失笑散
- E.举元煎合失笑散

答案:C

解析:月经不调肾阳虚证,方选右归丸合二至丸滋肾益阴,固冲止血。故本题选C。

520.(A1型题)64治疗闭经气血虚弱证,应首选

- A.黄体酮加一阴煎
- B.西药人工周期加启宫丸
- C.人参养荣汤
- D.举元煎
- E.圣愈汤

答案:C

解析:治疗闭经气血虚弱证宜选用人参养荣汤益气养血调经。故本题选C。

521.(A1型题)70治疗痛经寒湿凝滞型,应首选

- A.桃红消瘀汤
- B.桃红四物汤
- C.膈下逐瘀汤
- D.血府逐瘀汤
- E.少腹逐瘀汤

答案:E

解析:痛经寒湿凝滞证治宜温经散寒,化瘀止痛。方选少腹逐瘀汤。故本题选E。

522.(A1型题)75较大的多发性子宫肌瘤伴月经过多及贫血患者,无生育要求者,应首选的治疗措施是

- A.子宫肌瘤摘除术
- B.子宫全切术
- C.雄激素加桂枝茯苓丸
- D.孕激素加桂枝茯苓丸
- E.纠正贫血加桂枝茯苓丸

答案:B

解析:较大的多发性子宫肌瘤伴月经过多及贫血患者,无生育要求者,应首选子宫全切术伴纠正贫血治疗。故本题选B。

523.(A1型题)78下列各项,不属于子宫肌瘤中医常见证型的是

- A. 气血虚弱
- B. 气滞血瘀
- C. 阴虚内热
- D. 痰湿瘀阻
- E. 寒湿凝滞

答案:A

解析:子宫肌瘤中医常见证型包括气滞血瘀、阴虚内热、痰湿瘀阻、寒湿凝滞、湿热夹瘀。故本题选A。

524.(A1型题)82治疗轻度子宫脱垂肾虚型,应首选

- A. 刮宫术加抗生素
- B. 子宫托加大补元煎
- C. 刮宫术加补中益气汤
- D. 宫缩剂加抗生素
- E. 子宫托加补中益气汤

答案:B

解析:治疗肾虚型轻度子宫脱垂西医使用子宫托,中药方剂选用大补元煎。故本题选B。

525.(A1型题)85子宫穿孔的表现是恶心、呕吐、冷汗,并伴有

- A. 血压下降,心律不齐,心跳过缓
- B. 血压下降,心跳加快
- C. 腹部牵扯样剧痛,子宫压痛
- D. 阴道大出血
- E. 剧烈腹痛,腹部包块

答案:C

解析:子宫穿孔的临床表现:①宫腔手术过程中出现下腹突发性疼痛,腹部牵扯样剧痛。②下腹压痛、反跳痛。③如穿孔损伤大血管,短时间内即可有内出血的典型表现,并迅速发生休克,并且常伴有恶心、呕吐冷汗等症状。故本题选C。

526.(B型题)133患者停经3个月余,子宫如孕40天大小。应首先考虑的是

- A. 胎动不安
- B. 滑胎
- C. 完全流产
- D. 过期流产
- E. 感染性流产

答案:D

解析:过期流产即稽留流产,指胚胎或胎儿在宫内已死亡后仍未自然排出者。妊娠诊断肯定,曾有先兆流产症状或无,之后妊娠反应消失,妊娠试验转为阴性。

检查:子宫不再增大或反而减小,胎动消失,检查子宫较停经月份小,质地不软,子宫颈口闭。感染性流产主要发生于各类流产后,除流产的一般症状外,主要伴有高热寒战、腹痛等感染症状。故133题选D,134题选E。

527.(B型题)139治疗子宫肌瘤寒湿凝滞证,应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.参茜固经冲剂
- D.逐瘀止血汤
- E.清海丸

答案:A

解析:子宫肌瘤寒湿凝滞的治疗宜散寒除湿、活血消癥,方选桂枝茯苓丸。阴虚内热证的治疗宜滋阴清热,活血消癥,方选清海丸。故139题选A,140题选E。

528.(B型题)144疑诊子宫内膜脱落不全,选择诊断性刮宫的时间是

- A.月经来潮第6天
- B.月经来潮第5天
- C.月经来潮第3天
- D.月经来潮第2天
- E.月经来潮6小时内

答案:B

解析:对于不孕症或功能失调性子宫出血患者,应选在月经前或月经来潮后6小时内刮宫,以判断有无排卵或黄体功能不足。子宫内膜脱落不全的诊断:BBT高温期有少量子宫出血,BBT下降后子宫出血增多如月经量,并按时停止。子宫出血第5天子宫内膜活检仍有分泌相。故143题选E,144题选B。

529.(A1型题)1小儿从出生后到满1周岁之前,应属

- A.新生儿期
- B.幼儿期
- C.婴儿期
- D.学龄期
- E.学龄前期

答案:C

解析:小儿从出生后到满1周岁为婴儿期。A是指小儿从出生后脐带结扎开始,到生后满28天。B是指小儿1周岁到3周岁。D是指小儿七周岁到青春期来临。E是指小儿三周岁到七周岁。故本题选C。

530.(A1型题)6小儿体格发育最快的时期是

- A.婴儿期
- B.新生儿期
- C.学龄前期
- D.学龄期
- E.幼儿期

答案:A

解析:小儿体格发育最快的时期是婴儿期,初步适应了外界环境,生长迅速。B小儿适应能力及御邪能力较差,易出现疾患。C小儿发育稳步增长,智力发育日趋完善。D小儿发育仍稳步增长。E小儿体格增长较婴儿期缓慢。故本题选A。

531.(A1型题)10小儿感冒每易夹惊,中医学认为其原因是

- A.脾常不足
- B.肾常虚
- C.形气未充
- D.肝常有余
- E.肺常不足

答案:D

解析:小儿生理上心神怯弱、肝气未盛,病理上易感外邪,各种外邪均易从火化,而见火热伤肝引动肝风的症状。故本题选D。

532.(A1型题)14察指纹的适用年龄是

- A.5岁以内
- B.4~5岁
- C.4岁以内
- D.3~4岁
- E.3岁以内

答案:E

解析:察指纹是对3岁以内的小儿用以代替脉诊的一种辅助诊法,用以辨别婴幼儿疾病的病因、性质并估计预后等。故本题选E。

533.(A1型题)18新生儿病理性黄疸出现的时间是

- A.出生后24小时内
- B.出生后2~3天
- C.出生后1周
- D.出生后10天
- E.出生后28天

答案:A

解析:新生儿出生后24小时内即出现黄疸,3周后仍不消退,甚或持续加深或减退后复现,均为病理性黄疸。故本题选A。

534.(A1型题)22小儿上呼吸道感染的中医治疗,应以何法为主

- A.清法
- B.分利
- C.通腑
- D.解表
- E.宣肺

答案:E

解析:小儿上呼吸道感染常见咳嗽气急,故应以宣肺为主。故本题选E。

535.(A1型题)31下列哪项不是小儿急性肾炎的临床特征

- A.多数患儿都有血尿
- B.病程早期常有高血压
- C.部分病例可出现急性肾功能不全
- D.血压急剧升高时可出现高血压脑病
- E.浮肿为可凹性、上行性

答案:E

解析:小儿急性肾炎的临床特征有浮肿及尿量较少,浮肿为非凹陷性;血尿;高血压。并发症有高血压性脑病,严重循环充血,急性肾衰竭。血清总补体及C₃可一过性明显下降,6~8周可恢复。故本题选E。

536.(A1型题)35哮喘的病位在

- A.肺、脾、肾
- B.心、肝、肺
- C.心、肝、肾
- D.心、肺、脾
- E.肺、肝、肾

答案:A

解析:哮喘的病位主要在肺、脾、肾三脏。三脏功能不全,导致痰饮留伏,隐伏于肺窍,成为哮喘之宿根。故本题选A。

537.(A1型题)39治疗维生素D缺乏性佝偻病脾虚气弱型,应首选

- A.人参五味子汤
- B.养脏汤
- C.小建中汤
- D.大建中汤
- E.归脾汤

答案:E

解析:佝偻病脾虚气弱证应治以健脾益气,方用归脾汤。A用于久嗽脾虚。B用于寒热失调之痢疾。C用于中焦虚寒,肝脾不和证。D用于中阳衰弱,阴寒内盛之脘腹剧痛证。故本题选E。

538.(A1型题)43下列出疹性急性传染病中,哪项是在发热3~4天后,热退疹出

- A.风疹
- B.幼儿急疹
- C.猩红热
- D.麻疹
- E.水痘

答案:D

解析:在发热3~4天后,热退疹出的是麻疹。A通常于发热1~2天后出现皮疹,皮疹先从面颈部开始,在24小时蔓延到全身;B多在体温持续3~5天后骤退,热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹,压之退色;C皮疹于24小时左右迅速出现,最初见于腋下、颈部与腹股沟,1日内迅速蔓延至全身;E在发病24小时内出现皮疹,迅即变为米粒至豌豆大的圆形紧张水疱,周围明显红晕,有水疱的中央呈脐窝状。故本题选D。

539.(A1型题)47治疗小儿胆道蛔虫症,应首选的方剂是

- A.使君子散
- B.乌梅丸
- C.肥儿丸
- D.资生健脾丸
- E.驱蛔承气汤

答案:B

解析:治疗小儿胆道蛔虫症,首选的方剂是乌梅丸,可温脏安蛔,治疗蛔厥证。A用于一般的蛔虫症。C用于治疗疳积。D用于脾胃不和之疳积。E用于虫瘕证。故本题选B。

540.(A1型题)49一般心肺复苏的正确步骤是

- A.通畅气道,建立呼吸,循环支持,药物治疗
- B.建立呼吸,通畅气道,胸外心脏按压
- C.先口对口人工呼吸,再胸外心脏按压,心腔内注射药物
- D.先胸外按压恢复心跳,再口对口呼吸及药物治疗
- E.先心腔内注射药物恢复心跳,再进行口对口呼吸及胸外心脏按压

答案:A

解析:心肺复苏的一般步骤为通畅气道,建立呼吸,循环支持,药物治疗。故本题选A。

541.(A1型题)50下列哪项不是小儿厌食胃阴不足证的证候特征

- A.食少饮多
- B.皮肤欠润
- C.大便偏干
- D.面色不华
- E.舌红苔黄腻

答案:E

解析:厌食胃阴不足证表现为不思饮食,食少饮多,口舌干燥,皮肤欠润,形体偏瘦,小便短黄,大便干结,烦躁少寐,手足心热,舌红少津,苔少或花剥,脉细数。E为湿热证的表现。故本题选E。

542.(A1型题)52小儿急惊风的主要病位在

- A.心、肝
- B.心、脾
- C.心、肾
- D.肝、脾
- E.肝、肾

答案:A

解析:小儿急惊风主要因外感时邪、痰热积滞或暴受惊恐,蒙蔽心包,引动肝风而发病。故病位在心、肝,选A。

543.(A2型题)56患儿,女,10岁。因头晕心悸就诊,脉搏60次/分,重按始得。其脉象是

- A.浮数
- B.沉迟
- C.沉数
- D.浮迟
- E.常脉

答案:B

解析:10岁小儿的正常脉率为70~90次/分,故患儿脉率慢。而重按始得是沉脉的特点,故该患儿脉象是沉迟脉。A表现为脉率快,轻按应手。C表现为脉率快,重按始得。D表现为脉率慢,轻按应手。E表现为脉率正常,不浮不沉,不大不小,从容和缓,柔和有力。故本题选B。

544.(A2型题)59患儿,6个月。因腹泻长期使用广谱抗生素。症见:满口白屑,状如雪花,不易擦去。应首先考虑的是

- A.乳垢
- B.口糜
- C.疳积
- D.奶麻
- E.鹅口疮

答案:E

解析:患儿有长期使用抗生素史,可见满口白屑,状如雪花,不易擦去,首先考虑鹅口疮。A可用棉棒擦去,其下黏膜正常。B满口出现黄白色溃疡,色红疼痛。C以神萎、面黄肌瘦、毛发焦枯、肚大筋露、纳呆便溏为主要表现。D多发于哺乳期婴儿,以骤起高热,热退后肌肤出现玫瑰色细散皮疹为主要表现。故本题选E。

545.(A2型题)63患儿,1岁。腹泻2天,泻下急迫,大便如水注,有黏液及腥臭味,伴发热,烦躁口渴,肢体困倦,小便短赤,肛门灼热,发红。其证型是

- A.伤食
- B.风寒
- C.脾虚
- D.湿热
- E.脾肾阳虚

答案:D

解析:小儿湿热内盛,湿困脾阳,运化失职,湿盛而见泻下急迫,大便如注,伴有黏液及腥臭味。湿邪夹热而见发热,烦躁口渴,小便短赤,肛门灼热、发红。故可辨证为湿热。故本题选D。

546.(A2型题)65患儿,2岁。腹泻3天,大便稀薄,色淡多沫,臭气不甚,肠鸣腹痛,时伴发热,鼻塞流涕,轻咳,口不渴,舌苔白润,诊断为婴幼儿腹泻风寒泄泻证。治疗应首选

- A.荆防败毒散
- B.胃苓汤
- C.杏苏散

D.藿香正气散

E.保和丸

答案:D

解析:此患儿泄泻辨证为风寒证,治以疏风散寒、化湿和中,方用藿香正气散加减。A用于风寒犯肺。B用于脾虚湿胜泄泻。C用于外感风寒证。E用于伤食泻。故本题选D。

547.(A2型题)67患儿,男,3岁。腹泻2天,大便如蛋花汤样,泻下急迫,气味臭秽,食欲不振,发热烦躁,口渴,小便短黄,舌质红,苔黄腻,指纹紫。其证型是

A.伤食泻

B.寒湿泻

C.风寒泻

D.湿热泻

E.脾虚泻

答案:D

解析:湿热之邪,蕴结肠胃气机,下注大肠,传化失司,故泻下稀如水样,气味秽臭。热性急迫,湿热交蒸,壅遏胃肠气机,故泻下急迫,量多。湿热困脾胃,故纳差食少,神疲乏力。伴有外感,则有发热,热重于湿者,故口渴饮引。湿热在下,则小便短黄。故辨证为湿热泄泻。故本题选D。

548.(A2型题)69患儿,男,6岁。西医确诊为急性肾小球肾炎。病程第9日,症见肢体浮肿,尿少,咳嗽气急,喘息不得平卧,心悸,胸闷,口唇青紫,脉细无力。其证型是

A.水气上凌心肺

B.湿热内侵

C.邪陷厥阴

D.水毒内闭

E.风水相搏

答案:A

解析:肾小球肾炎水气上凌心肺证症见肢体浮肿,经久不退,尿量减少,咳嗽气急,心悸胸闷,口唇青紫,脉细无力。治以润肺逐水,温阳扶正。方选己椒藜黄丸。故本题选A。

549.(A2型题)72患儿,男,8岁。因四肢关节游走性疼痛2周而就诊,现症见:膝及肘关节红肿疼痛,局部灼热,呈游走性,伴发热恶风,汗出不解,口渴欲饮,小便黄赤,大便秘结,舌质红,苔黄厚腻,脉滑数。其首选方剂是

A.九味羌活汤

B.大秦苳汤

C.乌头汤

D.宣痹汤

E.独活寄生汤

答案:D

解析:患儿膝及肘关节红肿疼痛,局部灼热,呈游走性,故可初步诊断为风湿热。根据发热恶风,汗出不解,口渴欲饮,小便黄赤,大便秘结等表现可诊断其为湿热阻络型,治以清热利湿,祛风通络,方选宣痹汤。故本题选D。

550.(A2型题)76患儿,男,7岁。支气管哮喘急性发作。治疗应首选

- A.心得安(普萘洛尔)
- B.心得宁(普拉洛尔)
- C.心得乐(纳多洛尔)
- D.酚妥拉明
- E.异丙肾上腺素

答案:E

解析:支气管哮喘急性发作常用支气管舒张药(β_2 受体激动剂、茶碱类、抗胆碱药物)、抗炎药(糖皮质激素等)。E是 β_2 受体激动剂,能较快缓解支气管痉挛。A、B、C均属于 β 受体阻断剂,会加重哮喘;D属于 α 受体阻断剂,缓解支气管痉挛作用较弱。故本题选E。

551.(A2型题)79患儿,男,5个月,因多汗、易惊来诊。检查:精神、面色尚可,头发稀疏,有枕秃,前囟2cm×2cm,左顶部如按乒乓球感,血清钙2.25mmol/L(9mg/dl)。其诊断是

- A.佝偻病初期
- B.佝偻病激期
- C.佝偻病恢复期
- D.佝偻病后遗症期
- E.脑积水

答案:B

解析:维生素D缺乏性佝偻病分为四期:初期临床表现为神经兴奋性增高(烦躁,睡眠不安,易惊,夜啼,多汗等症,并可致枕部脱发而见枕秃)。激期临床表现为骨骼变化①头部:乒乓球感,方颅、臀形颅,囟门较大且闭合延迟,乳牙萌出迟;②胸部:肋软骨串珠状,郝氏沟,肋下缘外翻,鸡胸,漏斗胸;③四肢:“手镯”及“脚镯”,“O”型或“X”型腿,长骨可发生青枝骨折;④脊柱:脊柱后凸或侧弯畸形,骨盆畸形。恢复期为临床症状、体征改善。后遗症期表现为重症患儿遗留骨骼畸形。此患儿有骨骼改变,诊断为激期。故本题选B。

552.(A2型题)82患儿,女,2岁。体重9kg。纳呆,面色少华,性急易怒,大便干稀不调,舌质淡,苔薄微腻,指纹淡。其诊断是

- A.厌食
- B.疳气
- C.疳积
- D.干疳
- E.积滞

答案:B

解析:根据患儿的临床表现可诊断为疳证。中医认为疳证分为疳气、疳积及干疳。疳气仅表现为面黄发疏,食欲欠佳,精神如常,形体略瘦,大便不调等脾胃不和之症;疳积则出现形体明显消瘦,肚腹膨隆,烦躁多啼等脾虚夹积症状;若出现全

身肌肉消削，貌似老人，腹凹如舟，精神萎靡，即为干疳阶段。故此患儿可诊断为疳气。故本题选B。

553.(A2型题)86患儿，男，7岁。发热半天，出皮疹2天。查体：患儿头皮及颜面、躯干、四肢均可见

- A.麻疹见形期
- B.风疹邪郁肺卫
- C.幼儿急疹肺卫蕴热
- D.猩红热邪侵肺卫
- E.水痘风热轻证

答案:E

解析:水痘起病较急,可有发热、头痛、全身倦怠等前驱症状。在发病24小时内出现皮疹,迅即变为米粒至豌豆大的圆型紧张水疱,周围明显红晕,有水疱的中央呈脐窝状,水痘皮疹先发于躯干,逐渐波及头面部及四肢,呈向心性分布。根据患儿椭圆形疱疹,四周绕以红晕伴痒感的表现,可诊断为水痘,舌脉为风热轻证的表现。故本题选E。

554.(A2型题)89患儿,男,4岁。咳嗽1周,痰多,色白而稀,喉间痰声辘辘,神乏困倦,胸闷纳呆。舌淡红,苔白腻,脉滑。其证型是

- A.风寒咳嗽
- B.风热咳嗽
- C.痰湿咳嗽
- D.痰热咳嗽
- E.气虚咳嗽

答案:C

解析:湿生于脾,脾湿盛者,酿液成痰,贮阻肺络,故痰多。湿为阴邪,故痰白。痰阻气道,故喉间痰声辘辘。神乏困倦、胸闷纳呆、舌脉均为湿邪之象。故辨证为痰湿咳嗽。故本题选C。

555.(A2型题)92患儿,男,1岁。素不欲食,强迫进食则脘腹胀满,舌苔白腻,脉细缓。其诊断是

- A.厌食,胃阴不足证
- B.厌食,脾运失健证
- C.厌食,脾胃气虚证
- D.疳病,疳证
- E.疳病,疳积

答案:C

解析:参见91题。故本题选C。

556.(B型题)97新生儿的头围是

- A.54cm
- B.48cm
- C.44cm
- D.38cm

E.34cm

答案:E

解析:新生儿头围平均为34厘米。5岁小儿胸围为其头围数加上岁数减1。5岁小儿头围为50cm, 加4为54cm。

557.(B型题)100小儿实热证的脉象是

- A.沉而有力
- B.数而有力
- C.数而无力
- D.浮而无力
- E.迟而有力

答案:B

解析:小儿实热证多表现为脉有力且快, 即数而有力。虚热证则表现为脉无力且速率慢, 即数而无力。A是里实证的脉象。D是表虚证的脉象。E是寒实证的脉象。故100题选B, 101题选C。

558.(B型题)104咽-结膜热的主要病原体是

- A.柯萨奇病毒
- B.合胞病毒
- C.轮状病毒
- D.腺病毒
- E.流感病毒

答案:D

解析:咽-

结膜热的主要病原体是腺病毒3、7型所致, 常发生于春夏季, 以发热、咽炎、结膜炎为特征。80%婴幼儿腹泻是由病毒感染引起的, 病毒性肠炎主要病原为轮状病毒, 其次为肠道病毒(包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道腺病毒)。B可引起呼吸道合胞病毒肺炎。故104题选D, 105题选C。

559.(B型题)108小儿伤食泄泻的证候特点是

- A.大便稀薄, 久泻不愈, 面色萎黄, 神疲倦怠, 舌淡苔白, 脉弱无力
- B.久泻不止, 食入即泻, 完谷不化, 或见脱肛, 舌淡苔白, 脉弱
- C.腹痛胀满, 痛则欲泻, 噤腐厌食, 大便馊臭, 舌苔黄垢, 脉滑实
- D.泄泻清稀, 臭味不甚, 常伴发热, 鼻流清涕, 舌苔薄白, 脉浮紧
- E.泻下急迫, 气味殊臭, 肛门灼热, 常伴口渴, 舌苔黄腻, 脉浮数

答案:C

解析:小儿伤食泄泻的证候特点为大便稀溏, 夹有食物残渣, 腹痛胀满, 痛则欲泻, 噤腐厌食, 大便馊臭, 夜卧不安, 舌苔黄垢, 脉滑实等。风寒泄泻的证候特点为泄泻清稀, 夹有泡沫, 臭味不甚, 肠鸣腹痛, 常伴发热, 鼻流清涕, 舌苔薄白, 脉浮紧等。A是脾阳虚的证候特点。B是脾肾阳虚的证候特点。E是湿热泄泻的证候特点。故108题选C, 109题选D。

560.(B型题)113治疗急性肾小球肾炎湿热内侵型, 应首选

A.五苓散

- B.真武汤
- C.三妙丸合导赤散
- D.五味消毒饮合五皮饮
- E.麻黄连翘赤小豆汤

答案:C

解析:急性肾小球肾炎风水相搏证治以疏风宣肺、利水消肿,方用麻黄连翘赤小豆汤。湿热内侵型治以清热利湿、凉血止血,方用三妙丸合导赤散。A用于蓄水证。B用于阳虚水泛证。D用于寒湿内盛证。故112题选E,113题选C。

561.(B型题)117哮喘缓解期的主要病机是

- A.外邪引动伏痰,痰阻气道
- B.感受外邪,肺气郁闭
- C.感受外邪,肺气失宣
- D.肺脾肾不足,痰饮内伏
- E.脾肾阳虚,肾不纳气

答案:D

解析:小儿哮喘发作必有留痰伏饮,受外邪而引发。发作时,痰随气升,气因痰阻,相互搏激,阻塞气道,气机升降不利,以致呼多吸少,气息喘促。哮喘缓解期的主要病机为肺虚皮毛不固,容易感冒及诱发哮喘;肾气失纳则动则气喘;脾虚则纳运不健,易痰饮上泛。故116题选A,117题选D。

562.(B型题)121中医治疗过敏性紫癜湿热痹阻型的首选方是

- A.银翘散加减
- B.犀角地黄汤加减
- C.四妙散加味
- D.葛根黄芩黄连汤加味
- E.茜根散加减

答案:C

解析:治疗过敏性紫癜风热伤络型,治法以祛风清热,凉血安络,方选银翘散加减。治疗过敏性紫癜湿热痹阻型,治法以清热利湿,通络止痛,方选四妙散加减。故120题选A,121题选C。

563.(B型题)125突然发热,一般情况好,热退疹出者,应首先考虑的是

- A.麻疹
- B.幼儿急疹
- C.猩红热
- D.水痘
- E.风疹

答案:B

解析:麻疹多在发热后3~4天出现皮疹。体温可突然升高至40℃~40.5℃,热甚疹出。幼儿急疹骤起高热,而其他临床症状较轻,热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹。C起病急骤,发热,体温一般38℃~39℃,重者可达40℃以上,婴幼儿起病时可能产生惊厥或谵妄,皮疹于24小时左右迅速出现。D起病较急,可有发热、头痛、全身倦怠等前驱症状,在发病24小时内出现皮疹。E通常于发热1

~2天后出现皮疹，皮疹先从面颈部开始，在24小时蔓延到全身。故124题选A，125题选B。

564.(B型题)129咳声重浊，痰黄者，应首先考虑的是

- A.外感暑热
- B.外感风热
- C.风湿犯肺
- D.外感风寒
- E.阴虚肺燥

答案:B

解析:咳声清扬，鼻流清涕者，考虑外感风寒。咳声重浊，痰黄者考虑为外感风热。A多表现为咳声不扬，痰黏黄。C多表现为咳嗽频频，喉中痰鸣。E多表现为干咳无痰或痰少黏稠。故128题选D，129题选B。

565.(A1型题)3阿托品用于麻醉前给药的主要目的是

- A.抑制呼吸道腺体分泌
- B.抑制排尿
- C.抑制排便
- D.防止心动过速
- E.消除紧张情绪

答案:A

解析:阿托品用于全身麻醉前给药，以减少呼吸道腺体分泌，防止吸入性肺炎发生。阿托品对胃肠平滑肌痉挛有明显解痉作用，而对膀胱逼尿肌有松弛作用，排除B、C。阿托品可用于缓慢型心律失常的治疗，排除D。故本题选A。

566.(A1型题)8下列哪种情况不首选胰岛素

- A.Ⅱ型糖尿病患者经饮食治疗无效
- B.Ⅰ型糖尿病
- C.糖尿病并发严重感染
- D.妊娠糖尿病
- E.酮症酸中毒

答案:A

解析:胰岛素主要用于:Ⅰ型糖尿病、继发性糖尿病;糖尿病合并严重急、慢性并发症;合并重症感染、心脑血管意外;手术;妊娠和分娩;降糖药治疗无效。而A中的Ⅱ型糖尿病患者没有降糖药物的治疗。故本题选A。

567.(A1型题)12可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物是

- A.阿托品
- B.毒扁豆碱
- C.毛果芸香碱
- D.新斯的明
- E.氯解磷定

答案:E

解析:胆碱酯酶复活药常用药物有氯解磷定、碘解磷定。故本题选E。

568.(A1型题)15治疗军团菌病,应首选的药物是

- A.麦迪霉素
- B.红霉素
- C.土霉素
- D.多西环素
- E.四环素

答案:B

解析:在军团菌病、白喉带菌者、支原体肺炎、沙眼衣原体所致婴儿肺炎及结肠炎、弯曲杆菌所致败血症或肠炎中,红霉素列为首选。A、B同属大环内酯类, A主要用于革兰阳性菌感染,如金葡菌、链球菌及肺炎球菌等引起的上呼吸道感染、肺炎、扁桃体炎、急性咽喉炎、中耳炎、尿路感染及皮肤软组织感染等,对多种红霉素耐药菌有效。C、D、E均为四环素类抗生素。C对多数革兰阳性菌、阴性菌、立克次体、沙眼衣原体、放线菌及螺旋体等都有效,对伤寒杆菌几乎无效。用于痢疾、斑疹伤寒、沙眼、结膜炎、肺炎、中耳炎、疖疮及皮肤化脓感染等。D、E主要用于治疗立克次体感染、斑疹伤寒、恙虫病、支原体引起的肺炎。故本题选B。

569.(B型题)19上述各项,属抗精神分裂症药物的是

- A.氯丙嗪
- B.丙咪嗪
- C.碳酸锂
- D.地西泮
- E.利血平

答案:A

解析:丙咪嗪主要用于各型抑郁症治疗,对内源性、反应性及更年期抑郁症疗效较好,但对精神分裂症患者的抑郁症疗效较差。氯丙嗪主要用于各型精神分裂症,尤其对急性发作患者较好。碳酸锂对躁狂症有显著疗效。D有抗焦虑、镇静和催眠的作用。E主要用于高血压的治疗,有精神抑郁性疾病或病史、溃疡病病史、急性局限性肠炎、溃疡性结肠炎、帕金森综合征者禁用。

570.(B型题)22用于肝硬化门静脉高压致呕血的药物是

- A.多巴胺
- B.间羟胺
- C.肾上腺素
- D.去甲肾上腺素
- E.异丙肾上腺素

答案:D

解析:去甲肾上腺素可用于上消化道出血如肝硬化门静脉高压致呕血,口服,收缩黏膜血管以止血。肾上腺素为治疗过敏性休克(心脏抑制、血压下降、呼吸困难)的首选药,激动 α 受体,收缩小动脉和毛细血管,降低通透性;激动 β_1 受体,改善心功能;激动 β_2 受体,缓解支气管痉挛和减少过敏介质释放。A、B主要用于治疗各种休克。E用于治疗支气管哮喘、房室传导阻滞、心脏骤停、休克。

571.(B型题)25治疗心肌收缩力减弱、尿量减少而血容量已补足的休克,应首先考虑的药物是

- A.肾上腺素
- B.去甲肾上腺素
- C.异丙肾上腺素
- D.多巴胺
- E.麻黄碱

答案:D

解析:A为 α 和 β 受体激动药,可使心肌收缩力加强,心率增快,心排出量增加,适用于严重的急性过敏反应,特别是青霉素等引起的过敏性休克治疗。B主要用于早期神经源性休克或药物引起的低血压。C主要用于中心静脉压高、心排出量低的感染性休克。D主要用于感染性休克、心源性休克和出血性休克的治疗,对伴有心肌收缩力减弱及尿量减少而血容量已补足的患者疗效较好。E使心肌收缩力增强,心输出量增加,可用于因血管扩张引起的休克的治疗。

572.(B型题)28治疗支原体肺炎,应首选

- A.青霉素
- B.氨苄青霉素
- C.新型青霉素II
- D.红霉素
- E.庆大霉素

答案:D

解析:治疗支原体肺炎首选大环内酯类药物,如红霉素、罗红霉素和阿奇霉素等。治疗肺炎球菌肺炎首选青霉素类、第一代头孢菌素等。

573.(A1型题)3下列疾病,为我国最常见的咯血原因是

- A.支气管扩张
- B.肺癌
- C.肺结核
- D.肺炎链球菌肺炎
- E.风湿性心脏病

答案:C

解析:肺结核是我国最常见的咯血原因。故本题选C。

574.(A1型题)7下列属于颅脑疾病感染性抽搐的是

- A.外伤
- B.脑挫伤
- C.脑积水
- D.脑寄生虫
- E.神经胶质瘤

答案:D

解析:抽搐按症状性病因分为颅脑疾病和全身性疾病。前者包括感染性(脑炎、脑膜炎、脑脓肿、脑寄生虫病等)与非感染性(外伤、肿瘤、血管疾病、癫痫及其他疾病),后者包括感染性(中毒性肺炎、中毒性菌痢、败血症、狂犬病、破伤风、小儿

高热惊厥等)与非感染性(缺氧、中毒、心血管疾病、代谢障碍、物理损伤、癔症性抽搐及其他)。故本题选D。

575.(A1型题)11胸骨角连接的部位是

- A.第一肋骨
- B.第二肋骨
- C.第三肋骨
- D.第四肋骨
- E.第五肋骨

答案:B

解析:胸骨角为胸骨柄与胸骨体的连接处,其两侧分别与左右第二肋软骨连接。故本题选B。

576.(A1型题)15出现“三偏征”,常见的病变部位是

- A.内囊
- B.深皮质
- C.脑干
- D.脊髓
- E.基底节

答案:A

解析:因感觉、运动传导路都经过内囊,且内囊较窄,如有病变常表现为对侧半身感觉障碍及伴有偏瘫,即三偏征。故本题选A。

577.(B型题)24消化性溃疡腹痛的特点是

- A.上腹部周期性、节律性疼痛
- B.右上腹持续疼痛
- C.转移性右下腹痛
- D.全腹剧痛
- E.上腹部周期性、无节律性疼痛

答案:A

解析:消化性溃疡疼痛以周期性、节律性、长期性上腹疼痛为特点,胃癌疼痛以右上腹持续疼痛为特点。C多为急性阑尾炎的疼痛特点。D多为腹膜刺激征的表现。E为慢性胃炎的疼痛特点。

578.(B型题)28肺部叩诊呈过清音的是

- A.肺气肿
- B.大量胸腔积液
- C.气胸
- D.支气管肺炎
- E.肺空洞

答案:A

解析:A叩诊多呈过清音。B叩诊呈实音或浊音。C叩诊多呈鼓音。D叩诊多见于浊音。E鼓音、破壶音、空瓮音等。故28题选A,29选B。

579.(B型题)33坐骨神经痛应出现的是

- A.巴宾斯基征
- B.贡达征
- C.拉塞格征
- D.霍夫曼征
- E.布鲁津斯基征

答案:C

解析:脑膜刺激征为脑膜受激惹的体征,见于脑膜炎,同时并有颈强直、克尼格征和布鲁津斯基征。巴宾斯基征、贡达征、霍夫曼征见于椎体束损害。拉塞格征见于神经根受刺激,如坐骨神经痛等。

580.(B型题)37在右前斜位片上食管受压向后移位,提示

- A.左心室增大
- B.右心室增大
- C.左心房增大
- D.右心房增大
- E.以上都不是

答案:C

解析:左心室增大时,左侧位,心后间隙变窄甚至消失,心后下缘的食管前间隙消失。左心房增大时,食管向后受压移位;心右缘双弧形、心底部双心房影;心左缘可见左心耳突出;左主支气管受压抬高。

581.(B型题)39X线下见右下肺出现大片的浓密阴影,其内见一个含有液平面的圆形空洞,洞内壁光整,洞壁较厚。应首先考虑的是

- A.肺大泡
- B.肺脓肿
- C.浸润型肺结核空洞形成
- D.慢性纤维空洞型肺结核
- E.周围型肺癌空洞形成

答案:B

解析:厚壁空洞X线表现为空洞形状不规则的透光影,周围有密度高的实变区。内壁凹凸不平或光滑整齐,多为新形成的空洞,见于肺脓肿、肺结核及肺癌。结核性空洞多无或含少量液体,而肺脓肿的空洞多有明显液面。癌瘤内形成的空洞其内壁多不规则,呈结节状。浸润性肺结核长期迁延未愈,可形成慢性纤维空洞型肺结核,表现为轮廓不光整规则,周围有较广泛的纤维索条影和散在的新老病灶。

582.(A1型题)3诊断病毒性肝炎最可靠的根据是

- A.发病季节
- B.起病方式
- C.症状及体征
- D.接触史
- E.病原学及肝功检查

答案:E

解析:根据临床资料、流行病学资料和实验室检查结果综合判断病毒性肝炎,但以病原体检查为主要标准。故本题选E。

583.(A1型题)7流行性出血热的“三痛”是

- A.头痛、全身痛和腰痛
- B.头痛、关节痛和腰痛
- C.头痛、腓肠肌痛和腰痛
- D.头痛、眼眶痛和腰痛
- E.头痛、腹痛和腰痛

答案:D

解析:流行性出血热可表现为乏力、倦怠、头痛、腰痛、眼眶痛、皮肤和黏膜出血点,其中头痛、眼眶痛和腰痛称为“三痛”。故本题选D。

584.(A1型题)10下列各项,不属艾滋病典型表现的是

- A.口咽念珠菌感染
- B.长期发热
- C.头痛,进行性痴呆
- D.皮肤黏膜出血
- E.慢性腹泻

答案:D

解析:艾滋病患者艾滋病期可出现发热,全身不适,头痛,恶心,肌痛,关节痛,淋巴结肿大,慢性腹泻,机会性感染如口咽念珠菌感染,神经系统症状如癫痫、进行性痴呆、下肢瘫痪等,卡波西肉瘤等。皮肤黏膜出血为流行性出血热的典型表现。故本题选D。

585.(A1型题)13有关脑膜炎球菌的描述下列哪项是正确的

- A.革兰染色阳性,体外抵抗力很弱,能产生自溶酶
- B.特异性荚膜多糖抗原与其致病作用无关
- C.能产生毒力较强的外毒素
- D.目前我国流行株以C群为主
- E.与淋球菌一样也属奈瑟菌属

答案:E

解析:脑膜炎球菌属于脑膜炎奈瑟菌,革兰阴性双球菌,内毒素是致病重要因素,仅存于人体,细胞内寄生,抵抗力弱,产生自溶酶,需要巧克力色血琼脂培养基培养。目前美国流行菌株以C群为主,B群则在欧洲流行,我国和非洲以A群为流行菌株,但已有B、C群的出现及增多的趋势。故本题选E。

586.(A1型题)17霍乱的典型表现是

- A.黏液脓血便
- B.四肢抽搐,顽固性呕吐
- C.皮肤黏膜出血点
- D.发热,盗汗
- E.腹泻,呕吐

答案:E

解析:霍乱的典型表现是剧烈腹泻、继之呕吐,无腹痛和里急后重,严重者出现脱水 and 周围循环衰竭。A见于菌痢。故本题选E。

587.(B型题)19感染HBV后出现保护性抗体的标志是

- A.HBsAg阳性
- B.HBeAg阳性
- C.抗-HBe阳性
- D.抗-HBc阳性
- E.抗-HBs阳性

答案:E

解析:抗-

HBs是一种保护性抗体,在疾病恢复期出现,临床上作为判断急性乙型肝炎病人预后的指标。HBeAg在血清中出现与HBV-

DNA密切相关,是HBV活动性复制的标志。A最早于HBV感染后1~2周,最迟11~12周出现于周围血中,在慢性感染和无症状携带者中可持续存在多年。C出现提示病毒复制减少或终止。D出现于HBsAg出现后3~5周,说明病毒感染处于窗口期,在“大三阳”组合中,它是HBV活动性复制的标志之一。

588.(B型题)23诊断伤寒常做的检查是

- A.血培养及肥达反应
- B.白细胞计数分类及粪便培养
- C.白细胞计数分类及尿常规
- D.脑脊液检查及白细胞计数
- E.白细胞计数及血涂片找病原体

答案:A

解析:伤寒的确诊标准是从血、骨髓、尿、粪便、玫瑰疹刮取物等任一种标本分离到伤寒杆菌;血清特异性抗体阳性,肥达氏反应“O”抗体凝集效价 $\geq 1:80$ ，“H”抗体凝集效价 $\geq 1:160$,恢复期效价增高4倍以上。怀疑流脑时首先应做脑脊液检查,若外观浑浊基本可以诊断。

589.(B型题)26感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

- A.志贺痢疾杆菌
- B.福氏痢疾杆菌
- C.宋内痢疾杆菌
- D.鲍氏痢疾杆菌
- E.舒氏痢疾杆菌

答案:B

解析:痢疾杆菌属肠杆菌科志贺菌属,革兰阴性杆菌,无鞭毛。目前分为A、B、C、D四群(分别是志贺、福氏、鲍氏和宋内痢疾杆菌)及47个不同的血清型。生存能力较强(D群>B群>A群)。感染后易转为慢性的是B群福氏痢疾杆菌。

590.(B型题)29霍乱典型表现为

- A.发热,腹痛,腹泻,洗肉水样大便
- B.发热,腹痛,腹泻,脓血便,里急后重

- C.腹泻, 呕吐, 水样大便, 无发热, 无腹痛
- D.发热, 腹痛, 腹泻, 水样大便
- E.低热, 腹痛, 腹泻, 果酱样大便

答案:C

解析:参见27~28题。

591.(B型题)32血白细胞增多, 异型淋巴细胞比例常高于10%, 多见于

- A.伤寒
- B.中毒型菌痢
- C.流行性乙型脑炎
- D.急性病毒性肝炎
- E.流行性出血热

答案:E

解析:流行性出血热的血象特点为:①早期WBC增高, 一般达 $(15\sim 30)\times 10^9/L$, 少数出现类白血病反应 $(50\sim 200)\times 10^9/L$ 。②早期外周血中性粒细胞可略高, 第二期后淋巴细胞比例升高。出现异常淋巴细胞有早期诊断意义, 第一病日即可出现, 一般10%~20%, 部分可>30%。③发热后期、低血压期血红蛋白、红细胞明显升高血小板减少。B实验室检查主要是粪便检查, C主要是脑脊液检查, D主要是病原学检查。

592.(A1型题)1撰写“医家五戒十要”的医家是

- A.李时珍
- B.陈实功
- C.孙思邈
- D.张仲景
- E.华佗

答案:B

解析:此题暂无解析

593.(A1型题)41976年美国学者提出的医患关系基本模式是

- A.主动-被动型, 互相-合作型, 平等参与型
- B.主动-合作型, 相互-指导型, 共同参与型
- C.主动-配合型, 指导-合作型, 共同参与型
- D.主动-被动型, 指导-合作型, 共同参与型
- E.主动-被动型, 共同参与型, 父权主义型

答案:D

解析:1976年美国学者提出的医患关系基本模式是主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。故本题选D。

594.(A1型题)7下列各项, 不符合道德要求的是

- A.尽量为患者选择安全有效的药物
- B.要严格遵守各种抗生素的用药规则, 尽可能开患者要求的好药, 贵重药物
- C.在医疗过程中要为患者保守秘密
- D.对婴幼儿、老年病人的用药应该谨慎, 防止肾功能损害

E.钻研药理知识,防止粗疏和盲目用药

答案:B

解析:医学道德的范畴包括:①权利与义务;②情感与良心;③审慎与保密。保密是指医务人员在医疗活动中应当具有对医疗和护理保守秘密的职业道德,故不选C。

595.(A1型题)9根据美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念,不能确诊“脑死亡”的条件是

- A.自主运动和自主呼吸消失
- B.对外部刺激和内部需求毫无知觉和反应
- C.体温低于32.2°C或服用中枢抑制药物者
- D.脑电波平直或等电位
- E.诱导反射消失

答案:C

解析:是指包括脑干在内的全脑功能丧失的不可逆转的状态。脑干是人体的生命中枢,它控制着人体呼吸、心跳、血压等重要功能。体温低于32.2°C或服用中枢抑制药物者不属于脑死亡。故本题选C。

596.(B型题)11概括医患关系内容的是

- A.医患关系是一种民事法律关系
- B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系
- C.医患关系是一种商家与消费者的关系
- D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
- E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

答案:E

解析:我国医患关系是本质的是以社会主义人道主义为原则建立起来的平等关系。医患关系内容是以医务人员为一方,以患者及家属为一方,在诊断、治疗、护理过程中结成的人际关系。

597.(B型题)15作为医学伦理学基本范畴的情感是指

- A.医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益
- B.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C.医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- D.医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- E.医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

答案:E

解析:医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福。A为权利, B为义务, D为荣誉与幸福。

598.(B型题)14麻醉药品处方的保存期是

- A.6个月
- B.1年
- C.2年
- D.3年

E.4年

答案:D

解析:普通处方、急诊处方、儿科处方的保存期是1年,医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年,麻醉药品处方的保存期限为3年。

599.(B型题)18各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应

- A.在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- B.承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
- C.对甲类传染病疫区实施封锁管理
- D.承担责任范围内的传染病监测管理工作
- E.对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

答案:B

解析:各级各类卫生防疫机构应承担 responsibility 范围内的传染病监测管理工作。各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作。

600.(B型题)22国家鼓励开展中医药专家学术继承工作,培养高层次的中医临床人才和

- A.中药技术人才
- B.中医从业人员
- C.中医医疗机构
- D.中医药教育机构
- E.中医药科研机构

答案:A

解析:《中医药条例》第十五条规定:设立各类中医药教育机构应当符合国家规定的设置标准,并建立符合国家标准的临床教学基地。《中医药条例》第十六条规定:国家鼓励开展中医药专家学术经验和技术专长继承工作,培养高层次的中医临床人才和中药技术人才。